越爾寃戔集錄　其民各疫匹剤篇

禁無出

扶氏各病吐劑篇

扶氏各病吐剤篇

諸病疾沃実鳥漠ヲ用ル治験
沃実鳥謨製法
唇瞼瞳破泣験ヒーヘラント
月泛症
頑痼危萬服水治験
血治験
舞踏病治験
羔障眼治験

夜盲眼治験
血腸流血治驗
肢及ヒ股腎水腫治驗
胃管痙攣様塞閉治驗
舞踏病自驚駭未ノ治驗
小児胃軟疵ニ糸
立軟骨水腫様蛔蛕驗
鶏僂歩壊疵全治ノ実験
小児胃軟弱
コレア病

神経衰弱ヨリ消化器ニ及フ治驗
妊婦痙攣ノ規起尓実
産婦危篤撃誦徴
日ク軽易播撃誦徴
厄秘妥利泄ヒ徴
井飲塩製法
流砌水製怯

越爾実戞集録

杖氏各病吐利実験説

余今最時ノ本説ニ従シ各病吐利ノ適応スル者ト否ラサルトヲ記載シ而ニ煉熬ニ出ル至要ノ説ヲ加フ

熱病

凡ソ諸般ノ熱ニ於テ　熱毒醸成スル溷溘ハ恐ク八心藏近傍ノ神至業及ヒ肌對神至ニ在リ○其徴候病発生ノ時ニ生スル感動ニテ確知スヘ

シ論ハ食欲消化カノ缺乏其レカリ生シタル戦栗等咸ナシ之ニ属スル一種ノ神全感動ニ於テハ吐剤ノ外処調神至叢上一種ノ機能ス起ス剤アル丁ナシ〇故ニ吐剤一品ニヲ諭熱毒ヲ最初ニ於テ能ク撲滅スル普通ノ熱病茶トシモ可ナラスヤ〇吐剤ヲ小量ニ典ヘ強壮ノ吐ヲ取テサル能ク後効ヲ奏スヤメスメートル（散剤ノ名安免毋扭西而屋施的）モ能ク次目的ニ応ス〇然レモ次ニ一種ノ熱病腸胃ノ感動極度ヲ得ルノ症アリ只病捗刺戟ヨリメ然ルノミナラス其様刺戟ヨリ続発スル諸疾ノ腐敗之ヲ得カ故ニ其病初ヲ論セス病往過中依然トメ諸症ノ基原ヲ為シ残在メ而各病ニ自己ノ腸胃性ヲ与フ〇全其性ヲ腸胃熱ト名ク〇次腸胃熱発性ニ就テ臆断紙上ノ論ヲ為シ之ヲ至脹シ或ハ之ヲ排斥スル者アリ予之ニ管セス上ノ各義ヲ与フ何者次ヲ排斥スルノ人ノ如キモ煉熟原カスト雖又別メ一箇ノ発明スル処ニ布レハ之〇碓千タル事跡在ノ如シ凡熱病胃疾患及ヒ腐敗物ノ諭徴ヲ備ヘタル者ニ於テハ吐下

両剤ノ外生命保護ノ剤アルヿナシ極度ノ症ニ至テハ尚然リ〇腸胃症身一ノ指的ハ自然良能ノ作為ヲテ知ルヘシ譬ハ吐ノ如シ〇医悪病ノ初起ニ於テ悪心吐吐黄色アルヘハ褐色、舌胎悪味等ヲ有スル患者ニ吐剤ヲ用ユルヲ怠ルハ自然良能ノ作為ヲ誤認トスフヘシ不幸ノ患者又々其録ヲ受フ〇故ニ自然吐排泄ヲ希望シ而已ニ其用意ヲ為ス時ニ当テ吐剤ヲ与フヘカラス〇吐剤ヲ正時ニ用ユル時ハ屡々其病ヲ初起ニ遏止スルモ之レヲ避滞スルキハ其病ヲメ蔓延重篤トナル或ハ全ク治ニ至ラシムル這般ノ事件誠実ニ慮スト雖予尚未タ医ヲメ全ク能ク暁知セシムルヿヲ得サル処多シ

〇医又下剤ヲ以テ能ク吐剤ノ地ニ当ルト雖ヿ勿レ〇凡ソ吐剤ノ能ク排泄スル処ノ者下剤ノ敢テ創泄スル処ニ非ス予且食物不化ノ停滞物四十日ノ間下剤ニ由テ漏レス尚胃中ニ残在シ今ヤ吐剤ヲ得テ初ヲ排泄サヽルヲ見タリ〇

認意未詳

且医亟ク妨害ヲ為スヘキ腐敗物ヲ既除スルニ
吐剤ノ偉功アルヲ意ハルヽナク其汚物ヲ近信
ノ益ヨリ漏レ出ルヘシ何者汚物腸間ノ長途ヲ
通過スル側ニ刺戟衰弱及ヒ吸収等ニ由テ患者
ニ大害ヲ与レハナリ〇故ニ医緊功ニ知得スヘ
キナリ下剤ハ胃管等ノ諸神至及ヒ分泌流系
施テ安然ノ変革ヲ起スト雖ソ其然レ吐剤ハ
両機ノ運管ヲ十分ニ変革シ且腸胃汚物ノ原ヲ
遏止スル者タリ〇然シ吐剤ヲ用ユルト必スモ
常ニ一回ヲ以テ足ルニ非或ハ二三回ニ及フ

〇若シ自然良能剤ニ汚物ノ上ヲ見サル亟ク
交復シ用ユヘシ〇腸胃然ノ合併及ヒ種々ノ形
容ヲ見ハス者殊ニ注意ヲ要スル〇予質ニ就テハ
之ヲ停帯熱血液熱粘液熱蛔虫熱ニ於テ分テ容
チヲ以テハ之ヲ煽衝熱神熱ニ分ツ煽衝（全身或
腸胃熱ト合併スル（局処）ヤ否ヲ注意スヘシ而
吐剤ヲ用ル前ニ浮血ヲ施シ先之ヲ減捐スルト
ヲ謀ラスンハ有ヘカラス而メ吐剤ヲ用ル前
ニ浮血ヲ施シ先之ヲ減捐スルト〇腐
敗熱神至様ノ合併ニ於テハ勉テ生カラ補助シ

シ殊ニ注意メ百方興奮強壮メ而ヲ用ルヿヲ要スヘシ○消化シ難キ食物ヨリ来ル怪易ノ停滞熱ニ於テハ吐下剤ヲ用ル外他術ナシ○胆汁熱モ亦善ニ注意ヲ要ス何ントナレハ此熱嘔衝様ノ合併ヲ為シ易ク殊ニ肝系統ニ於テ嘔衝ノ合併ヲナシ又ヨシ胆汗顕著メ酷厉ヲ為セハナリ○此疹リノ目的肝汗ニ於テハ劇烈ヲ吐剤殊ニハヲ禁シ兼テ稀薄ノ飲料ヲ命スヘシ粘液熱帯消化諸器ノ弛緩性ヲ兼タ故ニ有力ノ解凝透徹スル剤ヲ撰用スルヲ要ス○蚘虫熱ニ於テモ吐剤甚タ利益アリ一ハ蚘虫時々胃中ニ来ル(アリ)ニ由テ起ル諭虫症ヲ除ハナリ諭ハ屡劇甚ニ発スル胸膈痛ノ如シ此症屡熱毒ニ由テ起レモ吐剤ニ由テ能ク瞬間ニ転除セラル○九欬膈膜ヨリ上ニ属スル諸器胸頭如キ器腸胃熱ニ於テ灸ク汚物ノ上湧ヲ徴シ吐剤ヲ用フヘキヲ苦ク此レ一般治療ノ標的トスヘキ処ナリ

間歇熱

間歇熱ノ本体ト真所在トヲ余カ燻熟ト只諭症

トニ由テ之ヲ比考スルニ心ノ近傍ノ神圣叢及肋間對神圣ニ在ル必セリ衆医能クコノ症ニハ吐剤ヲ称スル実ニ之ヲ用テ偉功アルハ其説ノ杜撰ナラサルヲ確知スヘシ〇吐剤ヲ用ユルハ発作ノ前ヲ可トス屡之ニ因テ其発作ヲ防止スルヲ見ル〇間歇熱尋常ノ種類殊ニ寿熱ニ於テ吐剤ト之ニ交換シテル硇砂ニ由テ屡能ク此症ヲ癒スルヲ得〇加之幾那及滴化シ安キ幾那塩ヲヨテ熱減退セス却テ強甚トナリ患者何時ト雖尚不快ヲ覚ユルヿ有ヲミル〇是ニ於テ幾那ヲ合テ吐剤ヲ与ヘ或ハ瞬時ニ轉草シ之ヨリ始テ幾那ニ堪ユ熱モ亦従テ減却シ遂ニ術ヲ遂ルヿヲ得リ〇予近時吐剤ノ非常ニ有カヽ品ヿヲ確定セリ

〇一先漠前年童黄疸ヲ患ヘ今市新ニ疾患ニ罹ル其症在ノ如シ〇才一不眼食欲飲之困悶呼吸困難間歇メ脈次才ナリ便通頻々復来ノ熱動其後未ノ時刻頃ヲ踏セス〇此状態　週間産綿タル氏甚恐怖スヘキ卒然メ疲憊及脫力ヲ発見ス〇患者方今マテ解凝越幾剤硇砂等ヲ用タリ〇今ヤ其熱晡

時ニ頭然トメ発作順次アリ尚ホ相遷然流行スルヲ以テ患者最初ニ無日天ヨリ次テ八仄ノ戎那塩ヲ用〇然ルニ戎那塩ノ増用ニ因テ然大ニ増劇シ遂ニ之ヲ止ルニ至ル〇是ニ於テ吐剤ヲ用ユヘキ確乎タル良能ノ指麾ヲ得タリ〇患者四仄ノ吐酒石ニ由テ胆汗及粘液ヲ吐ク事四回浮下スルヿニ三回自此ノ然ノ諸症消散シ困悩窘迫咳嗽等皆減退シ瞳眠故ニ復シ顔色モ亦常ニ及ス〇如此忽チ軽易ヲ見リシ幾汗ナクメ終ニ全ク故ニ復スルヿヲ得ル者ハ全ク胆汗ノ蓄積ヲ排泄シ肝系流ノ運営正整次序ヲ得回其分泌ノ機更ニ其本然ニ復スルニ因ルナラン〇予又此ニ嘗テ吐剤ノ為ニ鴻ヲ得ル者ヲ揚筆シ其右カノ品タルヲ證ス

〇間歇熱ノ一症毎一モ次序ナリ一モ頭等ノ間歇ヲ為サス煩期ヲ踏ス、多分豁苗熱ニ類スル者アリ〇如此症ニハ吐剤ヲ与ルニ匹クノ之ヲ与フキハ則チ其熱頭著ノ間遏ヲ以始テ次第アリ間歇熱ヲ発見スル者ナリ是ニ於テ幾那ヲ与ヘ速ニ之ヲ癒スルヿヲ得タリ

傳染熱

凡ソ人傳染熱ヲ感受スル第一ハ胃及ヒ心ノ近傍ニ在ル神圣ニ於テ疑ヲ容レハ〇傳染病共効カヲ逞スル發見スルニ由テ知ルヘシ〇痘麻疹及傳染神圣ニ於モ亦然リ〇故時期ニ於ハ吐剤必要ノ品々リ〇一ハ吐剤ニ由テ傳染毒ヲ排斥シ一ハ其毒ヨリ媒起スル抗抵ヲ最初迅ニ変化セシム〇予故ノ自的ニ因テ如故諸熱ノ第一時期ニ吐剤ヲ与全病ヲ減損スル為ニ良効ヲ取ルヲ屢之ア

〇加之恐クハ神圣熱傳染ナラント疑感スル如時ニ又故剤能ク其毒ヲ排泄スルヲ〇若シ其傳染毒ヲ已ニ深ク感受シテ其功カモ亦既ハラヤリ或ハ栗疹熱ニ於テ自然ノ久利其路ヲ皮表ニ啓行セハ之ヲ用エルヲ切ニノ注意セスンハ布ラス〇若シ毒発見ノ期已ニ進来シ或ハ皮上已ニ発疹スルニ内部ニ起ス暴劇ノ変動及ヒ消毒刺戟甚タ妨害ヲ為シ且ツ皮表久利ニ危峻ノ碍碍ヲ営ムヲ屢之アリ〇只腸胃汚物現在シセムヲ得サル

キハ之ヲ与フルヲ免レス○又這般ノ発疹得染
熱ノ胎病ノ時期ニ従テ更ニ吐剤ヲ用テ甚偉功
ヲ得ルコアリ○他医吐剤ノ奏功ヲ趁フノ症予
屢ヒ考シ用ルヲ常トス○麻疹従肺中ニ残留ス
咳嗽並咳ハ肺中ノ餘毒ヨリ容易ニ肺ニ吐剤ヲ
与ヘ之ヲ排泄スルヲ為ス若シ
ル○所謂吐剤ノ奏効左ノ患者ニ於テ明也
○十二歳ノ女子疹ヲ患ヒ幸ニ過ヒ其
病ニアリコト十四日ニ三四日前一日ニ当ル甚熱減
退シ食欲頗レ既ニ甚タ怪快ヲ為セリ○然ニ今又
食欲減之シ咳嗽更ニ劇甚ナリ吁吸困難シ急悩
増加シ瞳眠安カラス頭痛シ大便秘結シ与フル
下剤モ奏功ナシ○予因テ忽チ吐剤ヲ与フ○患者
粘液及胆汁ヲ吐スルコト六回次ヨリ随意ナル
血ノ利ヲ下利ヲ得毎日上圊四五回三四日続ケ
リ○咳嗽清数シ食欲生シ生カ来復シ不日ニ十
ノ健康ヲ得タリ

咽喉嫩衝

凡諸種ノ咽喉嫩衝ニ吐菜ヲ用ルコト余カ煉塾ニ
因レハ普通峻功アル者トス○咽喉ノ嫩衝ノ刺

衝及血液循環ノ障碍ヲ速ニ除キ去ラント欲セ
ハ其部ノ神圣及粘液膜上ニ反對刺戟ヲ与フル
ヿ只ニ好ムヘキノミナラス其功屡亦顕然タリ
〇嘔下困難ノ症ハ容易ニ休止スヘカラサル若
ヿス何若患若百嘔百吐受容ノ機ヲ失ハヽ十リ〇ヲ
吐剤ヲ禁止スルハ独リ極度ノ純粋咽喉嫩腫潟
血ヲ妥スルノ時勦ニ於テスルノミ〇潟血甚称
用ス可ラサル若次條ニ掲示ス
第一咽喉嫩腫自正症腸胃汚物来若ニ於テハ其症
初ヨリ腸胃汚物ノ徴ヲ見ハシ右苔恰モ塗ルカ
如クロ味ヲ失ヒ悪心ヲ吐セント欲シ或ハ烈リ
吐スル〇如キ症ハ腸胃汚物ノ攻出頻上ノ僂症
ヨリ来ル咽喉嫩腫ニ外ナラス故ニ治術モ亦吐
剤ニ止ルベシ此剤ニ由テ屡諸僂症血子ニ退散
スルヿアリ第二格魯布ニ於テハ此症ニ吐剤ノ
偉効アルヿ已ニ確論アリ然而予又煉熟ニ由テ
之ヲ用ルニ殊ニ二劑ヲ定ム
甲咽病初ニ在リ若シ一二ノ茶剤格魯布ノ発生
ヲ防御スルヿヲ能ハサルノミナラス更ニ之ヲ除
ニスルヿヲ得サルキハ則チ術実ニ吐剤ニ止ル

ナリ此等ノ事余ニ屢顕明ナル処ナリ今玆ニ一例ヲ挙テ以テ徴トス

○小児年再三歳健康強壮ニメ夥液質ナリ北東ニ因テ寒冒シタルノ侵三日ノ間烈甚ヲ添ヘタル熱状ニ煩タリ而毎夜一時半間烈甚ノ痙攣ヲ発シ気息絶シト欲シ或ハ其響音狗吠ノ如ク丈発作ヲ亜斯的麻迷児罹病ト看做テ亡香耳衆ヲ交換シ用ルニ至ル○予発病第四日ニ当テ初テ患者ヲ診スルニ丈胸実ニメ数絶エス咳シ呼吸或ハ促迫シ或ハ否ス頭部寛解シ丈他患児活潑ニメ少食欲顕明唯舌上汚胎ヲ覆ヲ○是ヲ以テ余咽喉煩痛ノ初起ナランヿヲ察シ呼吸器病症煩剰ヲ踏ヲ発スルニ因テ急ニ尋常ノ吐剤ヲ知之亦症往々之アリ処ス

吐酒石一仏　吐根末一又　海葱醋

覆盆子舎利別各半

右能ク混和シ毎日八分時ニ一茶匕ヲ与ヘ吐ヲ得ルニ至ル

○患者多量ノ粘物ヲ吐クヿ三回ア后咳嗽従テ減退シ安眠スルヿ時間大ニ発汗セリ○翌朝

ニ及テ咳嗽ヰ窒息ノ状全ク退却シ吉利失私既
ニ至リ格魯布ノ発生是ニ於テ始テ全治セリ
〔乙朝病未ニ在リ〕警ハ咽喉義膜ヲ生メ商脱ノ状
アルト雖モ未タ全ク排泄セラルヽヲ得スシテ
本患愈窒塞状ヲ増進スル者ノ如トシ〇此ニ於
ハ吐剤唯粘液膜様ノ物ヲ乾逐シ呼吸器ヲ緩弛
ナラシムルニ在リ〇予又此ニ一例ヲ挙テ以テ
徴トス
〇一小児齢ニ歳居恒ニ健康一時冒寒中暴烈ノ
格魯布ニ罹ル〇余茅二日ノ晩ニ当テ始テ患児
ヲ診スル児時ニ窒塞ノ発作劇甚ナルニ兼テ真咳
恰モ豹吠ノ如キ吸呼殺雞ノ音ヲナシ動モスレハ
首頭ヲ高ク保支セント欲シ或ハ首頸ヲ延ント
ヲ好ニ脈搏一斉拍萬ニ有二十度ナリシ〇於
是予頸上ニ水蛭二條ヲ貼シ毎夜半時ニ加魯爰
児ヲ与エ醋漬腸ヲ施ス〇水蛭ヲ施シ又ハ氏ノ
カロメルヲ用(浮ヲ取ル)下ヒタル后大ニ軽快ヲ見モ
午時ニ及ンテハ脈搏九十度ニ復セリ然レモ尚
喘鳴ノ声唖ス〇於是蚊針二條ヲ貼シ八分時毎
ニ已前ノ吐剤ヲ与フ〇其后始テ十分ノ快復ヲ

得〇予更ニ左ノ方ヲ処ス

酒石塩一瓦　井水一弓　安质皮也加酒二十滴

右溶解剤毎一時一茶匙ヲ与ヘ以テ術ヲ余ス

第三耳后ノ腺疾ニ原ク咽喉嫉衝ヲ於テス、蓋シ多クハ流行性ニ見ワシタル者ノ其始メ基ハ耳腺及粘液膜等ヲ浸シ室息危篤ノ症ヲ誘ヒ全ク破傷凡ヲ起ス者ナリ此ニ於テハ唯吐剤ヲ緊要トス可ノミナラス実ニ救命ノ聖剤ニ〇軽易ノ症ニ於ハ普通ニ用ル制嫉消散ノ療法ヲ以テ足レリトシ病モ亦概ヲ粘液様腺様ノ部分ノ軽易嫉膣ニ外ナラス〇然ト雖上ニ処謂極度ノ症ニ於テハ既ニ此療法ノ及ヒ処ニ非ス〇加之浮血肉衆荒蕪ホ都テ効ヲ奏セス〇此ニ吐剤独リ絶気ノ危救ヲ防ニ足ルノミ〇此ニ疾病ノ実傳ニ見タリ

因テ左ニ述フ

〇二十六歳ノ婦如此極度ノ頚膜嫉衝ヲ〇其症耳后腺膣起スルノミナラス（部合ノ名詳未）及ヒ口内粘液膜咽喉腺膣記号奢等咸膣脹シ大ニ困若メ以テ僅ニ些少ノ物ヲ嚥下スルヲ得ス呼吸困難シ両顎運転自在ナラス歯牙噤メ破傷

風ノ奥症現在セリ○如是景況九日間刺絡蛭針
ノ偏泡嗇水銀剤琵布摩擦ノ類少モ功ヲ奏スル
無ク劇熱綿連トメ現在アリ○於是ハ吐剤ノ外
他ノ聖剤アルナシト雖モ咽喉全ク閉塞狭窄
スルカ為ニ吐薬ノ上方ニ激上スル勢ト汚物ノ
上方ニ逆輸セラル作為ニ因テ通貫自在ナラス
メ窒塞ヲ発セシトヲ恐ル、カ故ニ頗精細注意
ノ之ヲ与タリ○然シ乍剤果メ試スレハ布ベカ
ラサル者ニメ艾功モ亦彰々タリ○投剤ノ後上
輸ニ障碍ヲ受クル器忽倆儫ノ下送ノ容易ナル
ヲ得○吐容易ニ三回ヲ得更便通アリ尓后血
ニ破傷風ノ症及腺腫ノ極度緩急シ嗌下ノ機大
ニ迺ニ一二日ヲ経ニ十分ノ快復ヲ得タリ○第
此症ノ預防ニ亦缺ク可カラサル吐剤ヲ命ス○予這ノ一般
流行病(時疫之)ニ於テ病初盛ニ用タル吐剤ニ由
テハ病後ノ発ヲ防禦シ又即時ノ快復ヲ致サレ
ム

第四脱疽性ノ咽喉嫩衝ニ於スル灰黄重ノ病
ナレモ幸ニ其スルヤ灰シ常唯悪性ノ猩々熱
ト傍症ヨリ発見シ血ニ咽喉嫩衝ノ発起ト共ニ

腐敗変性ヲ現スナリ次レ亦吐剤ヲ主トス殊ニ初発ニ与ルヲ要ス

第五口腐敗スル症ニ於ス余次症ニ於モ又吐薬ノ偉効ヲ称スル一種俊鋭ノ適剤ト為ルナリ〇屡又浮下剤嘔吟等ノ切ナラメ却ニ吐剤ノ為ニ速ニ其困悶悪性ノ病ヲ根治スルヿアリ〇余又次ニ一言ヲス諸咽喉嘔衝ニ於テ若制嘔消散剤ヲ用ヒ的応用ノ症疾患尚解セント欲セハ窒塞危険ノ疾進未セハ吐剤左急務トス

段肺嘔衝

此ニ肺嘔衝ノ一種刺絡甘硝石阿芙蓉及ヒ其他ノ諸剤皆モ相当セスメ吐劑独リ甚タ効験ヲ奏スルノ症アリ是ニ於ハ吐劑実ニ生命保護ノ聖剤タリ〇余最ニ三時限テ歴験ス

第二世医諸肺嘔衝ニ刺絡ヲ専称シ他ノ術ヲ用サルノ時限

第二阿片及ヒ諸刺戟制ニ駭驚スル時限

第三唯横針甘汞ヲ導業スル時限

〇次時限中試験ノ誠ヲ積ムニ由テ所謂諸術ノ妨害多クメ拙リ吐薬ノ啓ヲ之ニ応スルヲ発明

セリ○近時大ニ声價ヲ高フシタル人名ノ術ト雖モ既ニ四十年前　又　各人名　諸氏ノ称用シタル肺燠腫ニ吐劑ヲ投シ第一吐ヲ取リ次ヲ適度ノ浮ヲ促ノ術　外ナラス○予此ノ如キ症ニ腸胃汚物ヨリ来ル假肺燠腫ト名ク○此症固ト腸胃系統ト雖モ之ニ由テ只腸胃疾患ノ感波及ト為スナリ然レ共此全ク交感刺戟ニ因テ腫中ニ起レタル真ノ緩性号発燠腫ニ外ナラス故ニ艾治モ亦艾表ノ毋毒ト同ク只吐剤ヲ用テ之ヲ斷除スルヲ得毋毒ヨリ来ル物ノ汚○此症純腫燠腫ト異ナル所以ノ若ハ艾肌硬ナラス柳塵スヘク或軟ニメ小ナル芽ハ因ル且艾病初ヨリ腸胃汚物ノ徴発見シ舌胎茶褐色ニメ塗ルカ如ク口悪味殊ニ苦味ヲ覚ヘ絶テ食餌ヲ好マス吐気ヲ布シ或ハ吐シ心窩困重且痛ミ前頭疼痛シ或ハ時ニ妄語シ口囲面皰眼中発莫シ概メ病初ヨリ血タニ非常ノ疲倦急情等発見スルカ如キハ大率純燠腫ノ異ナレ処以ナリ○絶燠腫ニ於ハ両股痛敏疾ニメ患者之カ為ニ呼吟自在ナラス又刺衝劇甚ナル

ニ因テ吸気毎ヲ恰モ嘔衝胞脹痛ノ如ク短息困難スルヲ診スルニ当テ患者上ノ如ク劇甚ノ胸悪悩腸胃汚物充満ノ諸徴ヲ見ハシ即チ茶褐色ノ舌胎悪心嘔気吐ニ高壓迫困重及ヒ其脈硬ナラス実ナラサル等ノ諸症ヲ備ヘリ此ニ於テ吐劑ヲ与フルノ外他ノ術アラサリシ何者劇甚ノ胞悪素腸胃汚物ノ充満ト密ニ関係ヲ為シ実ニ汚物ヲ致ス処ナレハナリ〇此剤ニ因テ更ニ胆汁様ノ汚物ヲ吟出シ胸痛胞脹痛寒迫困重等屡瞬時ニ退散スルヲ驚クヘキ処ナリ〇然シ又此ノ腸胃汚物ノ徴候病初ヨリ血ニ真嘔衝ト合併セラルニアリ〇此ノ如キ症ニ於ヘ瀉血制嘔治法等ニ因テ嘔衝様ノ徴候ヲ除去シ始テ汚物制伏ノ治ヲ施スヘシ〇凡ソ腸胃汚物充満ノ徴ハ脈硬実ナリ患者若シ年壮ニメ旦多血質ナラハ第一膊上刺絡ヲ施シ而后始テ吐剤ヲ与フヘシ〇何々ナレハ此汚物ノ止徴吐某ヲ用スンハアルヘカラス〇全此ニ又一例ヲ挙テ以テ徴ス

〇一婦人三十五弦劇熱ニ侵サレ兼ルニ両股痛

ノ堪ユ可カラサルヲ以テス○加之乾咳短咳、
吁吸困難短息劇シキ頭痛汚物ノ誘徴実硬ノ脈
等ヲ兼タリ○是ニ於テ膊上刺絡ヲ施シ多量ノ
血ヲ瀉ヲ浮シ且便秘スルカ為ニ后一時許リメ
其痛大ニ軽快シ復タ幾タモ無クメ再発セリ○次
日ニ於ハ肌状前数日ニ比スルハ実ニメ疾キリ
然レトモ既ニ硬ヲ帯ス頭痛劇甚乾咳愈増加ス又
肋骨ノ縁肝臓ノ部疼痛セル処ニ腫脹ヲ見ワシ
之ニ触テ痛ヲ覚ヘ肝亦炎腫ニ罹ルヿ著ク且悪
心シ各苔茶褐色ニメ離脱ノ状ニ変テル○次諸

症ニ因テ嘔吐ト腸胃汚物ノ合併症タルヿ頗然
タリ尚且実肌連綿タルヲ以テ刺絡ヲ施シニ骨
布ノ血ヲ浮ス現ハ血嘔皮疼痛後弛ストモ悪心増
加シ難シト吐セントシ欲ス○是ニ於テ吐涌石ニ
吐根ヲ合シ久テ数次ニヌフ○ヌニ由テ快吐ヲ
得ルヿ三回胆汁粘液ヲ吐クノミ尓后悪勢疼痛ヲ
ニ又ニ軽快ヲ見フシ之ニ
ノ脈下テ九十二度ニ及シ
脈セシムル中往状日ヲ追テ相従ヒ全ク故ニ復
シ而メ后剤ヲ止ムト
メ一斉ニ旬間十度
ヌヨリメ後下剤ヲ連
ニ云フ処ノ腸胃汚物ノ症

候必モ常ニ頸処タル非間又隠伏（仮名）腸胃汚
物肺燃衝ト各ル者アリ殊ニ精細註用スヘキ症
ト次汚物ノ徴甚タ分明ナラス景現依然タル
ヲ以之ヲ識別スルヲ甚タ難シ而ノ燃衝ノ比較
ニ由テ確子タル鑒為スヘシ○次症至甚ノ刺痛
至強肺燃衝ノ症ヲ発スト雖脈状次ニ燃
衝ヲ見ハサス其他ニ般悩悶熱ノ徴モ絶テ有ラ
ナシ○次ノ難治不明ノ症ニ投シ已前患ル処
者譬ハ労思焦心飲食消化ノ妨碍及ヒ心窩ノ
等ニノ症前ニ患ル処ノ者
困重紧張舌状顔面黄色等ヨリノ確子タル正候

ヲ為スヘシ余次困悶ノ症ヲ以隠伏腸胃汚物ノ
主症トノ殊ニ着眼ヲ為セリ○次困悶ノ症甚極
度ニ及ヒテハ屢ク誤テ他ノ燃衝困悶ト相混ス
ルヿ勿レ○次症自ラ吐劑ノ緊要タルヿヲ示ス
ニ実ニ克ク之ニ由テ退散スルヿヲ得○丈信疑
次シ難キモノヽ如ハ刺絡ヲ試ルニ宜シ○真燃
衝ニ原ク者ハ刺絡ヲ施ル者ハ毫痛ヲ増加スヘシ次ニ至ハ純粋腸胃ノ
症タルヿ疑ヲ容ス宜ク即時ニ針口ヲ併封スヘ
シ○間又刺絡ヲ施メタ后次時ヲ歴ルカ或ハ血ケ

ニ汚物上湧ノ症不意ニ相従ヒ胆汗様物ヲ吐
スルコアリ吹レ汚物脱去セント欲スルカナリ
是ニ於ハ直ニ吐剤ヲ与ヘ安然ノ功ヲ収ムヘシ
○吹ニ又一種ノ雑弁不明ノ症アリ丈発病初ロ
ニ真性ノ誤リ認メ海血モ施セル胸患少シモ軽
吠ヲ見ヌス患者自名トメ誓当然ヲ特久シ肋患及
ヒ呼吸困難腸胃汚物ノ徴尚連綿トメ現在シ脈
状等再回ノ刺絡ヲ禁スル者アリ吹ニ生ハ吐剤
業已ニ丈剋ニ後ルト雖モ尚能ク大功ヲ呈スル
コアリ○吐業後剋ノ用テ尚能ク大効ヲ奏スル
ヲ以テ見レハ吹剤ノ有カニメ真ニ欠如スヘル
ラサルコラ保證セリ○吹ノ急慢屡余モ亦従来
尚之レヲ免ルヽコラ得ス又燃衝ト浮血トノ二
ツニ偏倚固着スルノ説屡吹腸胃汚物ノ症ヲ軽
忽ニ看過セシムルトアリ)

○一婦人歳三十歳肺燃衝ノ諸症ニ促サレ医刺
絡蚊針浮下ノ剤ヲ施シ諸制燃ノ内療ヲ尽スニ
由テ劇甚症既ニ減スト雖モ頭患尚連綿トメ止
ラス○予発病第八日ニメ始テ之ヲ診ス時患者
熱勢劇甚刺衝咳止ムヘカラス呼吸困難ニ困悩

間斷ナク相攻メ或ハ換ルニ頭眩ヲ以テシ衰弱
已甚頭困重シ譫シ脈疾小ニメ軟尿溷泻布リ舌
苔茶褐色之レニ兼ルニ溶崩水瀉ヲ以テス〇是
ニ於ヤ果決ス生命ノ存亡ニ皈シ瞬時ヲ失フヘ
キナシ〇尿狀尿色及ヒ唉セスメ克ク吸気ヲ為
ス等ニ由テ丈困悩咳嗽吁吸ノ疾患真歇衛ヨリ
来ラサルヿ顕明ナリ〇生カノ沈窩此時ハ経已
甚ノ地浮自他ノ衰弱ノ増進スル等医家急務ノ
正候ノ備々リ〇故ニ小量ノ杞歛児散ヲ投シ粘
滑ノ瀉腸ヲ行フ〇尓后安静スルヿニ時間或許

小疾ニメ間歇アレ脈頭眩大便失禁等ヲ発見ス
〇諸後和剤ノ効ナリメテ胸患連綿増長シ悪心
スルホニ由テ心窩中尚刺衝物ノ残在リ胸患及
ヒ神全触覚過敏等持長スル主因トナルヿヲ察
セリ此危険ヲ救フハ亦唯吐某ニ在ンヿヲ知ル
リ〇然ルニ患者甚タ衰弱シ下痢持重スルカ為
ニ敢テ用ルヿ能ハス〇吐剤動モスレハ下劑ト
ナリ至甚ノ衰弱ヲ起ス者ナリ〇因テ之ヲ用ル
前三時ニ小量ノ杞歛児発汗散ヲ与ヘ其操作下

剤ヲ為スカ試ニ而右十斉扣匁毎ニ六氏ノ吐浮
ラ与ヘ次テ同量四回ヲ以テ胆汁様ノ粘物ヲ吐
吐スルコト三回ニ及ヘリ〇尓右安眠スルコト一時
半醒テ右呼吸大ニ寛解シ困苦刺痛亦退散ス
〇次日ニ至ハ些少ノ熱ヲ残シ頭胸共ニ寛解シ
只衰弱ト下利ノ頻キ残スノミ施術ノ後幾ソク
モセスメノ至険ノ患頓ニ一吐劑ノ為ニ安然ヲ得
ル者豈奇変ノ数十ラスヤ〇予今数ニ同性ノ
症ヲ挙ケ等次医ヲシテ
ヲ知ラシメンコトヲ欲ス

数フルニタラス医ヲシテ
声価ヲ得セシメルナリ

〇予カ同校ノ友人年尚次シ文学ヲ活物ニ施メ
実験セント欲シ至遠ノ外國（地名）ニ赴（都スタ）ツトニ至ルリ居ルコト幾クモセメ一高貴ノ為ニ
招ル〇貴官十日未熱性胸燃衝ニ罹レリ同地ノ
一医ニ治ヲ托スト〇新来医ノ右ル在ヲ聞テ其治
ノ工拙ヲ試ント欲シテ急ニ之ヲ招ク〇前医既ニ
刺絡発泡制嫩治法胸部ノ創残ス処ナシト雖モ
寸効ナシ〇患者昏瞳ノ状ヲ為シ喘鳴右テ胸内
窘迫ヲ兼子劇熱治ントス死ヲ促サントス〇新

医尚テ学校ニ於テ腸胃汚物嘔吐ノ嗄気ヲ右シ吐セント欲シ舌上厚ク茶褐色ノ苔ヲ蒙リ心窩膨脹シ動モスレハヤヲ見テ渠テ汚物ナランコトヲ決シ急ニ吐剤ヲ投スルヲ以テ甚多量ノ胆汁様ノ汚物ヲ吐ス遂ニ生ヲ全スルコトヲ得〇是ニ於テ戸儕猫郝縞甚シ将来疾医ノ人望ヲ得タリ

〇大名アル一女戻女ニメ男子ノ位ニ女踐ミ女諦戻ナリ 於テス

〇女戻既ニ十一日来栗疹ヲ挟ミタル 胞嘔瞳ニ罹ル〇医凡ソ当然ノ剤用ヒサル処ナシト雖ス

功無ク危険漸ク迫ルヲ以活路ヲ啓クヘキ無トス〇新来医亦此ニ拾ル患者ノ状態已ニ瀕死ノ衰弱ニ在ト雖尚能ク吐剤万一モ助ケ有シコトヲ謀リ急ニ之ヲ与フ〇患者忽ニ状吐シ次テ快復ヲ誘ヘリ〇又他実験ニ因テ諸胸嘔衝ノ如キハ吐酒石半瓦ノ水毎ニ分ヲ与フル外安然ニメ即功ヲ奏スルノ剤有ルコト無キヲラ證明セリ

〇大抵初回ノ量ニテ発吐シ次テ後下発汗胸部排泄又 安然ノ諸症ヲ起スヲ最モ吹治腸胃汚物ノ症及ヒ許多ノ聖京僕僕痲疹斯等ノ肺嘔衝

ニ於テ甚タ歇当セス
ナフシテ一種胸間ニ応スル劑殊ニ俊功アリト
スルノ治アルニ因テ今脚一般称用スル加鳥
蔑尓モ無益ニ飯スル所アリ是亦人ノ幸ナリ

顔面罹斯

罹斯ノ品类甚タ多ト雖之ヲ療スルノ術大抵下
剤ヲ主トス顔面罹斯ニ於テハ殊ニ之ヲ称用シ別
ニ一種逗茉ノ名ヲ下スノ比症善ク危険ノ極ニ
陟ルアリ○患者若シ劇烈因悶譫妄及ヒ狂躁
ノ症ヲ見サハ丈毒胸中ニ遺フト知ルヘシ○是
ニ於ハ吐剤性命保護ノ第一ナリ○予浴血常習
ノ如クニナリ丈効ヲ奏セサル者ニ於テ吐茉ヲ
與ヘ屢捷来ノ効ヲ取ルコアリ○医顧念ヲ候タ
ス速ニ之ヲ与ヘヨ假見ノ血液蓄積ニ疑ヲ入ル
勿レ一回ニ効無キ者ハ亘ク之ヲ復スヘシ

鶩口瘡スプリュー(アフツー)(嵐)(ラ)

此症亦吐剤ノ緊要ナル胃液ノ変性ニ関係シタル粘液膜ノ矢序ノ作為
ニ在リ○小児ニ於ハ常ニ能ク軽易ノ腸胃清剤
創ニ因テ之ヲ治スト雖固メ症ニ至テハ吐茉独リ

速切ヲ取ルノミ〇大人ノ　病者
亦然リ　　本許ニ於テモ

腸胃咳カストリーストリー

一種ノ咳之ヲ腸胃咳トー名ク腸胃汚物充満顕著
ノ徴ヨリ生ス論ハ汚穢舌苔食欲缺乏悪心ホヨ
リ之ヲ知ルヘシ此症ニ於ハ解熱下ヲ腸胃剤
止咳第一希タリ医動スレハ尋常ノ取京剤ヲ与
モ無益ノカヲ費モノアリ

百日咳

此咳ハ素燃衝様ノ病ニ非ス又腸胃ヨリ来ルニ
非ス予已ニ四十年前證明スル如ク心近傍ノ神
経叢及ヒ肺神圣ノ一種傳染様脞挛様ノ神圣病
ニメ丈始メ恰状燃衝様ノ感覚ヲ見ワシ尓后漸
次ニ自己ノ真性症挛様ノ裡圣症ヲ取所謂両部
ノ粘液分泌ニ一種ノ運営ヲ起シ丈久泌ヲ増進
シ重厚ヲ致サシムル〇是ニ於テ吐菜ノ主余タル
ヤ二尚ノ目的アリ第一ニ症挛様ノ性ヲ鎮静スル者
カノ消毒性アレニ由ル第二ニ甚タ舷ノ蓄積粘稠
ヲ排除シ粘液分泌ノ機ヲ変革スルニヨル
此等ノ事煉熟ニ因テ舷ク證明ヲ為スヘシ〇枚

与ノ吐剤常ニ一二日間軽状発作ヲ改ム○若シ
適当鎮痙剤及ヒ皮表刺戟剤ヲ用ユルノ外吐茎ヲ
交換シ与ハ軽状ヲ営ハヽ常ニ速ナリトス

肺労瘵

一般肺労瘵ノ症ニ於テハ吐剤次ノ適当ノ剤ニ外
ス独リ「エンナルス」人礼度甚々之ヲ緊要ナリト
称ス○其嫩衝性ノ種類及ヒ其発作頻数ヲ蹈ノ
症及咯血ノ素因アレ者ニ於ハ此剤害ヲ与ルヿ
甚々速ナリ然モ又之ヲ用テ利益アルヿ両時有
「第二」膿様肺労瘵嫩衝様ノ諸症ナリ疼ノ排世難
渋之ヿ為ニ咳嗽困悶増進スルヿ漸次ニ与ヘル
吐剤甚々軽快ヲ奏ス
并ニ粘液肺労瘵所謂腸胃咳ノ如ク(此咳肺労瘵ニ時々粘
搏ス)其ノ飲食消化善ク糸梳ノ失常及
蓄積ヲ受ルオヨリ来ル者○予這般ノ症ニ吐剤
ヲ反復シ用ヒ甚々顕著ノ効見タリ○巨細我
カ書中ニ記ス就テ見ルヘシ

喘息及窒塞咳

喘息ハ危難ノ病ニ属スルヿ人皆之ヲ知ル此症
赤吐剤ノ功アルヿ他ノ諸薬ニ越タリ○湿生粘

液様ノ喘息ニ於ハ吐劑恰モ適当セサルカ如キ
宝モ漸次ニ之ヲ與ルキハ
ス〇乾性症孿様ノ喘息ニ於テハ我カ見知スル
諸菜中吐剤ノ右ニ出ル者ナシ尚頻劻ヲ為シ患者ヲメ瞬間ニ危険ニ至ラ
シムル如キ症ニ於ハ最聖剤トス〇ア香耳永ヲ
用ヒ寸験ナキ后吐剤ヲ與ヘ尚能症孿ヲ鍼止シ
快後ヲ誘フヲ実験セリ
〇窒息咳肺藏ノ症ニ於モ吐剤又上下ト同ク相
当ス肺ノ麻痺ハ卒中ノ症ト大ニ初ヒ唯卒中ニ
於テ脳神経ヲ痺ヲ受タル異ナルノミ故ニ室塞
危急ノ時ニ及ヒ呼吸甚々喘鳴スルト雖脳中
及ヒ神識ニ従テ些少モ碍サルヽ処ナシ〇是
ニ於テハ先刺絡ヲ施シ后吐剤ヲ与フヘシ奏
功甚々大ナリ

痢疾及泻症

痢疾ニ於テ吐剤ハ痂初ニ与ル吐根ヲ以テ止ト
ス〇予屡此痂ヲ治スルニ初メ吐根ヲ与ヘ次テ
小量ノ阿片ヲ混シタルアラビヤコム乳剤ヲ投
スルノ外他要用ノ品有ルヿナシ而メ常ニ最初

ニテヲル吐剤術上ニ禍益ヲ恵ヒ不日ニ落城ニ至ラシムル若シ之ヲ急ラハ他ノ如ク捷速ノ功ヲ奏スル良剤有ラサレハ〇若シ又之ヲ用シト欲セハ瓜ク吐根ヲ吐酒石ノ上ニ撰挙スヘシ吐根ノ性量ト雖自ラ触ク其効カヲ持久スル者之ヲ加之吐泻ノ症漠々調窒乱所ニ於テ尚且吐剤ノ至要ナルヲアリ〇又症後和剤ヲ投シ極テ速ニ又排池ヲ望ム可コト明ナリト雖然モ或ハ悪心ノ状ヲ抱キ飲食不化ノ性及ヒ胆汁様ノ腸胃汚物性ヲ残留シ又胆汁蓄積更ニ排池ヲ企ツヘキヲ證ス

ルアリ間又吹状ニ吐剤ヲ与ルヲ外捷速ニメ又全功ヲ取ノ術有ラサキヲ証用ス

僂麻質斯

余僂麻質斯ノ症ニ吐剤ヲ与ルヲ僅ニ実験スルヲ得若ハ系吹症ニ他ノ茶剤ヲ相当トシ用及飲食消化ノ机ニ緊張衰弱等ヲ起サシムルヲ要セサレハナリ〇予今ニ至テ吹症ニ先他ノ論剤ヲ試ミ又奏効ナキニ及テ始テ吹療法ニ赴ルヘキヲ説クト雖吹剤常ニ先ク黄重飲食ノ実験ヨリメ僂麻質斯ニ吐剤ノ効カヲ逞スル

フ確定セリ

發狂

予発狂ノ症ニ用ル諸有形剤ノ中最モ其功カラ
ス星スル者ハ吐剤ヲ以テ寒涎法ノ匹敵トス〇脳
ノ病様ノ運営ニ於ハ吐剤亦一有力ノ適剤ニ故
ニ凡神精ニ関係スル脳患殊ニ剤志肯憂状ノ脳患
若シ胸腹内ニ在ル神圣ノ甚シキ不運営不知覚
ト繋累スルト愈ス明ニヲ其失常ノ平均運営ノ癡
鈍ノ所云発狂ノ宗源ト十ルト亦益顕著十ルヲ
如シ
其平均ニ従シ運営ニ倫次ヲ得セシムルト甚

タ所ヲ得タリト云フヘシ〇旦吹ニ一事得アリ
人甚タ之ヲ顧念セハ譬ハ胃神ノ至要ノ如シ吹
神餓ニ由テ或ハ食欲悪心等ニ因テ其至要ナル
トヲ発明スル〇吹餓ノ感覚ハ至強感覚ノ一トス
甚タ極度ニ至テハ暴甚ニヲ全肥ニ透徹シ加之
狂妄癡惑シタル精神ノ中マテ襲入スル感覚ト
ナル十リ発狂人ニ脳中ニ知覚ヲ厳ニ食餌ヲ減己シヲ飢ヲ
起サシムルモ吹理ニ原ツク
〇然ル所以ノ者ハ凡ソ人ノ陰具管能及ヒ其他活
物操作スル者ノ官能減吹ノ胃神ト陰具ノ神ト
ニ在レハナリ〇故ニ発狂人ノ精神ノ平生ニ挽

卒中

卒中ノ症其脈尚実顔面赤色刺洛ノ急務タルヲ見スノ間ハ厳ニ吐剤ヲ禁スル如ク若シ這般ノ症絶テ有サルキハ急ニ之ヲ舎スヘシ然ルキハ有カノ刺戟発揮ノ剤トナルノミナラス屢尚触ク効験ヲ奏ス○然シ此症ニ吐剤ノ誤用テ為サハ患者ニ大害ヲ与ヘ死ヲ促ニ至ル故ニ之ヲ用ル時ニ這忘スルキヲ定ム

第二 卒中ノ症腸胃汚物ヨリ来リ諭ハ食後胃ノ

而シ人事ヲ省シムルノ第一緊要ノメ常ニ唯々確乎トメ飢ヲ与ル術ニ在ト○然ニ悪心吐ノ如キ亦此胃神ニ於テ同種ノ則ニ丈操作ヲ為者ノナリ「シュトセル」各人ノ眩已来此理ニ従テ幾多人カ甚々幸ヲ得○予実験ニ因テ全ク此事ヲ確定ス○神思爵憂ノ症狂妄ノ症及ヒニ於テモ吐剤甚タ切カヲ逞ス○此ニ又自久ヲ好ノ症アリ予此症ヲ見ルノ漸次ニ三度ニ迫キ又此亦吐剤ト同時ニ与ヘシ加刺狄阿剌中和塩ヲ用ヒ目久ヲ好ノ思考頓ニ止シ術上大幸ヲ得

飽満或ハ悪心吐汚穢ノ舌苔等ヨリ発スル者ニ於テ吐剤ヲ与ヘルヲ術中第一事トス○若シ其肌尚実ナルカ或ハ灵血須ノ人ニハ第一刺絡ヲ施シ而后ニ吐ヲ与フヘシ

第二 灵血卒中ノ状喚醒スヘカラサル時

第三 神圣性ノ卒中初ヨリ肌 而弱面色赤豊大ナラス却テ惨澹萎痛スル者○於是ハ艾術亦吐剤ヲ急トス○上ニ所云卒中付テ論スル事件諸種不仁ノ症ニ於モ同ク適当ス○不仁ノ症ニ吐剤オ一而カノ品タルヿ屡見知スルヿナリ

假死

初生児ノ衰弱抑厄サレタル生カヲ興奮発揮セシムルニハ予カ説ト実験トニ因レハ吐剤ニ如ク者有ルヿナシ○何トナレハ是ニ於ハ百事只吁吸善ノ運営ト初生ノ血液循環ネトラ発動セシムルニ在ルハナル吐剤ノ刺戟ハ血ヲ横膈膜胸筋心肺等ノ上ニ運営ヲ起シ吐ヲ発スル器械不運営ノ者有ヲヤ(刺戟ニテ見リ生シタル窒塞ハ大抵初生児自ラ排除スルヿ能ハサル粘液ノ蓄積ヨリ外ナラス故ニ我カ術

亦只其吐剤ニ因テ気管中ノ粘液ヲ消散駆除ス
ルニアリ然ルニ次ノ初生児ノ生カ喚醒剤一ノ
剤ヲ顧念セサル者ヲメン嘆スヘキノ甚キ予此理
ニ因テ大ニ吐剤ヲ用ルキ命ス〇上件確定ノ乃ニ
証明タル一実験ノ挙〇一貴婦已ニ児ヲ産スル
不幸タ得ルフ二回ニ及リ其児強壮ヲ具有スト
雖毎回生カヲ全フセスメ生ル〇其児絶ヲ高声
ヲ発セズ偏之レヲ開クモ微々トメ唖スル如キ
ノニ吁吸モ亦知得スヘキナク女時ヲ歴テ転テ
死ニ至ル〇良医俊烈覚醒ノ諸剤浴湯空気ノ吹
入摩擦洗滌灌腸等残ス所ナシト雖モ絶テ其功ヲ
見サヽリシ〇希望シタルヲ以為ク尓来ノ事跡吁吸障碍ニメ吐
剤ヲ用ユヘメ症ナラン〇児幸ニ容易ク分娩セラル然レモ前回ト諸状
異ナラス絶テ啼位ヲ発セス吁吸ヲ起コサス祐
嚮言ノ唖スルカ如キヲ聞ヘキノミ〇予即刻児
ヲ徴温湯ニ入レ一氏ヲ吐根及火ノ加密列斐ヲ
加タル海葱醋ヲ送下セシム　密扣馬ヲ歴テ后
又次諦件ヲ行ノ而后始テ布カノヒヲ発シ粘物

ヲ吐出シ血ニ沾滓ノ啼泣ヲ発シ呼ヒ現ハシ児幸
ニ救ハル〇此ノ如ク百事俊効有リテ此児今ヤ
健康ノ一大丈夫ナリ
大人ノ仮死ニ於テ此鴻益ノ剤小児ヨリモ尚妥
ク用ヒスンハアル可ス〇上ニ記載スルノ理ト
其近傍ニ起ル刺戟トニ因テ運営ノ中ニ誘セシ
メ及肺ヲメ毒物ヨリ寛解セシムルカ為ニ窒塞
シ其嗌下囲雍ナル底ノ状顕ハル、ヤ否ヤ血ヲ
シ其嗌下囲雍ナルキハ静帆ヨリ之ヲ射註ス可

小児病

小児ニ治療ヲ施ス諸某ノ中ヲカ説ニ因レハ吐
剤ヲ以テ諸某ノ右ニ出サント欲スル〇小児ノ病毒
ハ大抵胸間對神全及ヒ心辺ノ神全叢ニアリ爰
ヲハ有形毒ナリ〇小児疾病ヲ起スハ実ニ此神
全上ニ起ル諸運動一般確乎タル功カヲ全躯ニ
及ス者ナリ〇小児ノ吐ハ大人ヨリモ却テ容易
ナリ〇予此論件ヲ実験シ得ルコ勝数フヘカラ
ス此幸ニ嫌熱シ得タル者ニ就テ一巻ヲ着スモ
又難カラス〇予幾度カ最初ヲヘタル一吐剤ニ因

テ小児ノ劇痙ヲ瞬間ニ退却シ屡ノ喉咽ノ病感ノ初起ヲ防止シ劇甚ノ咳嗽他某ニ因テ除キ難キヲ制止シ吐及ヒ赤下剤ノ症ヲ治之加之脛拳ノ症丈源ヲ助間ノ神経統ニ取ルヤ真チニ亦能ク之ニ鎮伏スルヿヲ得メリ〇余カ多年治療場ニ於ル終末ノ煉熟ノ効ハ尤ノ如シ〇若モ小児殊ニ一歳ノ児痙病ニ侵サル兼ルニ食欲之缺古苦ハ汚穢ヲ以テ之尚且児己ニ自ラ吐スルカ或噯気及吐セントス欲スル等ヲ発見セハ決テ吐剤ヲ怠ラス人能ク此剤ヲ用ヒハ丈益鮮カラス術モ亦之ニ由テ落成ニ及ヘシ最初ニ之ヲ用ルヿヲ怠ラハ後他某ノ能ク丈損ヲ補フ処ニ非ス況遅期ノ用ヒヲヤ〇若此ニ兼テ咳嗽及呼吸ノ疾患現在セハ亦ク此剤ヲ怠ルヿ勿レ此症屡能ク此剤ニ由テ排尓セラル〇予只小児昏睡ノ症ヲ恙メル痙ノ為ニ侵サル、時ハ之ヲ禁ス〇於是ハ医常ニ丈部ノ血液蓄積トシ尚恐クハ嫩脳水ノ初起トメ見ルヘシ故ニ吐剤ハ妨害ヲナスヿ明ナリ〇然シ丈他ハ小児ニ於テスルキノ努力劇甚ヲ恐レ亦之カ為ニ生スヘク見ル欤部ヘノ

蓄積大人ニ於ハ卒中状ヲヲ恐レ吐剤ヲ用ルヲ
忌ルヘカラス○小児ニ於テ丈吐大人ヨリ却テ
容易ク幼ナルニ従ヲ愈然ナリ○然レ共吐ヲ起
スヿ三回或ハ四回ニ過ヘカラス吐剤モ軽易ニ
メ煮テ稀粘鍼痰ノ品ヲ撰ムヘシ○至小児ノ如
モ状吐ノ状現在セハアミレ多ヲ加ヘタル海葱
醋ヲ以時毎ニ一茶ヒヲ与ヘテ次ヨリ粉大ナル
児ニハ海葱醋ト吐根トノ混和舎利別(別ク溶解ス)剤糖液ヲ為シテ
起コス非常ノ吐ヲ与ヘ(ト)リ
ハ次方ヲ可トス

吐根 各半ヲ

海葱醋 覆盆子舎利別 清水

右混和シ八分取毎ニ一茶ヒヲ用ヒ吐ノ起ル
ニ至ル而メ之レカ為ニ常ニ屡相従ヲ操ヲ候
テ四分取ヲ経テ自他ノ吐来ラサル者ハ尚一
茶ヒヲヲフ○次方ヌクハ一歳ノ児ニ相当ス
大児ニ於テハ四分氏吐酒石ヲ剤中ニ加ヲ可シ

毒嗽下

凡毒物口ヨリ入タル者ハ近路ニ後ヒ再ヒ之ヲ
口ヨリ漏池セシムヘキヿ自然ノ理ニメ且才一

ノ思考ナリ○加之此理ニ因テ跼蹐ナク毒尚胃中ニ在ンコヲ察知セハ常ニ催吐ノ術ヲ企テ自然良能ニ擬ルト云ヘシ○然レ共ニ二箇別アリ其一時トメ酷厉烈禁毒ノ用ヒノ后ニハ吐劑甚後恐ルヘキ苗トナリ予只乳剤及油類多分ノ投与ヲ由テ其酷厉ヲ保護排泄スル外カ為スヘキ所以ヲ知ラス其二時トメハ吐絶テ現レハ催ニ悪心ヲ現スアリ此ノ症殊ニ痲痺毒ニ由テ起ル胃ノ知覚亡失甚タシキハ吐酒石ノカ及フ処ニ非ス尚強壮ウヒットリムシンキニ拠テ効ヲ取フアリ○如此時従令マークギンブ(胃ノ筋ヲ駆逐スル水物ノ如シ)吐剤ニ代ルノ説アレモ時ヲ歴試験ノ積ニ非サルヨリハ未タ丈果テ可ナルヤラ知ラス予以為ク毒既ニ胃ノ漾囲雛襞間ニ因着スル者豈一器械ノボンブノ及ブ処ナラスヤ只胃ニ固布ノ箔張カニ因テノミ触ク此ノ排斥スベシト

越而実紀集録扶氏各病吐剤実験説終

諸病疾ニ沃実烏謨ヲ用ル治驗

尼那別尓氏ノ至驗ニメ首
十年二百三十四葉ニ出ツ

沃実烏謨ハ巴
人名千八百十三年初テ之ヲ発明スル尓後舎察家相
継テ其製法益精微ニ至ル

此元素ハ謝当健ノ如キ諨種ノ海草殊ニ扶歴私
歇矢厄鳥千私実芝答扶私律行私薩加里杜斯加
尓質芝涅烏斯篩蒲剌那刷烏斯菲預福尓密私等
ニ之ヲ含ム又烏尓華類海綿海水硫黄水坑水等
モ亦此元素ヲ有ス〇後世之ヲ検査ニ尚鑢扁及
ヒ海獃モ此原素ヲ有スルヿヲ発明セリ

沃実烏謨ハ酸素ニ親和シ酸ヲ生スルノ性
ヲ有ス〇其酸ヲ生スルヤ水素ト親和スルヿ甚
シキヲ以テニコレヲ亜矢儒謨歇独魯汝実厄謨
名ク〇此物諨元素ニ飽和スルキハ中和塩トナ
ル其灰汁塩ニ飽和スル者ヲ歇独魯汝達私剥灸亜
私及ヒ曹達ト名ク専テ医茉ニ供ス〇水銀亜鉛
鉄等ニ混和スルモノ各其主用アリ

海綿霜及ヒ諨海草灰ニ療癘病嗌下妨碍症腺病
ニ屢効ヲ為スヲ実験ス其功莪那塩ノ間歇熱ヲ

ニ卓効アル拾尓列氏魯刷児氏ノ二家之ヲ論示セリ○癆露腸間　腺ノ豊大ヲ兼ル者肺ノ結節腟及ヒ労瘵ニモ亦効アリ「ベロン」氏曰ク此剤労瘵ニ功ヲナス者ハ其初期ニアリ既ニ時期漸ク進ムモノ者未タ効ヲ見スト

乳瘵及他ノ頑硬腟鶏僂児様ノ潰瘍ニ之ヲ用ユ或ハ全効ヲ奏シ或ハ快復ニ赴クモノアリ

麻健実ハ曰ク舌上鶏僂児様ノ潰瘍経久治セスシテ病院ニ在テ不治トナシタル患婦ニ人ニ汰実烏謨ヲ用テ全治セリト○亜別氏舌瘍腟ニ之ヲ用テ治シタル説ニ云ク

一男子齢三十九歳舌及ヒ下頭腺ノ頑硬腟ニ罹リ其舌豊大ニシテ平塌ナラス截断術ヲ行ヒ言語嗑下共ニ困難灼ガ如キ酷厉液流出シテ休時ナシ仍ヲ在ノ方ヲ処シ左

汰実烏謨丁幾　一弐
薄荷水　ニ弐半
橙皮　洒石葉液各ニ弐
右調匀シ二茶ヒツヽ左ルヿ日ニ四次或ヒハ六次

○腺ノ頑硬ノ部ニ汰実烏謨軟膏ヲ捺入セシムル

○又二三日ヲ過ルノ右尤ノ合嗽剤ヲ与フ

歇痴魯汰灵剤萬無斯　半戔　黒櫻実水ニ弓

酒石案液　玫瑰密　各半弓

右調匀ル含嗽剤トナス

右ノ方法ニ由テ頽硬疼痛著シク減ス舌軟ニメ運轉ヲ安ンノ遂ニ四週ノノ快復シ病院ヲ法ル

麻児蒲尓屈地名侍医鳥尓満人名歇痴魯汰灵斯半戔ニ家猶脂一弓半ヲ和シ軟膏ヲ製シ鶏屈児様ノ潰瘍殊ニ他茉ノ絶テ功ナキ症ニモ之ヲ称用ス○又子宮硬結瞳及ヒ摂護ノ暢屈児ステニ一次膀胱截刺術ヲ行ヒシ者ニ注射メ大功ヲ奏セリ此剤梅毒ニ用テ功アルト上症ニ異ナラス○撒児列氏ハ尤罕ナノ淫久頑瘤ニ用テ之ヲ治セリ○淋病便毒ニ俾効ヲ奏セル人アリ

白帯下或ハ月経過併ニ用テ有カノ剤トス又タ蒲列剌君ハ疾血殊ニ月経過併ノ合併スルモノニ称用セリ○水腫麻痺輪麦皮膚潰瘍等ニモ功アリ当今健灵林氏痛風症ニ之ヲ称用ス○密而倪氏ハ肝脾ノ肥大ニ称用シ加尓的尓氏ハ遺尿病二人ニ用テ効験ヲ表ハセリ上ニ挙ル諭疾

患ト汝実烏謨ノ効カトヲ熟考シ又煉熬ノ諭家
ノ如ク適当ニ之ヲ行フキハ癆瘵膣ヲ治スル
休メ却テ又害アルヲヲ免ニ論示セントス蓋シ
艾心ヲ用ルヿ勿々ニメ大量ニ之ヲ用ユスキハ
諭家ノ説ノ如ク毒ニ害ヲナスノミニメ功アル
ヿ絶テ之レナシ
此剤ニ由テ起ル所ノ害ヲ防ントセハ某剤ノ人
身ニ効ヲナス如何ト美思フニ此剤ノ効カニ道ア
症如何ヲ知ルアリ余嘗テ
リ才一小量ニ用ルキハ消化ホヲ憤起シ食気ヲ
進ム然レ𪜈大量メルキハ他ノ酪厉毒ト一般ノ
害ヲナス才二血液ノ運行ヲ進メ身体ノ溷煖ヲ
増ス〇水脈諭ニ一種ノ刺戟ヲ施メ艾運営ヲ
元フシ吸収カヲ増進セシム〇此剤謨用スルキ
ハ艾効著シク神全ニ及ヒ下ニ胎明ナル悪性ヲ
発現ス然レ𪜈細心メ之ヲ用ルキハ艾茉毒頗ル
著シカラス
艾量ヲ漸次ニ増加シ特重スルキハ之ヲ休ムヘ
キノ景況ヲ発ス格卻特多氏此ノ景況ヲ各ケノ
飽和トナス〇艾景況ハ頗ニ発スルニ非ス漸々

沃実烏謨ヲ持長シ自家ノ諸症ヲ発スルキハ注意ヲ発スル者ト

此剤ヲ用ルノ后自家ノ諸症ヲ発スルキハ注意メ迚チニ後服ヲ止メ水銀剤ノ瞑眩ニ於ル病状ニ従ヒテ再ヒ之ヲ用スヘシ茉劑ノ大量ニ過若ハ長服スルノ后発ル所ノ諸症才一遍中ニ起スル者ノト諭液中ニ吸収セラレテ初テ起ル者トノ已別アリ才一遍中ニ起ル者ハ吐瀉胃痛腸痛下剤頑固ノ便秘ナリ才二ノ者ハ疾脈心悸動悸暈視カ聚起穀多ノ乾喚不寐全身ノ急劇痩乳房萎縮脱カ脚腫戦振等ナリ全ク用法ヲ誤ル者ハ死ニ陥ルヨテウム誤用ニ由テ発シタル上ノ諸症ノ例ヲ掲示スルト雖カラスト雖余自ラ之レヲナスニ至テ少ナキカ故ニ爰ニ之ヲ畧シ女害ヲ防キ既発シタル諸症ヲ鎮静スルノ茉剤ヲ説示スルモノナリ汝実烏謨ノ消毒法トノ唯糊類ヲ称用スルモ乙尓迚児氏曰ク一次年汝実烏謨謾用ニ由テ劇シキ胃痛ヲ発シ恐憂煩悩セリ此症ヨテラムノ謾用ニ由ルノ注意セハ仍茉剤ヲ持童スルニ由テ患者ヶ痩シ劇甚ノ腹痛吐吐

ヲ発シ遂ニ血硬ヲ下シ諸種ノ痙攣来リ脈小且緊ヲ甚数顔面膽膽萎痺セリ○是ヲ以テ阿仙ヲ配シスルキリステールヲ行ヒ然レモ軽快ヲ覚ルヿ少シ故ニ鍼痙茎剤ノ胃部ニ施シ浴湯ヲ行ヒ終ニ阿芙蓉ヲ用テ諸症鍼静ス然レモ此病態仍誓笛スルヲ以再ヒ大量ノ阿芙蓉ヲ持長シ漸ク快復ニ至ル○尓后患者胃ノ衰弱ヲ覚ユ食毎ニ大ニ笛意ヒリ然レモ「ヨシウム」ノ効ニ由テ療癒瞳ヲ免レ健康ニ復セリト○又曰ク「ヨシウム」ニ由テ発スル処ノ諸症ニハ温浴阿芙蓉粘滑茎ヲ用ト格印圧氏ハ上ノ諸症ニ乳汁殊ニ驢馬乳微温浴阿片艾他鍼痙諸茎ヲ称美セス○私偽密多氏ハ繡単鹿角精菲汰利等ヲ子タリ上ノ諸説ニ由テ大量ノ沃実烏謨身体ニ如何トナスヿ明カナリ○此剤大量ヲ頓服シ胃膜ニ害ヲナスヿキハ粘滑諸茎乳汁又他緩和ノ諸茎適当ナリシ若シ所謂飽和ヨリノ神圣症ヲ発スル着ハ上ニ挙ル神圣剤ヲ要ス

諸家汝実烏謨ノ用ル法差異アリ艾確着シル着ヲ左ニ挙格印氏用法十種アリ則内服外用ナリ

丈外用ト為モノハ之ヲ摩入シ冒ノ妨害ヲ防クヲ
要ス○内服剤歌独呈屋托私剤萬亜斯ヲ蓋鎗水ニ溶ス
ルヲ若或丈切カヲ増シカ為ニ丈溶剤ニヨヂ
ウム一ニ瓦ヲ加ヌルモノ或ハ「ヨヂウム」ヲ亜尓
笵児ニ溶シタル若ヲ用ユ諭ハ左ノ如シ

内服剤

第一単方溶解剤

歌独呈屋剤萬亜私四十八瓦
蓋鎗水一弓
右混和○此溶剤九ヨヂウム三十六瓦ヲ含ム

第二複方溶解剤

歌度里屋剤萬亜斯半戈　ヨチウム六瓦
蓋鎗水一弓
右溶和

第三　丁戒去尓

汰実烏謨四サハ瓦　再鎗焼酒一弓
右混和

諭此溶剤格印瓦ハ大人　於テ十滴ツヽ日ニ三
次乎ヘ一週ノ終ニ五滴ヲ加ス時トメ丈カラ増
スヤハサ滴ニ至ルヿアリト雖モ大量ヲ要スルナ

リ〇此溶剤ハ舎利別或少許ノ砂糖ヲ加ヘタル水ニ溶シ用ユ又アラヒヤウ漿ニ加テ尤モ妙ナリ

外用法

歌独里屋剤萬亜斯羊毛 家猪脂一匁半

右混和為軟膏〇揉実大ヲ取リ朝夕患部ニ摩入ス此用法ハ胃ノ和覚過敏ナル者或ハ内服ニ堪サル者緊要ナリ

蒲尓剌氏ハ上ノ方法ノ外一方ヲ製セリ則ヨケウム六氏ヲ硫酸亜的児一支ニ溶シ用フ此溶剤ハ梅毒ヲ兼子病舎ニ堪ル者稀ナリ又ヨケウムキ氏ヲ一凡ト十

シ朝夕之ヲ用フ又ヨヂウム半戔ヲ家猪脂一匁半ニ和シ此レ膏ト十セリ〇此剤ハ梅毒ヲ兼子タル腺病ニ偉効アリ

薩卯魯乙私名病院ノ医律我児氏千八百廿七年八月十日ヨリ〇同廿八年九月十三日ニ至マテ腺病百余人ニ此剤ヲ用ヒ良効ヲ奏セリ其方左ノ如ト云

内服剤

苛一 蓝餡水一氏
素実十二氏

沃実羊氏　素魯律児

才二　蒸餾水一瓦　沃実三瓦　素魯律児
　　素実十二瓦

才三　蒸餾水一瓦　沃実一瓦　素魯律児
　　素実十二瓦

右調匀十二時間ニ用フ○才一法ヲ常ニ用ヒ二ケ月前ニ才二方ヲ用ルト稀ナリ才一方ニ至ハ患者委々要スルヘ非ス又又量ヲ増加スルト絶テ之アルヿナシ

外用剤トシテ屢々瘙痒ニ注射シ或ハ眼剤ニ用ユルニ左ノ如ク溶解シ供用ス

才一　蒸餾水一瓦　沃実二瓦
才二　蒸餾水一瓦　沃実三瓦
才三　蒸餾水一瓦　沃実四瓦

頑固瞳ニ摩入シ或ハ潰瘍ニ数スルニ左ノ割ヲ良トス

才一　家猯脂二瓦　沃実剥篤亜斯四分
才二　家猯脂二瓦　沃実剥篤亜斯五分
才三　家猯脂二瓦　沃実剥篤亜斯五分

右混化膏トナシテ入法外敷但二十二時間ニ一次行フ汰実烏謨製剤ハ上ニ掲示スル分量ヲ以テ確定スルカ故ニ余爰ニ更言ヲ賛セス然レモ漸ク増量倍加スルニ有サレハ的切ヲ奏スルヿ能ハサルト云者アルヲ以再監メ言サルヿヲ得サルナリ○余験スル処ノ一病人アリ歇度里沃拉斯剤萬亜私丁幾三十五滴ヲ服セシメ未功アラサルヲ以テ漸ク増加メ六十滴ヨリ廿余ニ至リ日ニ三次与ルニ亜症少シモ発セサル者アリ

余カ思考ヌル所ト衆医ノ説ト全ク差異アルヿナシ亡健氏ハ歇度里沃拉斯剤萬亜斯溶解ヲ毎回三戈ヲ用ヒシヿヲ説明シ特律剛児氏ハ一婦人乳癌ニ汰実烏謨ヲ日ニ三氏ヨリ三十九氏マテ加用シ二ケ月ノ間ニ一千三十氏ツヽ八日間特重セシト雖モ見ハレストニ云フヿヲ実ニ体止スヘキ症ヲ発ス○然格印氏歇度里屋剤萬亜私溶剤ヲ一男

子ニ十滴ツヽ日ニ三次与ヘシニ五日ニシテ已ニ
功カヲ現スル者ヲ見ルトキハ是ニ由テ之ヲ見ハ
久々感応機ノ異ナルニ由テ茉莉ノ功カモ亦違
ミアルト明カナリ故ニ此剤ヲ用ヒント欲セハ
其カヲ障碍スル諸事ニ注意シ又患者ノ年齢性
質等ノミナラス尚之ヲ用ヒ雑キ他病ノ合併ヲ
才一ニ現除スルヲ勒ムヘシ
此剤ヲ禁止スヘキ諸症左ニ列挙スルカ如シ姙
婦子宮ヨリ血ノ素因アル胸病ノ恐アル者アルヘハ
キ之ニ罹ル者消耗病遷延熱体格薄弱神生性
或ハ衰弱甚キ者皆之ヲ禁ス○コノ剤ヲ瘰癧ニ
用ヒント欲セハ病気管腺ニ在テ痛ヲ伴ヒ周縁ノ
蜂窠質ニ在ラサル者ヲ撰ムヘシ扶歇蘭土氏ノ
説　瘰癧瞎痛疼アツテ肌管茶筋刺衝機高進ヲ
兼ル者ハ此剤却テ害アリ○全ヨヂウムノ説ヲ
上ニ挙ケル如ク此剤時トメ害ヲ発スルヿ明カ
ナルヲ以テ尚細心メ法則ヲ確定スルヿ固ヨル
蛇足ナラス
汝実鳥謨ノ過症アリト雖モ々ニ診スルヿ能ヲ
サル患者ハ之ヲ用ル勿レ○病ニ因リ日ニ診

ヲ要セサル者アリト雖モ怠テ診察ヲ施スヲ勿レ○
既ニ某剤ヲ与ル者ハ毎ト二汝実鳥謨ヨリ涵発
スル傷症ニ任意ニ若シ飽迄フル者ハ遽ニ従服
ヲ止ムヘシ○余禁止法ニ説示スル支仆殊ニ壮
婦ニ在ハ細心ヲ之ヲ用ルヲ緊要トス○処女ニ
在テ極テ止ムヲ得サルニ非レハ之ヲ用ルヲ
ヲ禁ス左ニ掲示スル某乳状歇蘭土ノ治例ノ如シヨ
ヂウムハ乳房ヲ萎萃セシムルヲ以テナリ
扶氏曰一女子サ歳体格偏倚ナラス瘰癧膿ニ罹
ルヲ以テ之ヲ消散セシメン為ニヨヂウムヲ我

ヲ特長スルヿ凡六ケ月ニメ冗症治スト雖乳房
萎萃スル○某剤ヲ止メテ服スト雖乳房日ニ縮
小シ二年ヲ過ルノ后乳腺丸モ蹤跡アルヿナシ
女子此剤ヲ要スル者ハ歇士魯汝杷私ラ用フル
優レリトス聖戒氏ハ此剤萬亜斯ニ由乳汁ヲ変
施スル者ヲ見スト諭明皆ヨリ少ムノ功害ヲ概
論セシニ由ニ余カ実験ニ益アリ此以テ患者ヲ
健康ノ城ニ跻ラシム実ニ大幸ト謂ヘシ

汝実鳥謨製法

ヨヂウムハ千八百十三年ニ方テ巴里府ノ医格

尓灵乙私ナル荊始メテ発明ス読テ柁吉及尾乙
律薩屈孝艾負ノ何物タルヲ検査セリ○ヨヂウ
ムハ素儒誤或ハ剥萬亜私ト供ニ海草及ヒ海岸
諸草ノ灰中ニ含蓄ス故ニ此諸草ノ灰中ヨリ製
造スル荊ナリ○艾焼灰ヲ水ヲ溶シ沪過メ之ヲ
蒸発シ而ノ芒ノ結ハシムル此ノ如クスルコト三回
ニ艾剌液ヲ瘁ル此液ハ汰土素冒謨ソートノストッ
ヨテニムシコーソーメ硫酸石灰硫酸剥萬亜娚食塩含硫汰実鳥謨
炭酸需達等ヲ含ムカ故ニ未タ清潔ナラス故ニ
此剌酒ニ上好ノ硫酸ヲ混シ蓋キ坩堝ニ蒸レハ

含硫黄水素瓦町及ヒ塩酸瓦娚騰去ス艾后此酒ヲ
蓋餾器ヲ移シ酸化満淹ヲ混メ微火上ニ煖ムレ
ハ満淹ノ酸素需冒謨ニ含メ需達トナリ忽チ酒
中ノ硫酸ニ溶解シ爰ニ於テヨクラウム氤氳遊離
メ水気ト倶ニ蒸騰メ冷ニ従テ餾器ノ裡面ニ凝
着スル色剛鉄ノ如ク且鑛輝アル芒ヲナス○此
芒ヲ集メ無糊ノ紙間ニ挟ミ乾シ尚一回周
封シタル小蓋餾器ヲ以テ之ヲ蒸升スヘシヨテ
ラムヲ得ルニ海蕈ノ母澥ヲ蓋乾シ硫酸少許ヲ
註テ微火ニ上テ所及カ塩酸ヲ分析シ艾石酸化

滿俺ヲ加テ攪擧ノ並鍋曼ニ入レ再ヒ硫酸ヲ稍
多量ニ注テ火ニ煖ムレハ忽菫紫色ノ美烟起ニ
列萬児多ノ頸及ヒ並鍋器ニ凝集又

第五章

再種痘ノ此例
日上ノ次第ハ千八百廿三年布魯乙尓所
回陳中ニ於テ驗スル処ニメ魯蔑乙尓人
名ノ集錄セリ

軍陳ニ於テ牛痘ヲ種ルノ法千八百廿一年以来
稍ニテ同三十三年ニ至ハ益称美メ止マス同年
種痘スル所ノ者ヲ算スルニ四万八千四百七十
八人ナリ是レ皆原ト種痘ヲ行フ者ニメ痘痕ア
ル者之レ無キ者トアリ則左ニ列スル如シ

○痘痕明カナル者

三万七千二百八十六人

○痘痕明カナラサル者
七千六百四十一人

痘痕全ク無キ者
三千五百五十二人

右ノ人数ニ今種痘ヲ行ヒ又経過ヲ記ニ列ス
ル左ノ如

○経過順正ナル者
一万五千二百六十九人

○経過順正ナラサル者

○痘感セス者
二万一千六人

痘感セス者ニ再ヒ種痘ヲ行ヒ又経過ヲ左ニ
列ス

○痘感スル者
七百八十四人

○痘感セス者
三千三百七十七人

種痘ノ数廿箇ヲ以テ行セシニ奥痘ヲ得ルノ
数左ノ如シ

〇一箇ヨリ五箇マテノ痘ヲ発スル者
六千五百八十六人
〇六箇ヨリ十箇マテノ痘ヲ発スル者
四千八百五十四人
〇十一ヨリ二十マテノ痘ヲ発スル者
六石十二人
千八百三十三年以前ヨリ回年ニ至ルマテ種痘ニ感スル者再ヒ偽痘ニ感スル者又ハ偽痘真痘ニ感スル者ヲ左ニ例ス
五十四人

〇フリアオロイテスニ感スル者
五十人
按ニフアリオロイテスハモストニ所云ゲウエインフテボッケンヒナリ此痘ハ軽近ニ至テ初テ世ニ知ルヿ也ト雖ニ多ク類形状自然痘ニ似スレハ危険ヲ免ルヿ能ハス又詳ニ比スレハ大人ニ取テ自然痘ニ感スル者ハ小児ニ感スル者ヨリ他意ノ痘瘡ニ傳染スルヿ明カ也

〇自然痘ノ感スル者
二十人
右牟ル事件ニ由テ緊中医ハ種痘ニ勉強スル所以多ノ妨碍アリテ全功ヲ収ムルヿ少キヲ知

ル殊ニ千八百三十三年ニ於テハ才一ハ新軍
卒ノ陳中ニ未ル一常ヨリ晩ク軍事ヲ習フ時
短キヲ以テ之ヲ遺イテ身ヲ医ニ託スルヿ能
ハス才ニニハ種痘ヲ行フ可若数多ナルヲ以
痘ノ列謨葦ヒイムバーヲ云ク殊ニ才六隊
ノ軍卒ニ於ハ廣ノ再種痘ヲ行ンヿヲ企テシ
ニ障碍布テ行フヿ能ハサル者タリ爰ヲ痘ヲ
種ルル小児ノ数少ナリ軍卒ノ再種痘ニ用ヘ
キ列謨巴之キヲ以テ止テ得ス軍中医事ハ
針金鉄鍼或ハ硝子板間ニ貯タル乾痘ヲ以テ

種痘ヲ行モノニハ大人ヲ形状経過正シキ爰
牛痘ヲ用ヒ再種痘ヲ行フ者ニハ再種痘ノ形
状過正シキ爰牛痘ヲ用ルヲ功要トス
牛痘ヲ貯メル鉄鍼或ハ硝子板間ニ貯タル者
ヲ以テ再種痘ヲ行フニ功ナキ者屋多シ然ル
ニ廿人再ヒ新痘ノ列謨葦ヲ腕ヨリ腕ニ種ル
キハヌハ良痘発見ス
再種痘ヨリ採ル所列謨事ハ初種痘ノ新鮮列謨
葦ニ比スレハ功ニ分レリトモ爰レモ亦少児
ノ新痘ニ用ル再種痘ハ別ニ異ナルヿナシト

云者ナリ再種痘ヲ行タル大人ノ列謨事ヲ以小
児ニ種痘ヲ行フモハ又痘径過正シク牛痘ト又
功同シ何トナレハ又児再ヒ初種痘ノ新鮮列謨
巴ヲ以ヲ種痘ヲ行フニ施テ感受スルアルフナ
シ軍医再種痘ヲ行フニ表皮ヲ刺種法功種法
トヲ施ス者アリ又又他ノ法ヲ行フ者アリ〇上ノ
二法中截種法殊ニ大人ニ施メ益アリトスフト雖
モ梳スルニ差異アルヲ視ス依姑詞倫曰截種ハ刺
種法ニ比スレハ発見ノ数又シト是レ又截口列謨挙ヲ
受クルフナ十分ナラスメ痘毒感受之キニ起者之

越児実戦経験

脊髄神経激衝様

一女子歳ヒオ体質弛緩ニメ脆弱ニ年前痘苗ヲ罹
リ亦九ケ月前重キ神経熱ニ罹ルト雖モ全快
ス五月初旬ニ施ヲ怪中儕　質朴ニ罹ルカ一二
日発汗剤ヲ用ルニ由テ諸症速ニ後快ス〇同七
日患者既ニ臥床ヲ脊ルノ右足ノ大指ニ施テ劇
甚ノ楚痛ヲ発シ同八日朝ニ至リ最早又痛両脚
及ヒ踝部ニ傳達シ過甚ニメ従令柔カニ撫スル

モ忍ベカラスメ身体ヲ少シモ運動スルヿ能ス
患部ニ於ハ腫脹丈他別著ナル変化ヲ見ルヿナ
シ〇右ノ諸症ヲ以テ之ヲ考ヲ窮スレハ此疼痛脊
髄ニ在ルヲ知ル是ヲ以テ水蛭ヲ脊ノ部ニ貼シ
小量ノ甘汞ヲヲヲ〇午后ニ至リ丈疼傳蔓シヲ
両全脚ヨリ腰髄ニ至リ丈疼痛劇甚メ患者號ヲ
愁苦シ恐憂苦酒ヲ摂子顔怒ルカ如ク少シモ運
動スルヿ能ハス遂ニ全ク枕ニ就ク両足ヲ以テ
漸ク辱衾ヲ激揚ケシヲ撫スルニ少モ耐ユルメ
シ〇患者両脚劇痛ニ苦ムヿ最モ甚シト雖モ「破
傷風ノ如ク強直ナラス強ク屈曲スヘシ脊髄ニ
於テモ亦同シ全身ノ搐製スルヿ「エレキヲル」ニ
当ルカ如シ〇顔面熱シ両手寒冷ス脈甚タ疾ク
ニメ弦意識甚過敏ト〆速ニ発狂状トナルヿア
リ脊髄ノ上部全ク痛ナク頭両腕障碍セラルヽ
ヿナシ〇大便軟小便失禁ナラスト雖床中ニ
漏ス丈量甚少シ〇九日早朝之診スルニ「メイリ
チスヽリハリス殊」ニサルヲ以テ脊髄ニ水蛭サニ
ヲ容レ脊椎ニ寒蓯刺ヲ行ヒ

耳汞一氏　右一服ト為シ半時毎ニ与フ
水蛭血ヲ吸フ饒多ク　若四五時間安眠スル程ヲ
疼痛著シク減ス　脊髄ヲ按スルニ漸ク堪ルニ至
ル故ヲ以テ
水銀軟膏　二分時毎ニテ擦ス
〇十日至リ疼痛再ヒ増進ス然レ共前ノ如ク甚
シカラス
耳汞ニ氏ヲ与フト雖便秘スルカ故ニ
甘汞三氏　菊刺也八及ヲ取リ一服トシ一時半
毎ニ與フ此剤ヲ用ルコト三服ニメ大便通フスル
ヲ以テ疼痛漸ク減シ十一日加魯莨児剤一服ヲ
擦キ服痛アリ〇十二日加魯莨児剤一服ヲ擦ク
剤寒蒜剤持久シ行ニ由テ疼痛止シ安眠スルヲ
大脳初テ動ヲ舟体ノ搐搦全ク止ニ患者アヘテ
ヘト景実名ヲ食フ〇夜ニ至リ疼痛著ク発作ス
未詳
ルカ故ニ亦水蛭ヲ施ス〇十二日右脚ヲ既ニ動
カスコト著シキ為テ左脚ノ大脳ヲ動カス〇全身
ノ戦慄及ヒ脈状等大ニ快夜シ大便自在ニ通ス
此夜亦疼痛発スルカ故ニ再ヒ水蛭ヲ行フ〇十
三日ヲ患者大ニ軽快ヲシ背脊ヲ跨居スルヲ得
両脚痛全無ク運動自由ヲ得食気元ニ復シ之ニ

由テ上ニ列挙スル剤ノ量ヲ減シ漸ニ全ニ癒ス
ルニ至ル一二日ヲ過ルノ後臥床商シ速ニ快ヒ
候

○唇腺腫破経験ヒユサヘラント

一男子歳十二歳ノ時ニ歳ノ収誤リ随サレテ下
渉スルノ石口腺劇キ頑硬腫痒癬様ノ疹ヲ発ス
之ニ兼テ唇ノ一箇核着ク豊大ホナリ疼痛擴張
シテ終ニ破潰スル迄ニ由テ挙家内家ノ救葉ヲ
仰クニ至ル翁医竟ニ児ニ治療ヲ託スレモ効ナ
キカ故ニ余ニ治ヲ請フ其症左ノ如シ下唇全ク
頑硬腫トナリ凹凸ヲ彼此破潰シ一種悪ム可
キ粘汁ノ物ヲ益発スノ此頑硬腫唇ノ周囲ヲ全ク
震ヒ歯齦ニ蔓延ニシテ之レラ按スレハ痛鮮シト
雖モ時トメ刺ス如キ痛ヲ覚ルアリト児尓カ
ニフニシテ兼テ全頸腺腫ヲ発シ殊ニ下顎舌腺
腫脹ノ硬ク或ハ彼此破潰ニ及フ物有リ〇余上
ノ外科ニ記シ其部ヲ破潰セント欲スレモ然
カレモ腺固有ノ毒勢ニ由テ既ニ根跼スルヲ甚
シ全唇ヨリ下肥ヲ截リ除リニ非ラサレハ無益

ナリ此載除術ハ景テ行フ得サル也故ニ先ハ
服剤ニ由テ試ンヲ始ム処方

萇荄根　大黄　砂糖　各二匁　右散トシ隔夜
用ユ右ニ至テハ夜ニ之ヲ用ユ

牛蒡根　羊蹄根　羊蹄杜松子　罗羊根　耳草
右飲剤トシ用ユ乳製ノ食餌　左ノ〇八時毎ニ
水銀剤ヲ与フ〇此方法ヲ用ルフ十四日ニメ諭
症ヲモ変化ナシ之ニ由テ前散剤ヲ各二匁量ヲ加
ヘ日ニ与フニアラビヤニハ漿二ヲニ竜脳三弋
容他ノ外部ニ塗ルノ〇此方法ヲ行フ右患者　腫
非常ヲ壅気ヲ発シ項ニ疹ヲ発スル、フ饒炙然レ
モ唇ノ頑硬腫変化スルフナシ却テ粘膿ヲ漏シ
屡出血スノ今ヤ前ノ散剤各四匁増与ヘ兼テ両腕
ニカロウハストヲ貼シ朽膿セシム此方ヲ行フ
佑翌日ニ至リ患者衰弱シ面色惨愴ニメ戦慄ス
前ノ散茶ヲ隔日ニ服セシムレ之ニ由テ通利適度
ヲ得タリ〇十四日ヲ歴歩スルノ佑頭ニ疚癬
ヲ発スルノ甚唇ノ状態自若トメ変セス然レ共
疼痛全ク退リ〇十四日ヲ過ルノ右諭変化ナク
外部ノ結核痂ヲ結ヒ動モスレハ出血シ下顎

腺破潰スルヿ始メ悪性ノ潰瘍ニ変スル前ノ
散禾ヲ止ノ左ノ剤ヲ投スル処方

失　エキス　金硫黄　カロメル　各五分
右九トシ朝夕四九ツヽ一日毎ニ一九ヲ増シ
与フ

前ノ煎剤及打膿法ヲ持久シ外敷剤ヲ止メ三週
ヲ経ル后ヒ丈頑硬腫少ク小ト成リ疼痛減ス常ニ
痂ヲ結ヒ丈痂時トシテハアンルドベシインノ膠
ヲ造セハ脱落ス前ノ九禾ヲ用ルヿ日ニ二次ニ
メ十五粒ニ至ル今ヤ春ニ至ルニ由テ左ノ方ヲ

処ス

蒲公英　蒿苣ゲルホル　砕米菜新綬汁
一杯ヲ飲シメ外用エキスメラクトサテルニイー
鉛酷　亜鉛華　各半分ヲ
テ貼ス

〇次剤ヲ用ルヿ三週持重スレヒ諭症少クモ変
セス之ニ由テ

阿魏　羊泉茎　各五匁
次十ニ味ヲ煎用布連殽挙スル水銀ヒヲ与
フサッサス　耳草　失鳩茗ノ煎剤ヲ与ヘ外用剤

前ニ依ルニ由テ頑瞳大ニホトナル〇上ニ挙ル茉ノ外ニアンヲモニー酒三十滴日ニ日ニ三次用ユレヲ持久スルヿ三四週ニ至ルモ諸症変化ナク硬瞳消散已又頚ノ破潰ノ腺瞳モ亦タ愈ス此ヲ以テ水脈及腺質ニ刺戟ノ効ヲ奏スル茉剤ヲ選用ス即チ礬砂　揮発精十五滴ヲ量ノ水ヲ加ヒ日々三次但シ日ニ四滴ツヽ加増シ与フ煎用松茅一握

右ノ煎剤ヲ与フ此松茅ハ壊血病腺膜ニ卓効ヲ奏フスル者也ビイテンナアト新ノ絞汁一椀毎晨飲シム隔日毎日微メ石鹸浴ヲ行ハシム

吐酒石一又水四匁溶解シ日ニ数回口内ニ含ミ患部ヲ滋潤ス此剤ヤ解凝ノ功最モハゲシク亦患部ヲシテ刺戟剤ト謂フトモ可ナリ

此方法ヲ行フ四週患者著ク軽状シ頑硬瞳軟メ小ト丈痂メ造ルヿ減シ凹凸メ部平塌トナル礬砂揮発精ヲ用ルヿ日ニ四十滴ニ至レヒ患者次モ嫌忌セスシテ由テ遂次ニ増進シ用ヒ患者益状痊シ此ヲ以テ此法ヲ持久メ唇再ヒ恒ノ状態ニ復シ頑硬腺部及ヒ頭腺共ニ大半消散シセリ

コンラシイー曰ク皮膚清潔剤ト名クル者
例スルニ
安負母杜謨硫黄 水銀硫黄合剤ホクスウ
ト サツサフラス サルサハリルラ 牛房根
サリシスアレサリナ 半蹄 杜松木及根及芽
罌半泉荃 楡皮 マセア葉 蒲公英根
葉新後汁 芦根 繁蔓葉 ケルホル
碎米菜 草蓿葉 威模等ナリ
〇月経痂
モ人トヘーステリーノ婦人月至ニ当テ症率ヲ

発スル者ハ月至来ルニ三日前ニカヒメル一氏乃
ストリュニム三九サフニシ二氏ソイケル一支右三包ト
ナシ臨卧ニ加密列漫ヲ以送スス月至来ラサル
間ハアサフーケリヲ持久シ与テ此症妥血ヨリ
来ル者ハ豆部ニ於テハ量ノ血ヲ洩シ脚浴ヲ施
スーボラクス 一支ヨリ 二支マデ 下剤水ヲ用ユ

〇頑痼危篤服水治験

（先ニ発スル服水ハ多クハ危険ニシテ死症ヲ招ク事ヲ挙ル症以病ヲ堅察スル者ノ事ヲ渇示ス）

一翁六十九歳肝藏燃衝ヲ病ミ治療其亟ヲ得ル

モ然モ肝藏慢性燃衝及ヒ硬腫ヲ貼遺シ終ニ服
水ニ轉シ尿固甚シ亘ラス肝部ノ近部疼痛知覚敏
ナルヲ残スト雖モ右ノ丸ヲ与テ治ス　ユレテ
リイセブラルビルレン丸ノ原名
カロースルー丸
ナシ三時毎ニ与フ稀硝酸丸滴ヨリ二滴ニ至テ　右ノ一盞ノ砂
糖水ニ和シ日ニ三回与フ　患部ニ発泡膏ヲ貼
ス
此方法ニ由テ一日間ニ患翁日一日ヨリモ快ヨ
ク肝臓燃衝全ク治ス右両脚ノ腫脹ヲ患ヒ終ニ漸
ルヿ明ナリ此危険ナル為ニ再ヒ刺絡術ヲ施シ
右ノ解凝利尿導泄丸ヲ与フ
アンモニヤーチ　一匁
ヘ子子ア石鹸各一匁　蒲公英エキス
ダラキイルナ二氏未詳　海葱未六氏ビルヘイ
右混和シトハ丸トシ
漸ク増加シ用ユ　杜松子油適亘
外用剤　コロシキハ子丁幾　ジギタリス丁幾
海葱丁幾各半匁
右混和シ一日ニ二三次毛布ニ塗リ水腫ノ各部　硝砂棟発膏　一匁半

殊ニ小服ニテ入ス〇服法方ノ峻効ヲ逞フスル
ノカヲ書顕ハサント欲スレ𪜈紙上ニ尽シ難キ
等ヲ投スルノミ〇浸水ノ量著シク増益シカニ
善キ大便ヲ通ス二ケ日ヲ過ルノ后再ヒ服内ニ
瘕畜セス陰嚢腫モ漸ク除キ両足ノ浮腫消散シ患
患者カヲ得コアク酒ヲ用食嗜迚ス〇原効ナ
キ薄荷モ令ヤ大ヒ布益トナツテ四ニ漸次ニ固
薄ンシ之ニ由テ水腫全ク消敗シ患者分毅大ニ
変ノ快愈ニ赴ク飲食消化大便通利モ共ニ常ノ如
ク庭外ニ倘歩スルニ至ル〇五年間ニ全ク康強
ニ復シ些ノ疾患モナク容顔花麗トナリ遠行モ
倦労ヲ覚ヘサルニ至ル

備考此ノ刺腹ノ術ハ壱一皿ノ効ヲ逞スル
而已ニ非ス他某ト并行フ時ハ此病ヲ根治
スルノ良術ナル1此症ニ於テ徴知スルニ
足〇然𪜈コノ症ニ偉効ヲ奏スル所以ノ者
ハ特ニ摩擦法ヲ以テ巨擘トス如何ントナレ
ハ塗擦法ヲ用ル毎ニ小便分利著シク増加ス
レハナリ尚此以前ニ枚スル内腹方先此ノ
外用法ノ諸剤ト配伍一様ナリト雖𪜈此ノ

加キ俊効ヲ顕サヽレハ十ノ〇小腹ニ施ス
縛帯モ亦外用方剤ノ方ヲ輔ラ殊ニ水液ノ
分泌ヲ促シ亦新漏尚ヲ禦防スル次ノ両効ヲ
具布スルナリ

〇瘀血治驗

一男子廿歳身体強康劇キ瘀血ヲ護タリ〇次患
者瘀血ニ罹ルト既ニ屢々ト雖モ水ナラス故ニ
衰弱スルト雖シ〇今ヤ瘀血二日倘持長スルニ由
テ其ニ親外科ハルトマンニ治ヲ請ス症左ノ如トシ患
者灰白色ニメ臥床ニ臥ス言フ能ハス又瘀血

次ニ漫延シテ全軀水腫ト成リ漸ク小腹膨脹シ
波動ヲ発スルニ至ルニ由テ一年倘利水鮮
疑ノ諭利殊ニ加印加根奥ヲ用ユルト雖モ効ナシ
水腫ノ為ニ死スルノ患者ヲ救フヘキ術窮スルナ
リ諭愈険地ニ陥リ小腹内水液蕩々トメ満腔シ之レ
ニ由テ膨脹大ルト尋常ナラス延テ陰嚢腫脹シ
患翁坐臥立歩倶ニ能ハス次ニ由テ患者ニ刺腹
法ヲ施サントス欲スレ氏翁肯セス由テ懇到告諭
フ漸ク灸術ヲ許ス次術ヤ原ト試験方ナリト雖モ服水ニ罹ルト既ニ
時ニ水ヲ漏スト饒灸ニメ立ムリス桶ノ名

痛ニ及フ故ニ由テ患最大ニ軽快ニ赴ク〇予今
手術ヲ行フ時ノ患翁ノ諸症ヲ腑列スルモノハ水
腫常症ヲ踰テ一層危険ノ状態ヲ知ラシメンカ
為メナリ患者四支膨腫スルヿ常ニ倍シ陰嚢水腫
スルヿ甚タ陳荃嚢中ニ陥甚シカ便ヲ通スル毎
ニ困厄セリ〇夜ニ痉攣約ノ咳嗽ヲ起シ竺水ノ
粘液ヲ吐ス小便吝渋渾濁ニメ大便ハ唯下剤ニ
由テノミ通ス肌膚粗糙ニメ乾燥シ日夜煩渇ス
尓服四支鉛黒色ノ斑ヲ現シ衰弱メ運営妨碍セ
ラル肝臓疾患ヲ患ル最モ著ク終ニ艾極度ニ至
ノ勢桶ノ喘栓ヲ脫スル如ク四支寒冷ニメ脈弱
ク痉攣状ニメ漸ク診シ得ヘシ諸収斂剤頭嚢ニ
寒罨法ヲ用ヒ収斂某ニ浸漬スル柱ヲ嚢中ニ挿入
スト雖モ悉ク効キリメ出血持ス〇辺児路国
妨名ノ方ニ従カヒ二箇ノ撒糸フ把リ艾一ニハ精気
剤ヲ塗リ又一ニハ「ルス」ヲ塗リ嚢孔内ニ深ク納
入シ煮テ孔ヲ前ヨリ厭ヒ之ヲ「ルス」ヲ塗ヲ嚢孔仍止マ
既ニ先地ニ臨ニトス〇因テ陰ノ部ニ寒罨法ヲ
用ルフ一時許ニメ須ニ全ク止ム此ノ法ヲ用ルフ
尚一日ニ及フ〇患者ノ諸カ甚タ脫ヌカ故ニ哉

那鉄剤ヲ与ヒ之ニ由テ漸次ニ快服ス

○舞踊病治験

一男子九歳一二迥倒劇シキ舞踊病ニ罹リ由テ外科ニ治ヲ乞フ○之症細虫ニ基因スルヲ以テ屡々駆虫剤ヲ与フ蚘虫駆除スト雖モ病治セス是ヲ以テ於ヘ兎角此症ヲ純粋ノ神至病ト定ノメ且精慾ヲ起ス処ノ器械ノ変草元進スルカ故ニ来ル歟ト如ニ発スル病ト為シ九ノ剤ヲ試ム

亜鉛花　綿中漫剤　鹿角精綿中未

カヤフーテー油　香竈乳浴　癇亀生　橙葉

竜脳　苓ヲ用ユト雖モ効ナシ

○成丈スル羊記ニ発スル症挙病ニハ劇剤ヲ与サルヲ定規ナス別ニ、ントクレフスワルト地名ニ於テ癲癇舞踊病ニ効アル処ノ盂倫設尓ヲ試ム

硝銅若一弗半　桂枝水六匁　鹿角ニ弗

右混合シ日ニ三次丸流ツヽ、漸ニ加ヘテ八滴ニ至ル○八日ヲ注ルノ右丈病症軽微並ニ病勢共ニ減少茶剤ノ量ヲ増ヒーシ以前諸症増復セス発作時間ト虽尾食妨ケナク皮膚冷ニメ小便透明ニメ水ノ如ク患志癡蒙トナル丸丈原病ノ

ニ従ヒ諭他意識ニ係ル症モ亦従テ悪ク消散セリ

○童児鼓脹治験

一童児年甫歳初生時ヨリ父母ト一様ニ便秘ス
ルニ尤モ頑キ易シテ八百二十六年十一月十二日ニ
当リ劇シキ鼓脹ヲ患ヒ再ヒ前ニ治ヲ乞フニヨリ診
スルニ病ノ極度ニ至リ懼ルヘキ服便ニトメ充満ス
緊張シテ弾カアリ之レヲ撃テハ丈声鳴鼓ヲ撃
カ如ク腸及腹膜間ニ病様ノ兼セル風気ヲ生ス○
耳汞ヲ持久シテ以テ吹主義トメ患児ヲ治スル又尋

常明礬モ効ヲ呈ス硫黄阿魏ノキリステール并
鉄塩丁哉等ヲ用ヒ未効ニ至ツテ「キヲルイキフ」
ルイアンモミルクウヒル詳ヲ以テ○服部ノ吹
夜ニ向テ秤量ヲ以テ之ヲ言ヘハ風気許多ノ量
ヲ漏スコトナキニ服部ノ空洞ナルヲ実ニ多シ彭脹
ニ嬰ルノ間ハ漏ス処ノ大便恰モ泥淘茶ノ如シ
○吹患児羸痩骨立シ頭髪脱尽スレモ餘后療ト
メ用ニルノ茶剤ヲ三四ノ間特長ヲ以剤驚ヘキ効ヲ
奏シ食欲増追レ消食機補治カモ故ニ夜ニ病全
ク愈ユ

○黒障眼治驗

一女子一霊灸毋卒然トメ死スルニ由テ頭ニ左ノ症ニ罹ル○虚里ノ動悸シク呼吸困難肩憂倦シ頭重クシテ歴スルカ如シ加旃其部動揺スルヲ覚ユ耳驗鳴ス灸症速綿トメ明ニ達ス豎朝旦ニ至テ既ニ明ヲ失ス全ク物ヲ弁識スルー能ワス由テ予ニ治ヲ乞フ灸症左ノ如シ○瞳子甚タ散大シ眼光常ヲ失シ脈実数ニメ緊ナリ予由テ足沢ニ創口腘大ニシテ刺洛シ大量ノ血ヲ放チ防癈利ヲ内服セシム灸日ニ於テ視力漸次ニ故ノ如ク快ス仮シ翌日ニ至テ全ク故ノ如ク快ス

園丁ノ女子五歳偶ト為テ十四日ヲ経歴スルノ後予ニ落ヲ乞フ内黒障眼ニメ水様液中ニ水丁ル自殺ヲ浮フヲ見ル灸児十有五日前広瘡ニ罹リ疹ヲ発スル時期ニ於テ外気ニ觸レシ身軀ヲ寒冷スルニ由テ発疹遽ニ消散シ玆地ニ留ト為ル灸餘患ル処ナシ処方左ノ如シ○吐酒石壱匁ヲ頂ニ帖シ左ノ剤ヲ内服セシム

カロメル　亜児尼加花　竜脳　金硫黄

右調匀シ用ユ○兼テ玆子ヲ混メル全身浴

ヲ行フ
之ヲ行フヿ五日間視力全ク故ニ復シ今ヤ三年
ニ及ヘルモ病ム処無シ

○夜盲眼経驗

一旌ニ二十九歳一ニ迄間既ニ夜盲ヲ患ル后治
ヲ請フ丈症左ノ如シ燈火ニ對シ物ヲ見ルヿ能
ハス然レモ燈暈金黄色ノ如クナルヲ以テ肝臓
ニ患害アルヲ思考ス精細ニ之ヲ診スレハ右肋
骨次々起腫ス及フニ疹ヲ発シ痒アリ季助下ニ
著硬ノメ大ナル肝臓ヲ髣髴知ス然モ疼痛ナシ尚
且検査スルニ患者年前ニ肝ノ欝衝ニ罹ルヿ
アリ然モ治療ヲ求メス及ヒ口渠若ケメ舌黄胎
アリ食欲減捐シ屢吐シ而メ若キ噯気ヲ発ス
大便硬メメ灰白小便金黄色ナリ右肩並ニ同部
ノ胸脇鈍痛ヲ覚ヘ右腕強直ナルヿヲ覚フ患者
甚タ疲憊シ身体羸痩シ皮膚黄色ヲ顕シ夢寐煩
悩メ寧カラス精神向趣快々トメ尊憂ス患者衰
弱甚キニ由テ軽易ヲ解凝剤ヲ与フ処方左ノ如
シ　酒石塩液　蒲公英エキス　白屈菜エキス
水製大黄丁幾孛酸酒石　右茴香水薄荷水ニ

溶シ用ユ
一二回ヲ過テ劇キ黄疸ノ諸症ヲ発ス傷症ヤ
減シ亦夜冷ト史フノ痒疹ハ全ク消散ス患者諸
カ少ク快復スルニ由テ患部ニ水銀膏ヲ广探ス
内服方ハ
失鳩苔　耳永　実芝苔利勒　右調匀シ用
ニ
肝臓硬結腫脹漸ク甚タ増進ス前ニ用ル茶ヲ半
年間連用スルニ由テ夜冷痒疹消散スレ𠮟全身
水腫ヲ起シテ遂ニ死スルニ至ル

○血腸流血治験

麦酒家ノ一夫歳二十四歳幼ヨリ大便スル毎ニ
血腸ノ脱垂ヲ患ヒ手ヲ以テ推納スルヲ為スハ
年尓来日ニ大便スル毎ニ下血ヲ患ヒ以前ハ丈
血ノ量一茶碗一盃許丈ケ漸時ニ増進シテ世三
盞餘ヨリ半𠮟ヲ日ニ漏出スルニ至ル通スル処
ノ大便溏泻ナリト雖モ頗正ナリ然𠮟甚黒キ血
ヲ纏綿ノ通利シ丈ケ血忽チ凝血スルニ至ル次出
血ノ症ヲ患ルニ由テ次壮男患者衰弱ノ極度ニ至
リ従前出血スレ𠮟丈餘ハ健康ニメ常ノ如クナ

ル者忽チ食嗜飲モシ顔灰白色トナリ勢力モ脱
メ遂ニ臥床ニ就クニ至ル〇四日間他医諸種ノ
準縄ニ従テ之ヲ療スルヲ何等ノ病症ナルカ治
ニ切アルヿナシ諸悪性増進スルカ故ニ予ニ治
ヲ乞フ諸ヲ診スル先ツ指ヲ以テ血腸中ヲ検査
スルニ糞塊硬結等モ未タ捜リ得ス〇内服剤マ
ハ「ラタニアエキス」ニ胆若ヲ加ヒ用ユ〇腸脱出
ノ部ハ「ラタアニノ濃煎ヲ以テ洗ヒ然ル後ノ食物
ヲ禁シ牛乳食物ヲ連用スト雖モ漸ヲ逞スル変化
ナシ〇八日間毎日一弗半尓后ニ弗ノ収斂亜酸

児ヲ白糖ニ加ヘ用ヒ刺達亜尼ノ吉利斯養児ヲ
行ヒ后明礬溶解水ヲ以テ吉利斯養児ヲ為シ行フ
コノ剤剌戟甚シキカ故ニ鉛糖溶解水ニ轉用シ行
処ノ諸法方功ヲ奏ヒス衰弱増進シ患者卧床ヲ
廃ル一ヶ能ワス日ニ頭痛発熱尓他大出血ノ止
マス今ヤ後方ヲ処ス

炭酸鉄 十五
右ノ如キ分ニ三回朝夕ニ用ユ二日ヲ
亦通ルヿナシ第三日午后二日間然ルニ尓間ハ大便モ
迫ルノ后流出スルヿニ至テ大便ヲ泄ラスシ唯
些吹ノ血ヲ混ス患者再ヒ大ニ諸カ故ニ夜シ卧

床ヲ青ルヽニ至ル○炭酸鐵又ヲ与ヘ寒水六匁ヲ用ニ二回或ハ三回直腸中ニ注射ス此灌腸法ヲ行ヒ実ニ甚肝要ニメ一ハ直腸ノ衰弱ヲ快復シ一ハ三日間漏ナルノ便秘ヲ通宜ニ稀釈シ硬便ニ由テ腸膜ノ毀傷スルヿ勿ラシム炭酸鉄ヲ持出スルノ后患希全ク快後ス頭痛発熱食欲欽乏不眠等ノ症希ク消散シ肛門下血ノ症全ク未タ除カサルモ著リ減ス此症硫黄ヲ用ユルニヨッテ初テ消散シ前医モ之ヲ用ユレモ小量ナルカ故ニ功ヲ成サス八日間朝夕六匁ノ硫黄ヲ与ヘ又十四日間夜ニ当テ六匁ノ硫黄華ヲ用ユ八迴間此散茶ヲ用ルノ間ハ毎晨寒水注ノキリステルヲ施スヿナリステハ患者ノ全軀殊ニ小腹ニ於テ大布益アルカ故ニ腸血出ツル后勉従及ヒ底童ノ景況去テサルノ間持長スヿヲ以テ爰年患タル出ノ症全愈セリ

○服及腹臀水腫治験

一女子齢十六年腸水ニ罹リ両股臀ニ至ルマテノ腫脹スルヿ甚シ諸ノ利尿剤及ヒ実残荅剌斯ト雖モ終ニ至テハ効無ク却テ錯誤ニ属スト○患

若臥スレ能ワス艾灸腫脹ノ疼痛甚シ「ヘラトリ
子」ヲ胃部ニ怙シ剃水ヲ全治セリ（用又海患ヲ代用スルナリ）（ヘラトリ子ハ黎盧ナリ艾元素ヲトリ）

○胃管痙攣様壅閉治験

一病人胃管痙攣ノ如ク壅閉シ之カ為ニ嚥下スルヲ妨ケリ○諸薬用ルト雖皆効ナキヲ以テ「エ」ニデルマチーセノトウデ（外用方ニ隨テ頸ノ両方ニ小発泡ヲ貼シ艾表皮ヲ去リ艾上ニ硫酸莫児比捏キ八ヲ撒敷及ルコト三時ニシテ病全愈ユ（剤ノ義）

○舞踏病角驚之治験

リ或ハ三時四時ヲ過ルキハ艾上面黒赭色ニ変ス○斯ノ如ク塩渣ヲ布スルハ便ヲ以テ六ツヲ納ヘキ珮瑯ニ四分一ヲ容ル石酸ヲ滴スルハ塩渣ヲ見スレ瘢シク又劇キ発熱ヲ発ス又是ヲ取テ煎ル時ハ底ニ沈ムノ塩渣片ヒトメアカリ様ノ硬膜厚サ一ニ列ル能ニ及フモノ布リ○又蒿管ヲ以テ之ヲ吹ケハ上面ニ沫ヲ発シ大ナル球形ヲ浮起ス○一二日以来流涎ヲ発スルニ因テ前ノ毋汞ヲ止ノ屡吐気アルニ因テ三十日ニ至リ上湧ノ症明ナルニ因テ吐酒石ハ吐剤ヲ与フ

之ニ因テ胆汁ヲ吐スルコトヲ甚タシ〇五月二日ニ至リ蒲那浸剤ニ霰玉塩ヲ加ヘメルト下剤ヲ与ヘ膿液様ノモノヲ吐スルニ由テ患者軽状ニ至リ今ヤ吐全ク止シ不利減スルカ故ニシキタリス瓦服トシ二時毎ニ与フカ便ノ外泌自若トシテ増スコトナシ五日ヨリ十日ニ至ル迄シキタリス瓦一服トナシ二時毎ニ与ルト雖モ小便ノ外需更ニ変セス而メ小便赤色ナリ全身殊ニ小便ノ小瘴逐次ニ増進シ羞明繊維麻迫ヲ覚ユ頭ガ重ノ綿布ヲ巻如シ眼ノ白膜赤ク脈実緊ニメ屢少メ衄血ヲ発ス別洛メ八ラノ血ヲ浮スト内服剤ヲ投スルニ

シキタリス　瓦
水ニ浸シ四ラヲ取リ酒石英
海葱醋蜜　覆盆子舎利別　各半ラ

右混合シ一時毎ニ一食ヒシラフ

〇同十二日小便ノ量増劇シナニ昼間ニ三ポントニイタリ其色稍赤ク印白肴大ニ減耗ス頭部呼吸大ニ寛解シ水瘴諸症減シ脈軟ニメ既ニ実ナラス汗発起セリ〇刺洛ノ血嫩皮ヲ顕ハシ丈白皿厚キ丁一列印半許アリ処方非日ノ如シ丈

他屈訶応度和婢根　洋芹根杜松子ノ利尿剤ヲ
与フ〇十三日実幾苔利私麻管ニ効カヲ現スフ
著シキヲ以テ右服ヲ止メ利尿剤トシテ酒石ヲ
与フ
〇十四日暁後クシ実ニメノ緊ナリ呼吸困難頭困
重水腫ノ諸症小便ノ負十一日ニ於テルカ如シ
再ヒ刺絡メハヲノ血ヲ瀉ス〇十五日脈軟ナリ
胸部頸ノ諸症消散メリ汗アリ小便ノ分泌増進
シ服内ノ水腫従ヲ減ス小便混濁ニメ火ク雲ル
尿朋アリ今小便硝石酸ヲ滴スルモ前ノ如ク沈
殿物ヲ見ルフナシ昨日洩ス処ノ血嫩皮ナリ又
ク水液ヲ含メリ処方
シキメリス二及　右浸シテ五ヲヲ取リ後茉
ヲ加フ　海山喘蒼　テスビシ　セルヒシ滓
右混合シ二服毎ニ一食ヒヲ与
〇十九日小便ノ分泌続テ増進シ十二時間ニ洩
スフ五ビントヨリ六ヒント　至ル屡汗ヲ発シ
時トメ吐スルフアリ水腫減シ陰茎陰嚢殆ント
常ノ如シ小服内ノ膨脹共ニ減シ之ヲ撃ヲ試ル
ニ使動明ナラス両腿ノ腫著シク減シ脈軟ニメ

後ナリ

二十二月小便通スルヿ前ノ如ク凋渇アルシ渣
注ヲ顧ス屡乾吧シ或ハ吐シ舌上黄苔アリ是ヲ
以テ吐酒石ヲ与粘液及膿液ヲ吐スルヿ一二次
盈間汗ヲ発シ小便ノ通利減少ス　処方右ノ如
シ引キタリス霊一ヶ半　海葱根半匁　白糖半又

右混和シ一服トシ二時毎ニ与フ

二十七日前ノ散茶　時ヲシテ与シ与フト雖モ状厥逆
ナラス患者殆ント倦怠シ汗ヲ発スルヿヲ勉メリ
之ニ由テ小便ノ通利減シ諸症著シク険悪ニ進
ム処方左之如シ

シキタリスヰ半　カルシユイヘ子ナイ瓦
右熱湯ニ適宜ニ浸シ八ヶヲ取リ後許ヲ加
フ　茜苣エキス一ヶ半　海山エキスナ六匁
清浄酒石　二ヶ半　耳硝石精二ヶ　杜松子精六ヶ
セイテンハム阿芙蓉液半ヶヲヨキシナールニヶ
右二時毎ニ一食ヒヲ与フ

三十一日前方ヲ与フ但シ前ノ分量半又　増与フ
之ニ由テ少シク快服ヲ得リ大便石利ナルヲ以

テ諏那浸剤ヲ與フニ大目翔日処方
カルジーエキス　一ヶ月分　苓荅汚石一ヶ　海中エキス
六八
右佯芹水六匁ニ溶シ橙皮舎利別一ヶヲ加フ一
時毎ニ一食ヒヲ与フ
此剤ヲ与ルニ由テ小便通スルヿ頻メシ十二時
間ニ三マートヨリモ多ク水腫消散セリ○小便
灰白ニメ次ク雲翳アリ今ヤ蛋清若ハ絶テ見ル
ヿナシ○食気故ニ依シ患者能ク眠リ大便常ノ
如シ○此剤ヲ与フルヿ三剤ニメ諸症消散シ唯
両脚ノ水腫ノミ遺貼スル小便ノ分利ヲ従カサシ
カ為ニ杜松子浸剤ニ揮発剤ヲ加ヘ脚部ヲ包纏
スル○　二十四日ニイタリ患苦全ク快復スルニ
イタル

卒中風

一農夫二十四歳体格長ク胞満セス生来癇患ナ
リ九年前ニ軽キ卒中風ニ罹リ此病治スルノ後
ハ今日マテ健康ナリ○千八百廿九年八月八日
穀ヲ負担スルニ当テ頓ニ一身知覚ヲ失シ地上
ニ仆ル○四分時ヲ過ルノ右意識漸ノ再ヒ復シ

唯頭部ノ重キヲ苦ム全軀疲倦スルヲ覚フ急ニ
近傍ノ外科医ヲ延テ刺絡ノシテ一升半ノ血ヲ
瀉ス血干ニ知覚失亡ノ症ヲ再ヒ発ス余異朝患
者ヲ望ニ生人ヨリハ死人ニヨタリ但タリ寝室ニ迄
暢シ臥ス秋日ノ暑威ニ全身悪ムヘキノ寒冷ヲ
覚皮フノ色殆ント屍ノ如ク皃光リ顔死人ノコト
ク四支撓屈シ易シ諸筋テ痺シ小便又シ軟ナル大
便意識従ヌシテ自ラ漏泄ス下痢依舎シ律唖ヲ
分秘スルヿ殺シクロヨリ絶エス流出ス眼瞼開
閉全ク捷シ瞳子散スレ眼目色沢ヲ失シ光輝ヲ

舷ルモ瞬カス吁吸甚緩ニメ胸中稍喘鳴シ虚里
ノ動キニ応セス吻甚タ緩ニメ倫次ナリ亦弱
ニメ漸ク診シ得ヘシ〇水漿一適モ飲ムヿ能サ
ルニ由テ外用法ヲ以テ処ス并一患者ヲ温湯ニ浴シ
頭髪ヲ剃リ頭ト足ト高下ヲ回シ常規ノ如ク灌
ル法ヲ行セ一桶ノ冷水ヲ頭蓋骨ニ注クト雖モ
少モ功ナリ患者意識ヲ失スル以前ノ如ク頭項
ト二芫菁丁幾ヲ加タル発泡膏ヲ貼ス皮膚赤色
ヲ生スル時ハ之ヲ取リ去ラシテヲ余ス艾他全身
ニ烙鉄ヲ行フ皐口内ヲ刺戟セシメンカ為ニ屡

礬砂精ヲ嗅シム次ヲ行フ間ハ患者ノ口ヲ塞ギ鼻ニテ呼吸スルカ如シ〇次方法ヲ行ヒ昨日翼夜ニ由ルモ諸法一モ功モ奏セス烙鉄及芫菁膏モ又フニ抗拒ヲ起サス礬砂精ヲ噴シムルモ刺戟ノ徴ナシ患者状態昨日ニニトナルフナシ〇サアレッフレ根ヲ研磨シ醋ヲ加ヘ四支ヲ濯ヒ血レニ芟子泥ヲ交換シ行フコノ法ヲ行マノフフ日二次ニノ前ノ浴方及シ礬砂及ヒ芫青膏ヲ持及シ全身ニ毎半時烙鉄ヲ行フ一益裏〇是ヲ行フ六日六次間持久シ〇八月十九日朝ニ至リ腕及股ニ烙鉄ノ痕稍平ニ応スルノ明ナルフ覚フ皮膚ノ温度モ収ノ増息スルカ如ク丈需ニ至リ尤足ノ大指ヲ動カス次ノ諭顕応ニ因レハ急メテ烙鉄ヲ行フ時ハ患者生活セシムヘキノ冀望ヲ起ス日日夜半ニ至リ漸ク全身ノ外部適度ノ運動ヲ起ス次ノ景況ニ由テ希護者ニ烙鉄ヲ減シ用ユルフヲ令ス十六日午后ニ至リ患者稍安静十ラス屡声ヲ発ス時トメロラ例ツレモ下顎常ニ低垂セス亦時トメ津唾ヲ咽下スル眼尚回転メ例カス傍人強イテ上下眼ヲ距离セシムルハ

亦徐々ニ例テ丈ノ状態上瞼重キヲ覚ユルカ如シ先瞳ヲ目ニ觸シハ瞳子稍運動スニ因以来大便セス蓋シ坎腸中蓄藏スル者ナキニ由ル否ラサレハ大便意識ニ従ハスシテ自ラ漏洩スヘシ小便尚失埜ス〇近午ニ烙鉄ノ行フ之最終リニ方ヲ患者殊ニ手足ヒ動揺ス全身烙鉄ノ痕堆起ス之ニ由テ屡四支ヲ一度ノ徧ヲ行ヘ恥稍疾ニメ洪然レ氏未タ甚軟ナリ盧里ノ動明カニ午ニ応スルニ至ル〇患者嗤下スルヲ得ルニ由テ柿即断白蒲萄酒ヲ取

リ半時毎ニ一ヒツヽ与フ「アル」ニカレノ浸利ニ午酬　加ヘ与フ〇八月十八日余寝室ニ至リシ時患者初テ余ヲ認ノ知ル言語困難ニメ甚タ往々ニ語ル〇患者病ノ発作ヨリ既ニ壓渋スルノ諭症ヲ記セス僅ニ両令十二時間ニアル而已ヲ知ル故ニ先時負擔スル穀物既ニ田圃ニ轉運シアルヲ知ラス〇一二日ヲ過キルノ後揮発衝動剤ニ強壮剤配伍シテ長用シ〇九月朔日患者全ク健康ト為リ予ノ方法ヲ謝ス

〔備考〕此症ニ刺絡ヲ施スカ如キ胡乱斗筒ノ医

世ニ蓋シ鮮カラス後進此如覆轍ヲ以テ亀鑑トスレハ艾益実ニヌタシ卒中病ノ刺絡ニ於テルルヤ艾症ニ敲当ナルハ之レヲ舎テ佗ニ之カ冠タルモノアルヿ無シ然レモ或ハ症ニ於テ刺絡功ナキノミナラス却テ医逆冥ニ赴カシムルノ媒ヲ為ス前症ノ外科医ノ如キ是ト書読テ馬ヲ御スレハ馬情ヲ盡サスト故ニ卒中ノ刺絡モ尤ル困ヨリ柘機ノ準縄々ルに亦タ之ニ守株拘泥スルノ勿シテ艾症ニ刃ヒ艾機ヲ察シ適当ノ法方ヲ処スヘシ今又艾ヒ別ヲ掲示ス患者灵血ニメ顔赤ク膨脹眼円ク出艾他血液脳ニ壓迫ノ徴アルモノ尚且患者強健ニメ短頸ナル者ノ如キ此患者ハ刺絡功ヲ成ス疑ナキ者也身駆羸痩ニメ長頸往来刺絡ニ憤シサル者灵クハ艾人灵血貧ニ非ス殊ニ病ノ初発ニ於テ艾顔依ト顔ナル者ハ假令小量ノ瀉血タリト雖害アリ況ンヤ劇キ刺絡ニ於テヲヤ忽カニスルヿ勿レ々々ル

第二

○小児胃軟脆

マーフルウエーキング

小児久　後第一ヨリ丈産スル容易然ルニ啼號メ
休ス時ニ千八百九六年初テヲニ治ヲ請ヒ〇丈
母ノ景況ヲ尋ルニ従来歇乙私的里ニ罹ノ知覚
最敏疾ニメ乳房堅ク既ニ乳汁ヲ含蓄メ大ニ勃
起シ哺乳セシムルヿ能ハス是ヲ以テ人ヲメ是
ヲ吸シメ丈勃起ヲ減シホ児ヲメ呼吸安カラシ
ムル之ニ由テ児哺乳シ呼吸啼號頻ニ休シ漸ク健
康ニナレリ然レ𪜈常ニ遅秘シ吉利詞多ホヲ行
フニ非レハ二日ニ三行丈便竪ク皿白色ニメ粘
稠ナリ又夜ニ入テ睡眠安カラス稍煩擾ヲ発ス

ルヿアリ是ニ由テ解疑ノ吉利詞多尓ヲ行ヒ徴温
浴ヲ施シ左ノ方ヲ與フ
大黄舎利別　満草
右二呆適宜ヲ採リ茴香水ニ和シ与フ次方ヲ持
久シ与フト雖状夜ニ至ラス夜間安静ナラサ
ルヿ益増進ス是ヲ以テ益解凝ノ吉利詞多児ヲ
指又シ行フニ由テ衛ク生育セリ〇次児齢ニ比
スレハ生神ノ官能稍進シ甚メ刺衝性ニモアラ
ス亦軟弱ニモアラス又夜間啼號スルノ外毋意ト
スルノ諸症アルヿナシ大便ノ通利漸々順正ニ

ナリ夜モ又安眠ス然レ𪜈時トシテハ大便緑色
ナルコアリ〇毎七日毎八日ニ方テ患者再ヒ夜
間安眠ナラサルノ諸症ヲ発ス又啼哭シテ眠ラ
ス然レモ蓄積ナシ〇第三ケ月ニ至ルマテ健康ニ
メ能生育セリ然レ𪜈早朝急ニ全ク招ク金到ル
ノ時ハ患者既ニ斃レタリ又景況ヲ親シク尋ニ
昨夜ヨリ今朝六半内ニ至ルマテ尤安静ナリシ
ニ頚ニ痞覚シ而メ四肢抽製メ頃ト共ニ冷ヘキ
眼ヲ過キ直ニ死セリトシ
死后天時ヲ過キ屍ヲ解キ観ルニ皮色灰白ニメ

膨脹スルコ殆ント水腫ニ於ケルカ如シ諭助施
従セリ又諭管ノ血液稀薄ニメ流利シ易ク腕ヨ
リ出血ス脳ハ常ノ如ク嫩脆及ヒ溢出シタル跡
跡ナク胸腔内モ別ニ非常ノモノヲ見ルニ周ノ内
服腔内ヲ見ルニ周ノ内面下底ニ方テ傑列乙様
ノモノ是ヲ覆シ又粘液膜荒穢セラレ且ツ軟柔
ナルコ指ヲ以テ容易ク鏡透スヘキニ至レリ又
他諸腸モ又妨ノ如ク柔軟ニメ物ナク唯風気充
満セリ肝脾心左腎モ非常ニ柔軟トナレリ
〇門脈ハ赤血ヲ含ミシコ朱ヲ注射シタルニ以

タリ然レ𪜈炊衝ノ蹤跡ナシ

父母ノ言ヲ聽ニ死スル十四日未發吐シ又八日未乳汁ノ外他ノ飼ヲ與フ又死スル前日乳汁ト蕎餅トヲ用ルト饒炙ナリシニ死ノ半時前皆吐セリ○此症全身及局処ノ疾患モ倶ニ部解ニ由テ知ル如ク明ナリ皿ツ肆ニ食ヲ嗜モノハ全ク萎黄病ニ於ケルカ如シ

「第二」

千八百二十八年十二月十四日生シテ第八日ニ至ル一男児ヲ診スル症左ノ如シ身体羸瘦シ茶色ヲ三日以来屢吐シ屢疾ニメ小眼目灰白色四肢共ニ寒冷嗜眠スレ𪜈呼ヘハ若ク醒受ス緑色ノ糞便ヲ週スルト饒炙ナリ速ニ羸瘦衰弱ニ至ラントス○病発前三日マテハ本児十全ニ健康ナリ然レ𪜈泗甚シク病発ノ前ニ於テ午收ク灼熱ス○父母ニ十六歳ニメ既ニ流産スルト三回身体羸瘦灰白ニメ「ヘイスデリイ」ニ罹ル亦小児タル時タル病ヲ患ヒ許家ノ数ニ至テ夭癸不順ナルト数年夜タ萎蕘病ニカヽル○此患児「マーク」ノルウェーキシクフルヲ診得ルヲ以テ鍼刺矢鳥

私ノ法ニ従テ左ノ如ク行フ

罗癸煎ニ　コロシウム（ヘェムリンイチェムヲ和シテ

フ

芳香某ニ蒲萄酒ヲ加ヲ腹部ヲ温並シ温布ヲ

以テ吾ヲテ擦シ精揮ノ徹温浴ノ行フ

○右ノ方法ヲ行フ右諸症軽快ヲ得吐止ミ元

ト灰白ニメ知覚鈍ナル顔面今赤色ヲ顕シ治癒

トナリ緑色ノ大便変シテ常ノ如ク黄色トナリ

諸カ速ニ後ス○終リニ至テ次列布溶剤ニ大黄

丁幾少許茴香水ヲ内服セシメ鉄浴日ニ三次行

ハシム

○全女母ニ命スルニ他ノ乳母ヲ取テ養フコヲ

以テスレモ背セス吹患児今マテ十ヶ月ニヨヨフ

マテ丈母ノ乳ヲ哺シ消化機少シク飲捐シ皿ツ

便秘ヲ疾ムノ外絶テ健康ニメ歯牙発生ニモ亦

患フ処ナキカ如シ○子八石三十年四月ニ至リ

注意ノ哺乳ヲ禁シタリ○上ニ謂フ処ノ諸症

ハ初生児ノ分娩右日ニ於テ屡之レアル処ナリ

○目年四月ノ下院ニ至リ注意ノ哺乳ヲ禁シ唯

軽キ乳製ノ食餌ヲ以テ養育ナセリ然ルニ第八

日晡乳ヲ禁スル后恐驚スヘキマークアルウユーキンフ」
ニ浸裹セラレタリ〇艾症速ニ羸痩シ大渇引飲貪
養シ肌疾ニメ嗜眠吐吐甚シク便秘ノ常慣今ハ
緑色黄色様ニメ粘糊ノ便ヲ通スルカ故ニ余ハ
恐怖ス是ヲ以テ芳香ノ温浴ヲ行ヒコロシウムリ
クイラコムヲ用ユルコト四日ニメ效アリ又赤
蒲萄酒ヲ用ルコト十二時毎ニメ一時毎ニヘ一名ヒヘ与ヲ与諸症著
シク快後ス〇翌日ニ後々嗜眠ス左ノ方与フル
可来羊乳マクチシアユルアラヒアユ白糖各六仏

右混和シ調匀シ一時半毎ニ半服ヨリ一服ヲ
与フ
〇大便傑列乙様ニメ粘糊ナリチシクチュル〇子ルウ
ベスタセセヒラヲヨヲ赤葡萄酒ニ和シ五滴ヨリ八滴ヲ
用ユルコト日ニ三次ニメ患者後々全ク快後ニ至ル
二月二十四日ニ至ルマテ亦葡萄酒ヲ用ルコト十二
九十リ

越児實歳経驗

○會而実歳五軟骨水腫様ノ痛衝経驗

一男子歳三十二歳身体知覚尓ニメ恒ニ強健ナヲ又三年以前並当春胸痛ヲ患ヘ病院ニ詣リ治ヲ乞遂ニ全ク快復ス○千八百三十一年八月サ三日劇シク操作シ身体ヲ熱スルノ後偶冒寒ヒ丈宵ニ至テ咽喉口中ニ痛ヲ発シ呼吸嗑下共ニ困難夜半ニ及ヒ諸症険地ニ進ミサ四日早朝ニ病院ニ来○丈症如左○サ四日四ツ時之レヲ診

スルニ呼吸困難ニメ結喉ノ上部ニ於テ痛アリ
吸気尤困難ニメ声ニ響アルヿ義腹咽喉嫩衝ノ
未朔ニ似タリ而呼気容易ニメ声ニ響ナク言語
噬下全ク障碍セラレ顔色惨膽憔悴シ戦競トメ
驚怖スルカ如シ舌上聖京偽様ノ苔アリ咽喉粘
嫩衝シ脉疾ニメ弦脉石二十動少ク乾渇アリ今
朝大便一行小便渾渇皮膚大ニ発汗ス左ノ法ヲ
行フ

刺絡シテ八勺ノ血ヲ瀉ン
飲剤　芎藭根煎　十二匁　硝石　一匁　接骨　花　各ゝレ

右半時毎ニ二ヒヲ与フ後和琵布ヲ頸ニ貼ス
同日四ツ之レヲ診スルニ刺絡ノ後少ク悪寒ヲ
ヲ得ス戦競ノ状態呼吸困難益甚シク将ニ窒息
スル恐レ有ルニ至ル〇故ヲ以テ一医ニ「十八人」名
ヲ延テ故ヲ診セシムルニ曰ク此五軟骨ノ水様
腫ナルヿヲ知リ故ヲ以テ指ヲ口内ニ刺入ルヽ
ニ後腫ニメ殆ント喉内ニ塞ラントス〇故ニ咽
喉針ヲ取リ乱刺ヲナシ少シク血様ニ液ヲ漏ス
而メ患者速ニ軽快ヲ覚フ左ノ方ヲ処ス

蜀癸煎 十二匁ヲキシメル 一匁

右混和シ含漱セシム右ノ散剤ヲ与

甘汞 菲沃斯越幾斯各十二仏 蛸粘石 八十匁

白糖ニ匁

右混和シテ十二貼ニ分チ一時毎ニ一貼ヲ与

〇晝九ツ半時又之ヲ診スル刺絡血燃衝皮ヲ顕ス局処ノ疼痛ト嗌下稍軽易シ吸気著ク後鮮シ咳嗽劇シク粘痰血ヲ交ヘ吐ス脉尚疾右二十動処方頗ニ水蛭六箇ヲ貼ス〇夜四ツ時ニ至テ吁吸言語及ヒ嗌下等快復ス筋レトモ顔ヲメク赤色

膨長シ熱甚著ク脉芤タ疾石三十度動泻甚シク
稀薄ノ大便一行〇二十五日朝五ツ時之ヲ診〇
前夜能ク瞑ル然レトモ今ヤ悪心シテ膽汁ヲ吐
ス熱少ク減シ脉石三十動泻甚タシク咳嗽シテ血
線ヲ交タルノ粘痰ヲ屡吐出又稀薄ノ大便四行
〇患者ノ好ニ従テ前方ヲ投ス〇晝七ツ半時ニ至
リ熱猶劇シ苗又然レトモ呼吸及嗌下倍緩筒ニ咳
嗽連綿トシテ粘痰シ吐ス稀薄ノ大便一行アリ〇
夜五ツ時ニ至リ熱再ヒ発シ諸症晝ノ如シ〇廿
六日朝五ツ時ニ至リ之ヲ　診ス〇前夜快寝シ

熱減退シテ脉石動トナリ咳嗽稍減シ呼吸及ヒ
嗌下常ノ如シ舌苔布テ食気ナク湯甚シ稀薄ノ
大便四行〇前方ヲ与フ〇夜五時ニ至リ熱ノ発
作著カシラス咳嗽亦カラス稀薄ノ大便ニ行〇
二七日朝五ツ時之ヲ診ス〇前夜朝咳連綿スル
カ故ニ患者不脳熱減シ脉九十度ト成ル吸気及
ヒ嗌下スルニ痛ナク陰テ左ノ方ヲ与フ

甘扁桃油一匁　雞子黄一個　アラビヤコム半匁
ヒヨシヤムス　十二仂　罌粟舎利別一匁

冷熱湯十ヶヲヨコ注キ乳剤トナシ半時毎ニ匙ヲ与フ〇夜五ツ時ニ至タリ咳嗽少シ焚火ク唯一発ス〇廿八日朝五ツ時之レヲ診ス〇前夜安静ニヨク咳嗽少ク熱大ヒニ減ス然レ共口常ニ乾燥シ食気十ク水様大便四行

処方　沈判布溶解剤　十ヶ　地亜古地　温一ヶ

右混和シ半時毎ニ一匙ヲ与フ〇廿九日朝五時ニ睡大便一行焚未タ全ク退カス脉百動トナリ吸気及ヒ嗌下全ク常ノ如シ〇廿九日朝五時ニ睡ス脉尚疾ニメ熱ナク大便ニ行患者甚タ衰弱ヲ覚フ　処方前法中ニラウリールケルス水ニヶ」ヲ加ヲフ〇二十日今朝請疾安静ニメ熱ナク大便ニ行患者甚タ衰弱ヲ覚フ　処方

蘭苔煎十二ヶウリールケルス水　半ヶ

芎地温一ヶ

右混和シ半時毎ニ一匙ヲ与フ〇廿一日諸症益快復シ咳嗽全ク止ム然レ共声甚タ唆ス　処方依前〇九月朔日患者漸次ニ快復シ衰弱ヲ除ケハ病患ナシ処方依前〇同三日快復愈頌整シ諸カ四復ス〇同五日病院ヲ辞シ去ル

○歇尓低爻ト僂低壊疝全治ノ実験

カコフヘルヘル名人妻歳三十九歳性ニ健強ナリ而メ倆一二日以来腹便秘ニ困シミ子八百二十五年七月十五日予ヲ迎ヘテ診治ヲ請フ其病左ノ如シ小腹痛アリテ定所ナク又其ノ痛個曷シ手之レニ觸レハ痛稍増進スレモ然モ緊脹硬満ナラス正ニ吹レ风気嬗亢ノ致ス所ナリ又腹ヲ壓スル時ハ腹鳴シテ口ヨリ唆気ヲ漏シ稍愉快ノ覚フ〇四日以来屡キリスステイルヲ行フトモ大便通セス食欲減シ渇増進セス舌白苔アツテ乾

煙セス脈数ニメ小然レ𠮟患者自調ソク是レ姙
娠ナラント意トセス〇患精神安静ニメ呼吸
常ノ如ク深息スルモ小腹痛ヲ増サス〇胃寒ノ
外著シキ誘因ヲ覚エス〇予嶺僂佝ニ罹ルコア
リヤ否ヲ頻リニ問訊スト雖モ之レ無シト
謂ク然ルニ由テ姙上ニ腟列スル顕症ニ従テ
輦急ヨリ起ル凩気ト定メ鍼挙刺及ヒ破気駆凩
ノ剤ヲ投スレニ由テ少ク軽快ヲ覚フ〇廿四
日再ニ之レヲ診スルニ大便通豆ニ通痢シ腹痛
ナク臥床ヲ離ルト告ク凩気ヲ発越シ食気故ニ
復ス然レ𠮟患者腹腹合縫ノ部ニ疼痛スル強硬
腟脹ヲ発ス〇廿腟ハ美蓋シ箝頓嶺僂佝ナラシ子
ト疑フト雖確徴ナキニ由テ姑ク腹股合縫ノ灸
衝ト為シ左ノ方ヲ処ス

水銀膏　ヒヨス油ヲ和シテ患部ヲ広擦ス

〇廿二日予又之レヲ診スルニ右ノ腹股合縫ノ
部ニ於テ稍高スルノ鶏卵状ノ腫アリ灸レヲ
按スルニ殆ント琵布様ニメ縦径二梱指半許横
径一梱指半許腫ノ表面暗黒色ニメ豆ノ大サナ
ル孔ヲ開ク赫薄ノ汚液ヲ漏出ス〇廿脱疱状ニ

変シ鈎ヲ以テ穿ツニアラワス○腸膜及綱膜ノ一部脱疽状ヨリ迷発スルヿ疑ヲ容レス然レトモ患者更ニ怖レス○即チ銀ヲ以テ脱状ノ部ヲ截除シ艾部ヲ浄潔　左ノ方ヲ処ス

幾那　スコロチム　葉煎汁ヲ以テ浄洗ス希

竇水ニ浮利塩ヲ溶解シ内服セシム炎薄ノ食餌ヲ与ヘ且ツ仰臥スルヿヲ令ス○二日ヲ経テ脱疽状多ク脱落ス周縁ヨリ良膿ヲ漏泄ス創底ヲ検スルニ網膜ノ一部ト蜂巣膜下愈着シア

リ尤ウハルトフルユークバンド薄帯ヲ施シ服膨ヨリ壓ス時ハ大便上下ヨリ洩然トヲテ流ホシイニ縛帯ヲ見得サルニ至ル○汚液服竇ヨリ流溢シ○患者衰弱増進スルニ由テ左ノ方ヲ与フ

幾那浸剤　前方洗脱剤ニ没茶丁幾剤ヲ加ヘ且用ユ劇ノ周圍ニ繃合希軟膏ヲ貼ス○二十六日創ヨリ汚液流出スルヿ殆ンド全ク脱疽状ナク創周圍頼ラスト雖モ艾局部全ク脱疽状ナク創周圍頼壮ヲ呈スル新肉顕生ス然レトモ全軀ノ景況慢性病ニ進ワクニ由テ左ノ剤ヲ投ス

沙列布煎ニ水製ノ幾那越幾斯ヲ加エ与フ
解凝ノキリステールヲ施ス洗脱前ニ依
ル

八月三日此ノ日ヨリ尓来大便通スルト順正ニ
ヌ創口ヨリ流ルルコト大ニ減シ創口亦ニ收合
シ誘症軽快ニ赴ク〇最後ニ用ル剤ヲ持長シキ
ニ過ルヲ以テ創口ニラスチマス膏テ貼ス
〇七月内用剤無益ナルカ為メニ此レヲ休ム〇
十七日以来大便日々順正ニメ創口ヨリ大便流
出寔ニ少ナルト著シ創口終ニ瘻尖残留スル而已

〇一二週間ノ繃帯ヲ施シ消化シ易キ食餌ヲ与
ヘテ丈創口スヘルテコッフ未詳　之大サニ十リ液
ヲ漏スト唯一二滴ノミ大便常ノ如クニナリ食
気及諸カ故ニ復シ患者生産ヲ営ニ至ル〇創ノ
尓口收合セシメンカ為メニ消散銀ヲ丈部ニ塗
貼ス〇十月ニ至リ患者漸ク快復ニ至リ懐衆弟
四月ニ及ヒ流産シテ再ヒ臥床テ就クト雖モ速ニ
全治ス〇此復時アリテ予ニ示患者ニ避迎シ此レ
ヲ診スルニ兎僂傴ノ部ニ蜂巣膜固着シ創口全
ク愈着セリ請運営特ニ惕ノ運営モ全ノ順正ニ

胃軟弱

一嬰児比久登児齒苗列苗生シテ十四月ニ至リ
神志爽快ニメ丈父母モ康健ナル時之レヲ生ハ
然レ𪜈児弟姉三人丈ノ二人ハシカルラーケン
热ニ罹リ死シ丈一人ハ急性頭水腫ヲ病ンテ亦
死ス〇此児今ヤ六歯ヲ生今茲四月乳ヲ离レテ
乳粉食ヲ以テ養ハル當テ良性ノ痘ヲ病テ今ニ丈
死ヲ免ル、ナリ〇五月弟七日ニ至リ吐下痢
ヲ発ヲ丈父母治メハ生歯ノ如ナルカ故ニ更ニ
意ニセス〇十二日夜ニ方ツテ諭症劇ク患児卧
床下仰卧シ服目陥没シ丈輸西鉛色ニメ半眠ス
ルカ如クアールトハ未詳ノ如ク口圍一
異ノ痛撃アリ轉頗反側シ食薨外ニ足ヲ投シ被
覆スルヲ欲セス〇患児漸々目ヲ開キ伏蚊ニ
囲視シテ悲恤ノ状態ヲ顕ス至微之声ニシテ呻
吟ス稍嗅嗽ヲ為ス酸臭ノ液ヲ労セスシテ吐出
セリ患児舌ニテ唇ヲ舐メ渇甚シキヲヲ知ラシム
止ノ後前ノ眠ルカ如キ状態ヲ顕スト雖モ前ノ
諭症ニ由テ眠ルヲヲ得ス〇吧吐下痢十二時間

ニ饒晏ニメ殆ント等ス可カラス艾漏泄物雞卵
ノ如クナルモノ今ヤ水ノ如ク艾色灰白様ニメ
悪臭ナリ○舌苔白クシテ滋潤シ顔色四支温度
ヲ減脈小而数○胃部軟ニメ粘萎シ全ク生活ノ
ノ運営ナキニ侶メリ按レヲ按スルニ痛ヲ起サ
ス全身蓄シリ羸痩シ按レヲ以テ左ノ方法ヲ投
ス

升鉄塩　四氏　广香　五氏　並餾水　二〆　橙皮舎利
別　一〆
右混和シ半時毎ニ一茶ヒヲ与フ

揮発膏ヲ胃部ニ広擦シ温暖ナル香窠菜ノ蔬湯
剤ヲ全服ニ施ス　飲料ニ稀薄ノ赤米汁ヲ与フ
○患苦好テ吹菜ヲ飲ミ又能ク服スルニ堪エ翌
日ニ至リ吐下痢前ノ如ク甚シカラス○十五
日早朝吐吐全ク止ミ下痢稀シニ之レ布リ顔常
ノ如シ渇減諸症寛快ス左ノ方ヲ処ス

升鍼塩丁我剤　十三点
　三ヶ
　橙花舎利別　二ヶ

右混和シ半時毎ニ一琵布ヒヲ与フ

○広擦蓋湯二剤前ニ由ル夜ニ至テ諸症変スル

十ノ大ニ衰弱スルカ為メニ次ノ方ヲ前方ト代
更シ用ユ

ヶ香 五氏 アラヒアコム 漿ニ 橙皮舎利別各
ヲ

右混和シ一時毎ニ一琵布ヒ存フ

〇曇夜ニ至リ三時間热瞞シ吐下病全ク休ム
〇十七日顔色常ノ如ク陥没シタル眼目再ヒ塙
與シ胃部ノ刺弱減シテ張カヲ生ス〇本日ヨリ大
便之ナキニ由テ鉄塩ヲ去リ之ニ換ルニ蒲公英越哉
斯ヲ加ヘ之ヲ溶解シテ用〇前ノ希巖蓋湯剤

ヲ止メ前ノ揮発膏ニ換ルニラウルケルス高円
ヲ以テ ア擦ス(註)老利児亮底列並底那油ヲ精浄虎珀油羊ノ右四味微火ヲ以テ
先ツ羊脂ヲ溶シ次ニ老利児油ヨ加ヘ后余某ヲ混メ攪拌メ冷ルニ至ル〇十八日大便稍硬ク一行患者外
見ノ容貌全ク自然ニ復シ食機恒ニ復ス患児爽
快ニメ渇消シ胃部ノ状態正整ス迺労前ニ依ル〇
十九日口内鵞口瘡ヲ発スルノ外患フル所布ル
ヿ無シ玫瑰蜜達破ヲ也ボラクスヲ加ヘテ陸擦ス而メ此瘡一方ニ
メ全ク愈ユ 〇胃軟弱備考口方今病理学家務メテ
未詳ノ病ヲ検査シテ医ノ学ヲ富ス所ノ疾患数ヲ
リ而メ小児胃質軟弱病ニ亦其ノ一ナリ 〇此病ハ

古人モ亦経験シ且ツ書ニ著サヾルト雖モモルガ
クニ名人カ云所ノ如ク認メテ佗病ト為セリ然レ
方今名哲相継テ之レヲ詳明シ終ニ小児ノ危病タル
コヲ詳瞭メサセニ公ニス古人ハ此病ヲロンラ」リ
インテーリ等ノ名ヲ与ヘテ頻リニ天礼ノ患者
ヲ救フコ能ワス胃質ノ軟弱ハ他病殊ニ義膜咽
喉嫩衝メ誤治ニ非ラス全ク入身ノ他器械ニ於テモ
亦生スル所ノ軟弱病ノ類ニメ引病ナルヿ疑ナシ
○父母ノ病又ヒ小児ノ僂僥病ハ謬リ認メテ
是原因ト為スト雖皆妄誕ノ説也積年ノ実験ニ

基ク幼稚ノ時ト歯牙発生ノ如トヨ速因トナシ哺
乳ト食物ノ亘シカラザルトヲ以テ誘因トナス今
○此病ヲ治スル某剤中ニ於テ初メニホムメル氏
多クノ此病ニ用イテ確著ノ効テ得ルニ由テ其効
アルヲ発明スル塩酸鉄及ヒ其製剤乃チヘルル
ユムミソヤチキュムヲキセイダチュム」リキシ
オルヘリトヲアトヲキルイダーチリキチュラヘ
リソンクニトヲ以テ第一ノ良効某ト為ス

○コレア病

一稚女歳九歳卫シリッキ」メル者著シキ原因ナ

クシテ身體ノ右側ニ因テ患襲セラレ蓋シ
此病慍性ニノ其雙親一ノ悪癖ニノ病ニハ非ス
ト為シ意トセス此病顔面ノ筋搐掣シ且歩手ハ
物ヲ墜シ運動不自由ニ由テ或ル人莨菪利ヲ用
イテ此患ヲ駈除スルヲ勉メタリト云〇然ルニ
今茲十一月病増進シテ此患甚或ハ只室中ト雖モ
歩トキハ初ハ小針ヲ墜トシ逐ニ食匙它物ホ
ヲ墜スニ至ル都ヲ嬉戯自由ナラス終リニ諸筋
ノ運営概ノ意ノ如クナラス由テ父母予ニ鑒察
ヲセス〇此病ハ吾俗屢見ル病ニメ殊ニ小児十四

歳マテ最モ多ク患フル症也而シテ艾因灸ノ蛔
蟲蛲炎ニ由テ発スルモノ及ヒ色慾初テ満生ノ如ニ在リテ
屢得ルノ症アリ〇予艾家ニ到リ貝サン諭症ヲ訊問スル
ニ蛲炎ナランコヲ思フ加故ニ先胡羅匐新淀汁ヲ内
服セシメ又サバシルヲ実越幾姻ヲ与フ〇此女子舛
踏痛ヲ患アルフ既ニ三年ニメ遂ニ狂妄ノ症ヲ発ス
レモ昨冬サバシルヲ用ヒテ全治ス〇此症ヲ療ス
ルヤ十二時間飲食ヲ禁シ常ニ至ラサハシルヲヲ
モトシ二十四氏ヨリ三十六氏ヲ与ヘ翌朝ニ至リ下剤ヲ与フ
〇此法ニ由テ畑灸サ白灸ヲ施灌スルフニ

十條大便及ヒ青色ニメ透明ナル粘液ヲ下スヿ
甚シク遂ニ全ク快復スO此ノ雅女以前ニ疝腸
炎ヲ患フルヲ以テ去冬ノ如キ諸利ヲ処スレト
モ耶カ功アルヿ無シ其他亜鉛花薏草及ヒヒヨ
スエキス等ヲ投スレモ一モ効ヲ顕サスO此ヲ
以テ蔡芦(ロヲリ)脉油(ニウム)ニ和シ膏ト為シ胡
桃ノ大サヲ取リ脊髄ニ摩スルヿ一日ニ二三次
此ニ由テ患者始テ漸次ニ快復ニ赴キ顔筋ノ攣
減シ言辞夾雑シ艾右脚下肢ノ筋モ適意ニ而
後脘手及ヒ手指ノ筋モ巻ク意之如クナリO患

者漸々快復ニ赴クト雖モ衰弱甚シキ故ニ遥遥
浴及ヒモウト浴ヲ行フ此ノ浴方ヲ行フニ先ツ
テ「リロ」ヲテ擦シ血ニ浴セシムル法ヲ行フニ当
ツテ全体ニエンキケルメノ刺戟ヲ発シ屡忍フ可
カラサルニ至ルO艾毋及ヒ希謢者厚ク此療去
ヲ尊禁シ連用スルニ由テ患女ヲ運動セシムル
ヿヲ勧メ屋外ニ逍遥セシムO腕ノ快復ニ赴ノ
ヤ間長ナリ指ヲ自左ニ用ルヿ最モ遅延ニメ終
ニ回復シ初メヨリ縫針粗大ノ枝ヲ創メ卒イニ
至細ノ工巧ヲ触クシ又能ク書スルヿヲ獲テO

其冬ニ至リヲ全ク快復ス

モストレコレア病其ノ初期ニ於テハ強キ鍼
灸及強壮剤ノ及テ病勢ヲ激発シ険地ニ進
メシム故ニハレリアナ橙葉施那葉及ヒ吐
根吐酒石ノ吐剤毎ハ四阿魏ノキリスチール
又ハ香竄浴等ヲ撰用スヘシ亦ハ鉄棒ヲ以
テ脇髄ニ貼シ毛布ヲ以テ四肢ヲ摩シ或
ハ鉄剤或那又ハ諸浴等亦キニ従テ選擇
スルヲ要トス

○婦人腹水腫ノ驗於ル登

一婦人歳四十九往来熱ヲ患ヒ身體衰弱スルヿ
甚シト雖茲トメロヲ憂シ治療ヲ怠リ今ヤ臥床
ニ在リ他医久シク茶ヲ投スルノ後ヲ以テ治ヲ請
フ其症如左全身ノ水腫ニメ小腹膨脹シテ硬ク
腹中波動未タ明ラカナラスト雖腹ニ水アルヿ
疑ナシ而足水腫シ顔面黄色ニメ膨脹シ他部モ
水腫シ大便秘結ス舟體大ニ衰弱シ起立スルヿ
能ハス脉弱ニシテ徐胸部患害ナシ舌清潔安睡ス
ルヿ一週間尓来熱ノ発作ナシ小腹ヲ按スルニ痛ミ
ナシ熱レモ恐クハ肝脾ノ併塞又タハ腸間膜間

塞ナラン且今現ニ頭ル所ノ近囲ヨリ予前ノ膏
ニ投スル所ノ丸剤ト広摩膏ヲ以テ炊ノ患者ニ
令シテ又タ施シ行フニ由テ僅ニ八日ヲ経テ諸
症大ニ変化シテ軽快ニ赴クヿ脈腹大ニ減シ
又両足ノ瞳脹減シ起坐スル自由ヲ得ヿ便分
泌非常ニ増進シ炊丸某ノ為メニ下利ヲ発ス由
テ休ヿ利水某ヲ茶ニ換テ之ヲ与フ亦摩膏ヲ特
長シ行フヿ八日間ニメ患者愈快シ大便ノ通利
常ノ如ニナリ水瞳ノ諸症消散シ脈中ニ波動
ヲ覚ハスヿナシ諸カ快復シ復日炎暑ヲ懼レス
歩行スルニ至ル再ヒ前丸某ヲ用ヒテ患者全ク
快愈ス

備考 炊患者全愈ニ至ル所以ノ者ハ外用ノ
広摩膏ノ峻切ヲ奏スル也炊ヨリ以来水瞳
ノ患者ニ遭フ時ハ炊ノ法方ヲ試ルト雖モ
如炊切ヲ顕スヿナキモ独リ小便ノ分泌ハ
常ニ著シク増進ス患者衰弱ニシテ胃部ノ
知覚過敏ナル者ハ炊膏ニ由テ悪心呕吐ヲ
発スル者亦之レアリ

○神圣衰弱ヨリ消化器ニ及ヲ治験

一男子歳三十七賀苗々辺ノ江苗人名ナル者アリ
彼ノ言フ所ヲ以テスレハ以前強健ニメ病ム処ナシ
然ルニ某館ニ来リ身体ヲ労シ意匠ヲ費スヿ而メ食
喘減損スルカ故ニ身体ヲ強壮ナラシメン為メニ揮
発ノ飲料ヲ好テ喫メリ然ニ食喘漸々減損シ遂
ニ衰弱ノ葉ヲ免ルヿ能ハサルニ至ル〇予八右
三十三年夏ニ至リ予ニ治ヲ請フ一吐利ヲ与ヘ
後硝砂ヲ与ヘ以ヲ患者自謂ラク全ク愈快
スト〇同年秋ニ至リカステリイヒ热ニ罹リ再
ヒ病院ニ到リ同病ニ罹ル医ニ診治ヲ乞フ速ニ
回復ス〇千八百三十四年初春又予ニ治ヲ請フ
其症左ノ如シ患者形貌ヲ望ニ灰白ニメ恰モ蠟
ノ如シ神志尭憂エルヿ甚々食喘全ク癈シ一切
ノ食物ヲ嫌悪シ煩悶狂久メ不寝ヿリ此症ヲ名
ラ依剥昆垤里ト謂フ此症ハ乳糜ノ製造機殊ヒ
脾臓ヲ病ノ居宅ト為ス〇予大ニ心ヲ殫クメ癒
スレモ也モ切ヲ現サス此ヲ以テ病症ヲ詳ニセン
カ為ニ医ヲ延テ相謀ニ及ヒ亦依剥昆垤里ト謂
〇病既ニ潔白ナルノ後予患者ニ令メ需建浴ヲ
行レメ白居菜蒲公英ノ新搾汁ヲ吸レムルノ一方

ヲ処ス○患者此方ヲ嬉悪シ且自謂ラク病ヒ治スルト決メ不得ト故ニ病院ヲ辞シ去ラント欲ス是レ五日ノ初旬也○再ヒ他医ニ診察ヲ受テ其言ニ従テ「カテアヘン」ヘルク舶ノ冷水浴ヲ行フ後同年八月廿一日ニ至リ再ヒ病院ニ来ル其症殆ト左ニ毎シトス○患者諭療法切ナキ故ニ適意ニ従食シ再ヒカステリイセ熱ニ罹ル○患者衰弱羸痩スルト甚シキ故ニ臥床ヲ禁ト能サルニ至ル○顔面アノ如ク言語低衰シ脈不吾ニメ数ホ腹部稍膨脹シ疼痛ナク内蔵ノ腫脹ヲ顕スト

ナク大便硬小便暗赭色ニメ少ク玫瑰ノ如キ堕渣ヲ顕ス○此ノカステリイセ病ヲ除去セン為メニ吐根ノ浸剤ヲ与ヲ艾石亜児尼加ニ硇砂ヲ加ヘ与フ此ヲ服スルノ後諭カ続テ脱亡スルニ由テアルニカ硇砂加苗香精ヲ与フ○此方ニ由テ熱退キ諭カ増加シ然レモ煩悶不寐再ヒ発シ精神錯乱セシト為ルノ懼レアルニ至ル此レ明カニ全身ノ知覚機侵襲セラルニ由ル也○患者屎白色ニメ肌膚汰澤ナク言語遅渋食気全ク廃スル一切ノ飲食ヲ嬉忌シテ唯水ヲ飲ムノミ大便

通シ難クシテ小便吝ヤ○此ノ患者ノ為メニ久シク諸方法ヲ施スト雖モ切ナル精思熟考スルニ此レ脊體神経至トシテ害ヲ受ケ釵テ服部ノ神経モ倶ニ患累セラルヽ也予幸ニ此ノ時ニ当テヘラトリ子(蔡蘆ノ経験アルニ由テ此レヲ用ヒルコヲ決断ス○九月廿日卫ンデルマチヤメイトウテ外用方ノ調ナヲ撰ミ心窩ニ発泡ヲ施シ艾痕ニ劇痛ヲ発シ臭奮カヲ発スルヿ甚シク患者安静ナラス脉洪ナリ小便通スル最シク艾色始メ濃暗色ナル者今ハ黄色ノ塩渣ヲ顕シ透明光ツテ白ク續テ陣渇ニノ乳酪ノ如ク終リニ透明水ノ如クナリ患者全ク快復ス

○妊婦痙攣之規　越児実義氏

去年八月廿八日夜四ツ半時妊婦ノ夫ニ託セラレラ余宅ニ往テ患者ノ臥床側ニ侍坐ス其症左ノ如シ顕鈍痛ヲ心窩ニ痛ヲ覚ハ煩悶甚シク之ヲ按スルニ至ムヿ止部ニ任シ妊娠間ノ経過ヲ探捜スルニ妊婦頭ヲ左方ニ回ラシ妊婦ノ意識ノ在ル如キ想像ヲ為スガ故ニ顧ルナリ予亦虞ラス患者ト共轉視ス妊婦ヘタラシク　臥布ノ義未詳

ヨリ摂陰シテ足ヲ外ニ投ス怕ル可キ搐掣ヲ発スルニ由テ余夫患者ヲ荷擔シテ漸ク卧床中ニ退卧セシム然ルニ湿煩ナル顔面煩ニ赤色ニ変シ膨脹ス眼ノ輪圍冗出シ左方ニ口ヲ曲ケ唇青クメ褐色ヲ帯ヒ瞳脹シ舌上ニ白漉ヲ覆フテ舌ヲ外ヘ出ス坎ノ症章一二密粗萬個ニ発シ亦安静ト為ル○大ニ坎ノ疾章十二密粗萬個連續シテ止ト雖トモ人事不省ナルヿハ恰ノ如クナラス如何シトキラト患者昏憒シテ譫々言語連縣タレハナリ○噫嘻嗚呼ノ顕ス所症章誇

症ト昏睡ト交換シ発スルヿ二回終リノ第四回ニ至リ昏睡太タシクシテ恰モ死スルカ如シ其夜八ツ半時患者死ス

第一心窩ニ在テ疼痛誓苗スル者陳痛之前兆ヨリ外ナラス第二子宮内症章ヲ発スル時ニ当テ産婦安静ナラス恐憂煩悶シ子宮ノ疼痛ヲ困苦スルニ一異ノ状態ヲ顕ス

第三内部ニ陳痛止ムナラデハ外部ノ搐製ヲ発スルヿ始ス

○産婦危篤搐製諦徴

第一〇分娩ノ前時不虞ニ発スル痙攣並ニ陳痛
一二徴候ニ由テ発見スルノ前ノ痙攣
第二　患者痙攣ヲ発シ全ク知覚ヲ失スル者并
ニ痙攣休ムノ間知覚ヲ存セサル者
第三　痙攣ヲ発スル毎ニ患者頭ヲ捋ニ回ラス
者ハ危篤ニメ且恐愛煩悶ヨンフルスターアン
ハアーレハールスン驚起及ヒ撮空摸床後ニ至
テ搐攣ヲ発スルノ徴候ヽ
第四　顔面ニ於テ恐ル可キ痙攣ヲ発スル者瞳張
目直視シ眼目突出スル者瞳子縮小又ハ散大交換
シ発スル者面部腫脹シ天藍色ト成リ口ヲ痙攣
状ニ開キ續ケル者舌ヲ露出シ舌上濃白苔ヲ
覆フ舌色褐色ナル者唇瞼ニ天藍色ト成ル者
欬嗽恰モ前ヲ塩ル人ノ如シ次ク如クナラハ頭
恒ニ復ス
第五ノ四肢痙攣屈伸スルノ状態虚実二性ノ痙
攣中等ニアル者
第六　陳痛終ルノ後初テ四支ノ搐掣ヲ発スル
者並ニ産婦陳痛ニ依テ煩燥甚シキ者
第七甚タ屢子宮症攣ニ由テ強直ニ成リ分娩ヲ

妨ルモノ

第八　脈小ニメ痙攣発作極度ニ至テ脈絶シ認メ得サル者

第九　痙攣発スル毎ニ意識ヲ失シ言語黙然トノ態下シ雖ク尿糞ヲ発スル者

○同ク軽易搐掣諸徴

第一　分娩後或ハ分娩前ニ於搐掣ヲ発スル者

第二　搐掣ヲ発スト雖意識ヲ瘀セズ痙攣間隠中ニ能ク語ル者

第三　頭頸ヲ回施セス静ニ直立シ恒ノ如クナル者

第四　顔色灰白ト成リ陳痛ヲ発スルニ臨ンテ口吻攣急スル者及ヒ眼瞼ヲ併テ眼球回転スル者

第五　四支ノ攣急頻痛ノ如ク足ヲ投ケ出シ動揺スル者

第六　陳痛ト倶ニ痙攣ヲ発スル者陳痛止メハ痙攣モ亦タ従テ止ム者

第七　上ニ臚列スル痙攣ハ分娩ヲ妨ケサル者

第八脈小ニメ弦然シトモ常ニ認メ得可キ者
第九次ノ如キ搐掣ハ険地ニ進マサルヘ
丈レ治療ニ臨テ内部燃衝及内部劇キ神経痛又
ノ他痙攣様ノ感識次ノ三者ヲ區別スルヿ甚タ
難クシテ最モ枢要ノ事件ナリ胸部ノ疼痛腹迫
胃部ノ疼痛小腹ノ疼痛ノ如キモ総令劇キ胸部
疼痛モ唯ニ神痙様ノ痙攣ニ非サルヿ
間之レ有リ次ノ区別ノ如キハト死生ヲ決スルノ
地位ニメ最モ至重ナリ如何トナラハ燃衝
ハ刺絡ヲ必要トス痙攣ナレハ阿片次カ冠タリ

若シ燃衝ノ患者ニ阿芙蓉ヲ投スレハ其命期テ
促シ九泉ニ赴ク一臂ヲ為スノミ慎サル可ンヤ
次ヲ以テ診施ノ間次レヲ
センヿ一熱頭然タリ或ハ
或ハ熱シテ渇アリ脈度ヲ頗スモノ第二脈緊実
ニメカアリ然ルモ小腹燃衝又ヒ肺ノ燃衝極度
ニ至ルモノ次徴ヲ缺クノ如キ時ハ尿ヲ正
的トス尿ノ赤色ハ燃衝風熱アルヲ顕ス也之レ
ニ反シテ淡白ニメ水様ナル尿ハ痙攣様ノ症也
○赤痙攣ト燃衝トノ正表ハ痛ノ状態ヲ以テ之

ヲ分テハ連綿持久スルノ痛ハ燃衝ト間過谷
脊スルモノハ疝痙也小腹燃衝ニ於ルヤ其外部
ヲ推シテ之レヲ按レハ之レニ耐ヘ忍フヲ能
クシテ其痛減スレハ之レ疝痙ニメ燃衝ハ然レ
又スルヲ以テ弁知ス可シ然レ氏此ニ一大至貴
ニメ注意ス可キコアリ内臓痛様ノ知覚長ク連
餘タルニ於テハ縦疝痙タリト雖氏其ノ終リニ
至テハ

燃衝ヲ発スルニ至ル○若シ猶疑ノ症ニ遺ヘハ
局所患害ノ部位ニ於テハ心翼ニトメ少量ノ浮
血ヲ為セバ之ヲ決定スルニ足ル

○尾断多利池四徴

「膽疸」 先ツ意識ノ感動布テ来ル脳病ノ体質古
苔或ハ黄或ハ褐色頭痛口ニ苦味ヲ覚フ恒ニ悪
心有テ膽汁ヲ吐シ小腹痛布テ膽汁様ノ下利ヲ
為又時トメ胆汁酷厉ニメ咽喉ノ侵襲スレハ最
モ劇キ疝痙ヲ発シ漸ク増進シテ燃衝ニ至ルハ
恰モ中毒ノ如ク対抗カヲ奮発スルニ至ル

「粘液」　餓ヱセス渇赤ナシ上腹壓推スル如ク或ハ充滿スルガ如キノ知覚食後殊ニ然リ舌上白クシテ粘膠ヲ被フ口味粘ナル「風葉ヌク膨脹ス」朝ニ匂テ悪心シ頗ル吐セントス「全身温度ノ鉄質持ニ胃部ニ於テ頗ル寒冷ヲ覚フ」大便粘液様ノ物ヲ通シ或ハ屡秘結ス顔色淡白色ニシテ怠惰知覚鈍ナリ「吐下ヲ用フルモ知覚鈍ナリレ以上ノ諸症諸歩ノ症ニ於テ倘ニ之ヲ見ル

「酸敗液」　恒ニ餓ルガ如シ或ハ貪餐スルヿ狗ノ如シ然レモ渇セス噯気酸ニシテ吁吸及ヒ風気酸臭アリ胃部灼カ如ニノ痂ヲ覚フ舌上汚穢ニノ歯牙ニ酒石ヲ顕ス「栓物変敗殊ニ乳滓流メ酸敗液ヲ造成ス可キ食餌ヲ食ヒ及テ食フニ堪フ肉食ハ反テ食フ後諸カノ鉄之然ヒ

升鉄塩（ヘロルリニムサリチス羅トニールイーズル蘭）

製法

鉄粉　一匁　長頸ノフレスニ入レ汰火　内ニ入レ二十四一匁ノ水ヲ注キ鉄ヲ溶解シ再ヒ塩酸ニ匁ヲ注キ煮沸シテ溶解スル度トス鉄ヲ溶解シ酒石酸ヲ適宜ニ滴入右滴スル


ㇾ全ク沸騰止ヲ度トス然ル
メ得ルヲ陶器又硝子器ニ入レ武火ニテ半茶
餡シ後文火ニ上セ硝子ノ棒ヲ以テ辛ヲ停メズ
攪和ス然シテ冷凝セシムルニ至テ器ヲ火ヨリ
下シ茶呂ヲ澤攪シ全ク凝固セシメ温ン茶シテ
硝子器ニ入ン固封シ貯ス

製法

硫硝水製法

右升鉄塩一匁ニ水ハ匁ヲ加ヘ 適宜ヲ消シ
溶解セシムルヲ度トス収斂鋭液ナリ

石灰六匁 硫黄華一匁 硝砂
石混和シ速ニ硝子壜ニ入レ蓋餡水四匁ヲ注キ
混蕩シ蓋餡際ヲ密封シ砂火内ニ於
テ蓋餡シ冷ルヲ待テ硝子壜ニ入レ固封シ貯フ



97
315-0