謨斯篤梅毒病篇　完

禁帯出



說斯篤梅毒病篇次目

病性及ヒ治療總論

證候經過總論

傳染梅毒ノ主タル性質

梅毒治法總論

梅毒病諸形狀ノ性質治法並ニ其屬症ヲ

論ス

假梅毒病

穆斯篤梅毒病篇

川本幸民　卓譯

此病ハ緩病ニメ傳染毒ヨリ生ス其初メ感傳ス
ルヤ皮上ニ炊衝ヲ起ス次テ病毒自ラ其形チヲ
成ス此毒ヲ荷フ者ハ精液膿汁汚穢ナリ此毒ニ
感スヘキ平康ナル人ニ此液ヲ傳フレハ又同病
ヲ発ス其初メ媾交ノ部ヨリ水液系ニ傳ヘテ遠
ク他部ニ達ス諸症ヲ起ス未リ終ニ緩病トナリ
全身梅毒性ノ悪液質トナル故ニ局処病ト全身

病トニ分ツ

病性及ヒ治療総論

此病起原ノ説諸般ニメ一定セス其中ニ就テ信用スヘキ者ハ初頭方土気候ノ変感ニ依テ千四百九十四年ニ伊答里亜國ニ起リ千五百零五年ニ至ルマテ十一年間諸民ヲ荒乱シテ欧羅巴州中ニ普遍シ其後テ晩年ニ於テハ許多ノ疑惑ナキニ非ス且諸般ノ病症ニ就テ考フルニ一定難キコトアリト雖モ直テニ其傳染毒ニ感受シテ患タリト見フ○又諸國其病状ヲ合フセス

此病ハ癩病ノ玖テヲ変スル者ナリト思フ人アレド此論ハ暫ラクこヲ置キ梅毒病欧羅巴ニ廣布セシヨリ以来癩病ヲ患ル者甚タ鮮キヲ疑ナシ

梅毒病ハ流行病トナリ其后純粹ノ傳染病トナリテ千四百九十四年ヨリ今日ニ至リ漸々転ク死亡モ少ク病勢自ラ挫ケ終ニ消滅スルトキアルヘキコト疑ヒナシ古医亜私多律屈(アリストテレス)人名等此病後世應ニ軽ク為ルヘキコトヲ前言シ今時已ニ其徴アリ

此篇古代ノ猛劇ナル死症ヲ説ケス今時怒現スル證候ヲ記スルノミ

證候経過総論

初メハ局処病ニシテ多クハ傳染スル部ニ梅瘡ヲ怒スル所謂疳瘡ノ形ヲナス梅毒アル人ト交合シテ陰處ニ怒シ他部ニ怒スルコハ稀ナレ𪜈瘍科産婆産匠誼慎セスメ梅毒病人ヲ療シ或ハ其病ニ傍ラテ己カ手ニ傷ルヿアリ其手ニ傳フコアリ

疳瘡ヲ怒スルハ傳染後三日ヨリ二十一日マテヲ規則トス此他嘗テ早𣏌アルコナシトス

最初一赤斑点アリ其周邊帯青赤班ヲ纏フニ三日後或ハ尚早ク帯青赤泡ヲナシ不透明ナル汎乙ヲ含ム此泡速カニ破綻シ一種ノ瘡トナル其邊縁白クメ巻起シ其中豚肉状ヲナシ傍側ニ開大ナルヨリモ深ク侵蝕スルヿ甚タシク瘡中不平ニメ痛強ク咬ムカ如キヲ以テ他ノ瘡瘍ト自ラ別ナリ

通常疳瘡ハ多クハ傳染後二日ヨリ十二日ノ間ニ其病形ヲナス稀ニハ尚晩クメ二十一日ニ至

ルヿアリ　規則ト頗ル齟齬スルニ似タリ然レドモ一日ニ
至ルモ者ノ称ナルヿヲ説明スルナリ読者之ヲ察
セヨ〔幸民案〕

嚮ニ不浄ナル人ニ交接スレハ此病ヲ怒スルヿ
間亀頭皮ニ於テシ或ハ多クハ包皮ノ内面ニ於
テシ殊ニ包皮帯（陰茎下面ニ包皮ノ合會スル処）及ヒ亀頭ノ大
ナル部ニ於テシ婦人ハ大小陰唇間ニ於テシ間
又痒癢子ニ於テ如キ粘液膜ヲ具セスメ乾燥ス
陰嚢臍間乳頭ノ如キ初頭ト発スルヿ至テ希ナリ若
ル部ニハ疳瘡ヲ
シ此部ニ怒スレハ其瘡大ナルヲ定規トスルヿナ

其泡大ニシテ直径半寸ニ至ルヿ屢之アリ其泡破
レテ痂ヲ結ヒ痂落テ咬通アル瘡トナリ周邊硬
結シ又屢々痂ヲ生

瘍科医梅毒ニ染ミタルヿ昂ヲ以テ自ラ傷キ其
部ニ疳瘡ヲ怒スルヿ如キハ之ヲ詳辨スルヿ至
テ難シ故ニ前徴ノ議スルヿ其宜キヲ得ス

媾交ニ由ヲ陰茎ヲ一二処皮ヲ摩破スレハ後テ
十二時西洋時ナリ扁之ヲ用フリ通中ニ疳瘡ヲ生ス先ッ其部
ニ泡乙胞ヲ怒セサルヿ屢之アリ

疳瘡ノ膿汁ヲ拭ヒ去ルヿハ瘡底不平ニメ血出

シ易シ
急疾ニ深ク侵蝕シ且ツ廣大トナリ疼痛劇烈ナル
ヿ屢多シテ之ヲ侵蝕シ疳瘡ト名ク入喜タ硬クメ
深ク皮下ニ蝕入セズ唯緩徐ニ侵襲シ覚機鋭敏
ナラサルアリテ之ヲ朕脫狀疳瘡ト名ク又間瘡底
不平ニメ藍牙ノ如シ侵蝕シ大ニ出血シ易ク息
肉アリテ海綿狀ナル者アリテ之ヲ脉瘤狀疳瘡ト
名ツク
里帝的尓ハ曰ク疳瘡ハ邊周廣大ナルニ緩急ア
リ殊ニ清潔ニセサレハ許多ノ疳瘡ヲ発シ包皮
ノ肉方ヲ輪廻ヲ終ニ流合シテ全亀頭（亀頭ノ大ナル処ヲ
傍ラニ詞ナレニ今略メ亀頭ト譯シ傍ラヒレヲ分ツ）ヲ囲繞スルニ
至リ易シ深蝕疳瘡ハ殊ニ荒乱迅疾ナリテ之ニ依
テ亀頭ノ形容ヲ変ス間又暫時ニシテ壊頽スル
ヨリ又屢非常ノ大奇形ヲ為ス婦人ニ於テハ此
変形殊ニ著シキコアリ乃チ腔ノ下部合際ニ疳
瘡ヲ生スルハ直腸ニ旁蝕シ肛門ヲ破壊シ且ツ
股ノ内部ヲ侵スノ矣ナリト
余親自ラ之ヲ質験スルニ深蝕疳瘡ト脉瘤狀疳
瘡トハ多ク已別スヘカラス且両症共ニ脫脫狀

疳瘡ヨリ大ニ痛ミ又紀正ノ梅毒症ナラス多
クハ合併病トナリトス
原因疳瘡ト導怒痲瘡トヲ分辨スルニハ前ニ揭
示スル徴候ニ従フト雖モ屢ゝ之ヲ知リ難キコア
リ殊ニ非常ノ部ニ怒スル或ハ陰処ニ怒スルヲ以
テ患者之ヲ恥テ之ニ先ナタル諸状ヲ匿ニ告白
セス或ハ婬婦ニ交ル等ノコアリ茂ニ病已ニ
久シキヲ経其人悪液須ニメ水銀ヲ多服シ永病
ヲ患ル等皆其兆別シ難キ所以ナリ
予曾テ見ル陰処ニ悪性瘡若クハ甘結児状瘡ヲ
怒スル又良性瘍ヲ怒レタル者水銀ヲ用ヒスシテ
治スルコヲ是レ全ク梅毒病ニ非サルナリ○此
瘡ハ梅毒ナキ人ニ交媾スル後ヶ皮卢剥脱スル
ニ依テ速カニ怒スルコ常ニ多シ此症燃衝強盛
ナラス脈肉状ヲナサス周邊脱脆状ヲナサス疼
痛ヤナシヨク身ヲ浄シ冷水鉛水ヲ用フレハ速
カニ治ス
梅毒痲ニ又原始疳瘡ノ如ク局処梅毒病トナス
ヘシ然レニ梅毒痲ト梅毒ニ係ラサル痲トヲ
別スルニ確徴アルコナシ此痲ハ妄リニ急ニ抑

制スルニ非サレハ全身梅毒病トナルヿ甚タ稀ナリ〇淋ト疳瘡ト同時ニ有レク怒スルヿ偶之アリ之レ梅毒病ノ徴タルヿ確然タリ原始梅毒嵐渓腫即チ便毒ヲ局処梅毒病ノ初候トスルヿハ梅毒淋ヲ初候トスルヨリモ尚稀ナリ実ニ之ヲ初候トスルヿアルヤ否ヤ未タ確定セス〇通常皆是レ次怒ノ嵐渓腫ニメ尿道中ニ隠伏セル疳瘡ニ次キ未レニ人軽視シテ之ヲ認得サル者ナリ

總梅毒病百症中九十六ニ至ルマテ先ツ陰処ノ疳瘡ヲ患フ〇疳瘡ハ数週間只單純ナル局処梅毒病ニ止ル是レ此傳染毒ハ今日ニ在テハ已ニ二三百年前ノ如ク張厥スル勢ヒナケレハ也〇殊ニ男子及ヒ耄老天性粘液質ニメ適好生命ヲ保ツ者ハ先ツ局処梅毒病ヲ患ヒテ後チ晩ク全身病トナル其初メ疳瘡ヲ怒スルヤ覚梅痂鈍ニメ脆脆状トナリ徐々ニ深ク侵蝕シ且ツ廣張シ流血セス息肉ヲ生セス

之ニ反メ弱年多血ノ輩童幼覚機敏捷ナル婦人殊ニ小女若男眼青ク顔白キ者ハ病毒轉従甚タ

疾速ニメ疳瘡怒現後ヲ十四日ヲメ已ニ全身病
トナルコアリ
過度ノ温暖烈飲酒精
ノ変舞蹈劇シキ心志ノ感動迅
疾ナル元気ノ変冒寒薄衣刺衝性ノ養ヒ多キ肉
食ハ此轉徙ヲ促スノ誘因トナル
局処梅毒病轉メ全身病トナランコトスルヒ其病
先ツ陰部ニアレハ多クハ便毒ヲ怒ス此便毒ハ
ヨク感通便毒ト区別スヘキ者ナリ（下ニ詳カナリ）

便毒（原語ハ男ニ
嵐婆腫トアリ今暑ス恰モ局処病ト全身病

トノ中間ニ居ル者ナリ
痂ナリト雖ニ上支初テ毒ニ染テ其部ニ病瘡ヲ
怒スレハ腋下ニ此腫腸ヲ怒ス尚且ツ痂有ナリ
ト雖ニ盃碗烟管ヨリ傳フテ口中初テ梅瘡ヲ生
スレハ頸ノ水脈腺腫起ス
華設人名曰ク梅毒性便毒ハ原始梅毒病ト導怒全
身梅毒病トノ中間ニ位スルカ故ニ或ハ原始病
ヲ導テ全身ニ布連スル仗者トナリ或ハ已ニ全
身ニ布蔓スル毒ヲ茲ニ導キ承ルヲ以テ梅毒
ヲ轉輸スル症ナリトス

遅発ノ全身梅毒病ニ早熱発現スル症候甚タ多
シ乃チ口中上顎膜上顎巴丹杏腺食道ノ上部ニ
発スル疳瘡其後ニハ顔面額頭項ノ腫瘍肛門ノ
盛景状疣等尚且ツ數年ノ後チ発スル緩慢
性ノ皮疹或ハ斑痕或ハ炎赤痒瘡或ハ環癬疱疹
或ハ皮下炎腫等テ破裂スル者此他梟ノ粘液膜
ニ生スル梟茸全身皮下ノ疣贅眼炎衝涙瘻炎衝
夜骨痛骨膜炎衝骨膜炎衝睾丸硬結黒障眼骨瘤硬
結腫結節腫結腫此三病不知所元假下譯享統者位目下傍名骨朝骨膿
腐骨疽是ナリ

此症アッテ梅毒本性ノ悪液質トナリ水脉系及
ヒ皮系ヲ侵掠スルノミナラス更ニ骨系ヲ襲フ
ニ至レハ必ス悪徴ニメ労瘵気症労肺労慢性高
尓質血液溶崩水腫之ニ次キ承リ数年ノ后終ニ
タラル
之ニ反シテ怒病久シカラス毒尚局処ニ止マリ
或ハ外初メテ全身病トナリ皮下骨系永タ此毒
ニ染マサル者及ニ総テ此病ノ他ハ健康ニメ悪
液質ト為ラス又腺病依屈多若クハ痔疾ヲ患ヘ
サル人ハ善徴トス

全身梅毒病ト他ノ皮骨靭帯腱膜ノ病トヲ識別スルコト甚タ難シ是亦一許多ノ患者前未陰部ニ疾病アルヲ匿ニ苦ルヲ恥テ亦二症瘡著明ナラス転視シテ知ラス或ハ尿道中ニ生シテ自カラ之ヲ覚ヘス亦三ル匿或ハ瘍科其病局処ヨリ移ッテ已ニ全身病トナリタルト雖ニ適當ノ内薬及ヒ良食養法ヲ命スルヲ以メス唯外療メ消瘡ヲ治スルコトアレハナリ又次発ノ瘡ヲ瘡ヲ唯口ニ生スルヲ口喉ノ疳瘡トスル是レ全身梅毒病ノ徴候ナリ○此症嚥下ニ疼ミアリ懸壅垂上顎舌巴丹杏腺咽喉ニ顕赤ナル炎衝ナリ或ハ此諸部同時ニ又ハ咽ノ後部ニ廣カリ患者二抄時間口状ヲナシテ後部ヲ閲テハ灰白色トナリ其後テ劇痛ナク白色豚肉状ノ瘡トナリ邊周ハ脱脂状ト為ス或人ハ速カニ其周邊ニ延展シテ柔軟ナル部ヲ壊乱シ且ツ鼻骨上顎骨ヲ侵蝕シ嗅シタル亀声ヲナスニ至ル是此導発疳瘡ノ常候ナリ

此症先苗児信苦及ヒ鶯口瘡ニ殊異ナル所以テ者ハ先苗児信苦ハ最初歯齦ニ生シ其色黄ニメ

出血シ易ク息肉ヲ生スル等ノ症アリ鵞口瘡ハ之ニ次メ瘡根脈内形ヲ為サス瘡数甚タ多クメ疼痛強ク酸及ヒ塩味ヲ嫌ヒ奇尓貴ヲ禁子飲食消化セス此諸症ハ尋常梅毒病ニ之アルコトナシ昔等ハ奇尓貴ヲ梅毒病ノ常候トセリ方今ハ原始疳瘡ニモ導尿痛瘡ニモ之アルコトナシ唯梅便毒ニ兼発スル尚且ツ梅毒性ノ皮病斑疹状ヲナシテ数月変セス通常奇尓貴ヲ兼サル症ニ偶之ヲ起スコトアリ又唯悪液質ノ極ニ至テハ瘦消ノ故ヲ以テ慢性奇尓貴ヲ発ス

予此條ニ梅毒病ノ諸形状ヲ逐一挙示セス下條ニ次ヲ追テ論説スヘキヲ以テナリ又此病形ノ況長ナル理解ヲ載セス諸書ニ之ヲ挙レ共治術ニ益ナキヲ以テナリ今茲ニ次ク

傳染梅毒ノ主タル性質

ヲ成業実験シテ知タルニ従ヒ且ツ時世ノ変革ニ依テ方今発現スル状ヲ係テ演説セン

第一此傳染毒ハ方今欧羅巴ノ北地及ヒ殊ニ南境ニ於テハ二百年前ニ比スレハ太タ軽ロシ是一ニハ森林開墾シ気候柔和シニハ此毒許多

ノ人体ヲ経歴シテ身ヲ柔和スレハナリ是レ一
二百年前経過疾速ニメ人身ヲ荒敗スル諸症ト
今日患ル所ノ病症トヲ比較シテ定知スル所ナ
リ

第二傳染梅毒ハ他ノ動物性ノ諸毒ノ如ク殊ニ
補復機ヲ侵シ其後チ勉ク皮系及ヒ骨骸ヲ襲
フ○古代ハ皮系先ツ其毒ニ侵サレテ疹ヲ怒ス
ルコトアリ今時ハ只是レ次怒ノ症タリ

第三　此毒ハ固定ノ傳染毒ニメ空気ニ因テモ
傳染セス許多ノ病人囲続スルニ由テモ傳染セ
ス又衣衾ヒ膿汁ヲ以テ汚ルヽニ非サレハ之ヲ
着テ傳染セスロ直チニ薄キ表皮アル部及ヒ瘡
傷アル処ニ此毒ヲ輸レテ以テ傳染レ而メ其傳
ヒタル体中ニ入テ局処病アリ終ニ全身病トナ
ルノ性アリ

第四　此毒ニ感スル所ノ諸部ニ初メテ怒スル
機管ハ病性刺衝機ニメ終ニ燉衝ニ至ル者ナリ
而ルニ動脈ノ燉衝ナルコト至テ稀ニメ多ハ假燉
衝乃チ例誤ヒ設燉衝ナリ唯是レ誘怒ノ症ニメ之ヲ除
治スルト雖ヒ決メ此病ヲ治スヘカラス猶リ此

症及ヒ其終末ニアル患部ノ漏泄膿潰膨脹潰瘍
ハ唯分離ノ為ニ功要ナルノミ
第五　此毒身中ノ一部ニ感シテ其部ニ止リ全
軀ニ布達スル前ニ殺ハク長ク茲ニアルヤ日月
ヲ以テ期ヲ定ム〇時節気候体質而性
損生之カ差別ヲ為スコト尤モ大ナリ
茲ヲ以テ甲人ハ其毒ノ轉移甚タ緩ク乙人ハ同
体須ニメ回処ニ住居スト雖モ速ニ全身ノ病ト
ナル其状如何ン予ヲ明カニシ姓シ実ニ善悪軽
重両種ノ傳毒アルカ如ク見フニスト
説

古代ニモ此ノ如キコトアリシト見ヘテ梅毒病人
術ノ輔助ヲ従タス自然ノ機カヲ以テ自ラ治ス
ル説アルヲ以テ知ルヘシ　茲ニ列屋亜甲里加扭
之ヲ證ス　方今吾輩又此ノ如キ例ヲ見ルコト其数
鮮カラス
之ニ反メ猛烈ナル毒ニ傳染シタル病人ハ曽テ
自然カヲ以テ治スルコト能ハス猶リ有カナル人
カノ輔助ニ依テ治ス故ニ軽寛ナル毒ト猛劇ナ
ル毒トヲ区別スルヲ功要ナルトス　吾輩茲ニ緊
切ナリトスル徴候ハ諸般ノ對抗機ナリ故ニ患

者ノ体質及ニ他ノ保護法ハ速ニ全身病トナルヘキ状アリト雖モ局処ニ其毒永ク局処ニ留リ或ハ甚タ緩ク全身ニ傳フ或ハ全ク全身ニ及ハサル者ハ是ニ其軽毒ニ感スルヲ決スヘシ之ニ反スルモノハ亦之ニ反シ即チ患者一日痂瘡ヲ発シ三四日後便毒ヲ発シ八日若クハ十日ヲ経テ咽中困難ヲ覚ヘ其時咽中ヲ視ルニ痂瘡アリテ不日ニ廣ク侵蝕シ懸壅垂軟口顎ヲ保護シ難キニ至ルコアリ○余親シク此ノ如キ重症ニ逢ヒ其発現スル諸症ヲヨク実験ス○第二ノ徴候ハ痂瘡膿中ノ蠕虫（男猪中ノ虫ニ同名ナリ蒲尓面板屈シテ小尾アリト雖モ其形ハ菲先屋碌義中ニ曰ク此虫同ク此ノ虫モ亦同形トス）此痂瘡ヨリ下條ニ之ヲ詳説ス

第六　梅毒ハ常ニ留連スル者ニメ時ヲ経テ忽作消滅スル者ニ非ス故ニ已ニ局処ニ傳染シテ局処梅毒病ヲ患ル体中ニ再発傳進ス此毒ハ数年間人身中ニ潜伏シテ後又新タニ発動シ終ニ深ク骨質ヲ荒敗スルニ至ル然ニ此毒初傳ノ地ヲ去リ了レハ局処病消除シ而メ全身病之ニ次ク例スルニ初メ感傳スルタル陰処已ニ

健康ナレハ既ニ婦交スレニ婦人ニ傳染スルコトナシ

第七　機性体様毒ニ新タニ染ムル性ヲ考ルニ一回感傳シ而メ後チ消除シタル病ハ再回之ニ感苦スル者ニアラス是レ猶痘瘡ニ於ルカ如クナリ

梅毒ハ猶リ入身ニ他ノ獣疾ヲ侵襲セス（感傳シ）

猴属ハ恐クハ此例ニアラス一旦ツ他人ニ傳染スルモ直チニ其毒ヲ膿輸シ来テ之ニ觸ルニアラサレハ感セス故ニ唯皮卢剥脱シタル処或ハ皮薄フメ水脈ラ多ク備ヘタル部ニ来侵スルモノニ傳染ス陰部乳頭肛門眼瞼是ナリ

孳設人名曰ク梅毒ヲ傳染常法ハ交媾ニヨル者ヲ功実ナリトス其次ハ産匠瘍科手術ヲ施スキ其皮剥脱スル部直チニ梅毒ニ觸テ之ヲ受ル者之ナリ此他又数條ノ傳染路アリ其一乳哺ナリ小児乳婆互ニ其毒ヲ傳フ其二口中梅瘡ヲ怒シタルヲ不浄ナル人ノ含口ナリ其三梅瘡アル人ノ歯ヲ以テ儀歯ヲ造リ用フ其四梅毒アル人ノ用ヒテ尚其毒ニ染ミタル器具ヲ用フ其五汚染セル

煙草管箇要盃碗刀箸衣裳ニ褌便器雪隠産ル
等是ナリ浴湯ニテ傳染スルコトハマレナリト雖
モ予曾テ梅毒眼炎衝ヲ患ル者其人自ラ知ルコ
トナクメ梅毒病人ノ陰処ヲ洗ヒタル水ニテ眼ヲ
洗ヒタルニ由テ発シタルヲ見タリ
尿ハ梅毒ヲ輸送スル者例(レイ)誤已(マヽ)原始疳瘡ノ膿
汁ハ唫味スルニ舎密家所用ノ紙刺(シ)屈毋(ロ)私紙ト
ニテ染メタル紙ヲ以テスレハ此物ハ亜尓加里性ナル
コトヲ見ルヘシトエフ窓児屈(ウヰルヒロ)名ノ説ニ此毒ノ原
礎ハ窒素及ヒ炭素ナリトスルヲ比較シテ右説

ヲ主張スルナルヘシ然レトモ予輩若シ経久ノ脚
瘡肺瘡肝瘡等ノ加里性ノ膿汁ヲ分泌スルヲ知ラサルトキハ梅毒
瘡ト梅毒性ナラサル瘡トヲ弁別スルニ此説モ
亦重要ナルヘキナリ然レトモ疳瘡中ニ分泌スル
膿様液全ク中和ナルヲ間〻之アリテ曾テ亜尓
加里ヲモ酸ヲモ怒現セス
此膿此ノ如キ中和ナルトキハ其病治療ヲ急ルト
雖モ永ク皐絶ナル局処病ニ留リテ極軽症ナル
ヲ常ニ実験セリ

這般ノ症ニ於テハ或ハ梅毒ノ成分ヲ疑惑スル
コアリ且ツ列那尓土人ノ輩ハ其毒体外ヨリ傳
染セスメ孕体中ニ新タニ其形ヲ生スル者ナ
リト主張スタルモ亦此等ノ症ナリ此症ハ今日
孕之アル者ニメ假令此說ヲ取用スルモ些カニ
假梅毒病ノ單症ニ過當スヘキナリ

第九　梅毒ハ往古ハ猛烈ニメ方今ハ輕易ナル
者多ク且ツ一般ニ流布シ殆ント滿世界ニ達ス
直チニ其毒ニ觸レハ年齢ト男女トニ拘ラス居
處ト気候トヲ厭ハス必ス傳染スト雖モ此病輕
易ニナルコノ実驗アルハ毒勢ノ輕加スルニヨ
ルナリ

胞児ハ此毒ヲ免ル或人ハ謬ツテ既ニ子宮中ニ
在テ此毒ニ染ムコトヲ信用スレ共実ハ梅毒アル
母ノ陰処ヨリ分娩スルト膣ニ觸レテ初メテ傳
染スルナリ

梅毒治法総論

第一　預防法ナリ

梅毒病ハ留連不治ノ毒ニメ幾多ノ人ヲメ生涯
幸福ヲ失ハスメ正シク治療ヲ行ハサレハ極メ

テ悪性不治ノ症トナリ此時ニ方テハ治療モ只
假リニ良効アルカ如ク見ヘテ実ハ真毒体中ニ
潜伏シ数月或ハ数年ノ後ヲ新タニ復発動シ初
回ヨリモ危劇ナル症ヲ起シテ機昼搆造ヲ荒蕪
シ既ニ骨質ヲ侵シタル経久ノ梅毒ハ諸療術モ
効ナキニ至ルカ故ニ預シメ此病ヲ防クノ治ハ
最モ重要トスル所ナリ
梅毒預防法ハ唯ヤ用シヘクメ大用スヘカラサル者アルノミ故ニ之ヲ用ヒテ全ク世界ノ人ニ此毒ヲ免レシムルヿモ又唯欧羅巴州中ノミ免ルヿモ得ヘカラス嘆スヘキニ非スヤ
医学剔里先蘭譯布尓施結児佛利布尓証昼ト云ニ同ニ娼家ヲ此病流布ノ淵源トナシ娼女ノ健康ナル状態ヲ屢探鑒セリ是レ実ニ賞称スヘキヿナリト雖モ然レモ其毒ノ廣布セルヲ侍ルノミニメ敢テ完ク防制スルヲ得ス何トナレハ男一多クノ遊女ヨリ一男ニ傳染ス是其女ハ自ラ尚健全ニメ先キニ他人ニ媾交ネルヨリ膣中及ヒ殊ニ膣ノ粘液窠中ニ傳染毒ヲ殘スヿアリテ之ヲ一男ニ傳ルナリ近時怒謨蒲尓屈名人ノ匹弗栗結名人其他ノ病

院ニ於テ甚多ノ梅毒ヲ患ル婦人ノ膣ノ粘液當
中ニ其孔見アルヲ知ラシメタリ第二内科
若クハ瘍科医十分精細ニ旁鑒セス第三卿里
(原語埃、加達多尔(メット)アリ中等大ノ部落ノ(ミツテル)ヤナリ今假リニ譯ス)
ハ陰窓ニ媾ヲ貪ル者多ク俳個シ謀計ヲ行フテ
禁令ヲ冒シ此毒ヲ廣布スルヲ屢恐怖スルニ堪
タルコナリ
古代ノ疫毒病ノ如ク別ニ梅毒病院ヲ建テ其人
ヲ茲ニ集メ全國ヲ挙テ此毒ヲ過絶セント欲ス
ル説ハ尤モ良トセ然レトモ又町風之ヲ嚴行

スヘカラサルノ
病人右説ノ行ハ
全ク町内ノ大人
ルヲヲ為スヘカ
ヲ断絶スルニ由
医術上ノ防禦法ニハ内外ノ某アリ之ヲ実験説
ニ徴スルニ赤綜ヲ其効ヲナシ何トナレハ升汞
醋石灰水明礬鉛等ヨリ製シタル洗水ニ永剤ノ
内服ニ梅毒アル入ト交媾スルヲ断セサレハ其
傳染ヲ防止スル能ハサレハナリ

最良法ハ常ニ交媾前ニ龜頭ヲ囲被スルニ具ヘタル昆土謨加製法ヲ不詳ト交合後急ニヨク陰処ヲ清浄ニシ冷水ヲ以テ陰茎ヲ洗フトナリ然レドモ此法又各人ノ傳染ヲ尽ク防禦スルヲ得ス故ニ梅毒アル人ニ親接セサルヲ古今無二ノ預防法トナス

第二　医術治法ナリ

入梅毒ニ傳染スレハ医家其局処罹症ノ各異ナルト病ノ形状ト長短ト患者ノ年齢体質気候等ニ従テ九ニ治法ヲ謹慎センコヲ要ス

入皆知ルカ如ク旧来水銀ヲ梅毒ノ主薬ト為セリ実ニ良処正時ヲ撰ンテ適宜ノ量ヲ用フレハ不可思議ノ良薬ナリ然レドモ此品原来或ハ賞誉家ノ云フカ如ク諸症状ヲ矣セス尽ク良效ヲ奏セス梅毒病ノ起始ヨリ以来永ク他薬ヲ試撰シ水銀ヲ用ヒサラントト欲シヲ精神ヲ労シタル理ハ分明ナラサルヘシ

華設人名曰ク梅毒ヲ治スルクレリヲ多ク撰用シ尋伐ニ従テ其中幾多ノ品物ヲ旅賞セリト雖ニ然レトモ今日此薬ノ名ヲ失ハサル者ハ唯水銀

ノ一品ヲ残スノミニシテ実ニ此病ヲ制スルノ
策ナリトス然ルニ此説ハ真偽相交ル者ニメ真
足ル所偏執シテ宜キヲ失フ是近代ノ実験衆教
テノ梅毒病人ニ就テ精細熟考スルニ次説ヲ定知スル所ナリ○此義ヲ
(三)今世医家主張スル説分ルテ二トナル一ハ梅
毒病ヲ尽ク水銀ナレハ治セント欲シ一ハ尽ク
水銀ヲ用ヒント欲シ此両治法共ニ偏僻スル者
ニメ水銀ノ全効ヲ奏スヘキ症モアリ又之ヲ用
ヒテ効ナキノミナラス却テ害トナルヘキ症ア
ルヘシ
水銀ノ効ナク害トナル症ハ猾乙都國ノ北地ニ
多ク又例印烏歇尓(インヴーヘル)私伊太里(イタリスハテ)、私已尼佛即私忽尓
多尼尓ニ最モ多シ
予之ヲ算スルニ水銀ノ効アル者ハ一ニ居リ水
銀ナシニ治スルモノ九ニ居ル
之ニ反シテ英國ノ都府靨動ノ病院ニテハ梅毒
病ノ諸症ニ好ンテ水銀ヲ用フ若シ原始病ナル
ハ所謂青丸ヲ
生水銀一戈 玫瑰昆施尓布三戈ヲ加ヘテ搗

知シ甘草末一匁ヲ加ヘ五人量ノ丸トナス
朝夕ニ三九夕ニ一九ヲ與ヘ病状ニ従フテ三
週ヨリ六週ニ至ルマテ持重スヘシ而メ疳瘡ニ腐蝕
剤ヲ貼セスメ唯単膏ヲ以テスヘシ
亜別尓涅帰人(アルヘルチヌイ)名ノ行フ所ニ赤石ノ如シ其病尚劇
シキ燃衝アリ或ハ腫瘍侵蝕シ寒壊直ノ如ク見
ヘ或ハ患者感動甚タシキハ水銀ヲ與ヘスシテ此
医範ハ良善ニメ原始疳瘡ニモ導ケ疳瘡ニモ並
ヒニロヲ開ケル瘡瘍ニヨク適応ス
亜私多例(アセタレ)百尓(ピン)名ハ侵蝕腐壊セル疳瘡ニ一日
ニ三次ツヽ消酸ニ三十滴ヲ水一北ニ加ヘテヲ
又他人ハ薩尓撒巴栗烈(サルサパリラ)煎ヲ此ニ症度ス
骨病ニハ丹汞ヲ用フ
之ニ反メ英國ノ司健宮ハ梅毒病ニ水銀ヲ用ヒ
ス防蝕ノ食料下剤溶湯ヲ用ヘテ治セリ此諸方
ノ義ハ下ニ詳ニスヘシ
〔義〕水銀ハ常ニ人ノ健全ヲ傷リ連用スレハ水銀
病ヲ起スノミナラス且ツ此毒ヲ凝流ニ体ヨリ
掃除スルヿ能ハサルヿ屡之カルカ故ニ之ヲ恐

レテ用ヒサルモ亘ナル哉水銀病ノ説下ニ詳カナリ

蒲弗涅尓（グヱフヲチル）人名ハ肉眼及ヒ鏡ヲ以テモ共ニ水銀ヲ多服シタル病人ノ血汚尿唾中ニ水銀球粒ヲ成シテ集ルヲ見タリ（ロレンソカンケュ）盧連曾甘黙人名モ又水銀粒ヲ集シテ尿中ニアルヲ現出セリ

水銀ヲ多服シ或ハ多ク皮上ニ擦入シタル梅毒病人ノ体中ニ水銀再ヒ故ノ全状ニ復リ流動シテ骨髄中ニ入リ数年或ハ生涯発ニ止リテ関節中ニ不治ノ疼痛ヲ起シ仮令多或ハ梅毒骨痛ノ名ヲ命スルヿ人皆知ル所ニメ解　学舛ノ珍庫ニモ之ヲ證スル骨ヲ蔵メタリ

碌烏弗利尓（ウフリール）及ヒ徳私多（共ニ人名）ノ塗擦療法ニ鉄錬療法ヲ兼施シ或ハ之ヲ兼用セスメ紅久ノ梅毒病ヲ治スルニ効ヲ奏スルヿ能ハス却テ衰憊スヘキ実験アリテ終ニ水銀病及ヒ吐涎痛ヲ残スヿアリ是水銀ヲ連々久用シテ清食機営養機補形機ヲ害シ終ニ之ヲ復治セサルヲ得サルニヨルナリ〔子輩ハ意ノ及フニ従テ此病人ニ強盛ニセンコヲ務ム〕水銀ノ外ニ此ノ如ク人ヲ苦ヒタ

キ器具（内或ル貴重ノ器ト雖モ之ニ對メ忽チ旅スルナリ）構造中ノ生気ヲ歴絶シ且ツ全ク妨碍シ滅絶スルヲ実ニ瞭然タリ

軟弱ナル草木モ近傍ニ少量ノ水銀ヲ置ケハ生長ヲ妨ケ終ニ凋枯スル諸小虫乎風休風頭風ノ如キ蠕虫（梅毒膿中ノ虫ヲ云）ノ如ク速カニ死ス

我体ノ腸液ニハ千万無数ノ蠕虫アルヲ常範トスルヲ男精中ニモアルカ如シ寃理物産家モ之ヲ設尓加里亜ト名ク精中此虫ヲ孵ケハ交媾シテ胎孕セス腸液及ヒ乳糜中之ヲ飲ケハ消食機及ニ営養機妨碍セラレ機器ノ構造ト成形ヲ紀ヲスヽ

導尿梅毒及ニ殊ニ原始疳瘡ノ膿中ニモ亦屡ミ顕微鏡ヲ照ラメ其固有ノ地形ヲ見タリ○此病人ニ甘汞ヲ与フレハ此虫消滅ス二日後又生ス此病人ニ下剤ヲ与ヘ食料ヲ減スレハ此虫又消滅ス又之ニ菜汁ノ虫ノ成形ニ善アル者醋后性ノ茶剤即チ剥屈忽鳥蔓尿撒巴茶列苗香阿片容山酸等ヲ与フレハ初日ニハ虫ノ勢力減ス第二日ニハ始ント生ヲ失ヒ第三日ニハ全ク

死ス此時ニ方ツテ此劑ヲ止ムルヿハ二三日ヲ
經テ又漸ク之ヲ見ル
日々大便ハ共ニ通利スル虫モ健康ナル人ノ唾
及ヒ乳汁中ノ虫モ亦相同シ予ハ百倍若ハ千倍
大ノ良顕微鏡ヲ以テ之ヲ見タリ此虫モ甘汞及
ニ石ノ酷厉某ヲ用フレハ死シ有カノ食肉及ヒ
多精ノ某劑ヲ用フレハ此虫ノ数ヲ増加ス
印(インケツス)度福加人名ハ自テ試驗メ水銀ヲ踰ヘテ梅毒ニ
効アル浸劑中ニハ十八月ヲ過ル後ニモ一箇ノ
虫ヲ生セサルヿヲ見タル人ニメ右説ト同様ノ

臭驗ヲナセリ

原始疳瘡ノ虫ハ総身ニ梅毒ヲ傳布スルハ男精
虫ノ胎孕ニ與ルカ如クナル子予ハ許多ノ顕微
鏡五ノ経驗ニ由テ原始疳瘡ノ初メヨリ虫ナリ
ヒ入術ノ輔助ヲ以テ之ヲ減スルモ此虫ナケレ
ハ曽テ全身梅毒病ヲ起サヽルヲ精細ニ證シ得
タリ此故ニ精蜜ナル試驗家モ予カ無数ノ試驗ノ
説ノ考覈ヲ校定センヿヲ庶ス
此原始疳瘡小虫ナク或ハ些シノ之アル症ハ予
常ニ其症ノ軽ク経過スルヲ見此症ハ軽キ梅毒

ヨリ起リ来ルヲ知ル此症ニハ尓来タ曽テ水銀ヲ與ヘス唯梅毒ヲ制スル剤ヲ与フ此剤ハ假令水銀ノ如ク効力烈シカラスト雖モ梅毒病人ノ体中ニ起ル所ノ非常ノ成長成形ヲ制止スル者ナリ

之ニ反メ予ニ梅毒ノ病膿汁中ニ殊ニ多シク虫ヲ生シ局処病ヨリ速カニ全身病トナル症ニ水銀ヲ必要トスルヿ速カニ経過スル臓膜咽喉撒衝及ヒ猩々熱ノ劇症ニ於ルカ如シ是レ此諸区ニ於テハ成形機軽感ニメ非常ノ物体ヲ生スルカ故ニ速ニ此機ヲ抑制シテ発生補復機ヲメ多ク進ムヿナカラシムルカ為メナリ

比尓列蛭沙鳥児蜀及ヒ汚尓人共ニ名ハ既ニ疳瘡中ノ虫ヲ論シ露児屈人名ハ此論及ヒ他ノ梅毒病性ノ説ヲ擴尓シテ曰ク舎密術ヒ顕微鏡ヒ此毒本性ノ合和内性ヲ発現スルヿ能ハスト此説ヒ真ニ迫ルカ如シ然レヒ尚一疳瘡ト称スル者百症ノ中ニ就テ真ノ梅毒病ハニナニ充サルヲ考ヘ尚二方今顕微鏡ノ製造古代ニ踰ヘテ精妙ヲ極メルヲ考レハ則チ今時ハ此虫ノ義ヲ尚ヲ

詳カニ探索シ假令此病十症ノ中一モ之ヲ見ス
ト雖モ此虫ハ独リ真梅毒淸瘡ニノミ之アリ故
ニ此虫痛ク病ナルコトヲ思フヘキナリトス
智上ニ擧示スル所ノ諸説ニ就テ考フルニ水銀
ハ梅毒ヲ制スル適薬ニアラスシテ唯総テ非常
ニ旺盛ナル成形ノ核ヲ柳制スル効アル者ナルコ
ヲ知ル而シテ他ノ効力緩弱ナリト雖モ同功ア
リテ害少ク幾多ノ梅毒病ニ水銀ニ代用シテ其
功ヲ補フヘキ茶剤アルコト明カナリ
茲ニ属スル者ハ赤砒即チ入ノ羊鉄汰防炊剤殊ニ
清涼下剤及ヒ此他蒸気浴若クハ刷尿ヲ催促シ
テ過盛ナル成形カヲ柳ヘテ常度ニ適ハシムル
効アル植物ナリ
此法ニ依テ数千ニ梅毒病入根治スルコト八十年
来ノ実験ニテ十分ニ證スル所ナリ〇余カ斯ニ
掲スル品ハ植酸山酸固牡羅屈塩揮発羅屈塩私
百方斯里屈納律謨水英 亜山帰来剥屈福多薩尓
撒巴栗列方鳩容菖蒲根 胡桃及ヒ
他ノ幾多ノ梅毒ニ適気ト称シテ此下ニ各別ニ
論示スル諸品是ナリ

〔信〕梅毒病ハ非常ニ旺盛ナル成形機ヲ兼ヌル患ナルコトハ其毒一種ノ刺戟性アリテ常ニ体中諸部ノ組織中ニ攻衝状ヲ引起シ〔患部ノ殊異ナルニ随フテ其形チ自ラ異ナリ〕而メ其病怒動スルノ多小ニ従フテ非常ノ症状ヲ出ス未リ皮疹粘膜疣骨脹之ニ次テ未ル等ニ依テ知ルヘシ此故ニ尚久シキヲ経サル局処及ヒ全身ノ梅毒病ハ唯食料ヲ減ス軽キ防攻剤ヲ與ヘテ営養ト成長ヲ奪却シ全治スルヲ要之アリ水銀ヲ用ヒスメ此法ヲ行フハ晩近称誉スル人患タ多シ

然レ𪜈古流ニメ全身ノ皮骨中ニ根拠シタル梅毒ハ水銀ヲ用トスル唯古剤ヲ以テ治シ得ル子ト問ハヽ予等否ト応スヘキナリ〔下條ヲ見ヨ此症ニハ或ハ水銀擦法及ヒ鉄錬療法ヲ用ヒ或ハ剥屈福烏多薩尓撒巴栗列等ノ怒汗剤ヲ用フ第三梅毒ノ治療ニ諸般ノ法アリ之ヲ総括シテ考レハ其中一箇ノ法モ全ク廃棄スルヲ得ストⅠ虽トモ其状態ニ従フテ自他互ニ撰用スヘシ爰ニ此諸法ヲ掲示シテ追次矢明セン

〔天〕軽キ防攻療法ナリ　歇尓屈尊碌烏私設亜烏

垤私魯起列私共ニ初メ之ヲ用ヒ其後ヲ篤誤導
格列屋扁歇乙謨及ヒ他ノ許多ノ入之ヲ用ヘ
強壮多液ノ人及ヒ多血ノ男子ハ最初適好浮血
シ強盛ナラサル人ハ最初ニ梅耶尼老別里塩ノ
下剤ヲ与ヘ漿子ヲ飲食ヲ菲クシ肉食多猜ノ者
厚麦酒ヲ禁ス唯一日ニ三次ツヽ水煮汁少許水
或ハ薄キ犢煮汁中ニ煮タル米碾麦大麦ヲ用ヘ之
ニ加フルニ少許ノ白塩飯ヲ以テス此他日々新
扱水ヲ多飲シ病室ヲ同等ニ温カニシ殊ニ寒冷
ニ過スヘカラス

此療ハ其病状ニ依テ二三週ヨリ五週マテ連々
施用ス

酷厉毒ニ依テ侵サルヽコトナキ健康ナル人原始
痲瘡淳怒倭毒梅毒白帯下淋病ヲ患ヒ諸症軽易
ニメ腫瘍徐々ニ経過シ侵蝕セス其膿汁未或ハ
些カニ出アリ或ハ全ク之ナク亜尓加里性ニモ
酸性ニモ見ヘサル症ニハ右ノ療法ヨク的中ス
更ニ楡皮煎癬皮煎石灰水「ゴゥラルド」水ヲ以テ其
瘡ニ貼スヘシ

已例斯拂即私都府ノ病院ニ於テハ梅毒病ノ諸新症

ヲ治スルニ殆ント皆此法ヲ用ヒ兼テ芦根山牛
房根等ノ煎汁ヲ與フ
帝衆結匹名ハ怒謨蒲尓屈地名ノ総病院ニテ多年永
千万無量ノ梅毒病人ニ水銀一氏ヲモ用ヒス右
法ヲ行ヲテ治セリト云フ此入嘗テ水銀剤ヲ用
ヒタル後ニ残留スル加キ悪症ヲ救スヲ見ス
又此治法ヲ行ハサルヘカラサル症
アルヲ見ス」許多ノ梅毒病人自ラ水銀ヲ用ヒサ
レハ治スヘカラサル者ナリト思フカ故ニ下剤
ノ方書ノ表ハ病人ノ心ヲ安センカ為ニ水銀ノ

名ヲ記セリ
原始及ヒ蔓怒痕瘡速カニ周邊ニ曼延侵蝕シ専
フ別種ノ状貌ヲ現ハス局処病ヨリ急ニ全身病
ニ轉移スル症ハ此哀教療法右法ハ体力ヲ哀弱
リノミニテハ不足ナリ セシム故ニ此名ア
予此症ニハ毎晩甘汞一氏ニ阿片蔘四分氏ヲ和
シ与ヘ腫瘍ニハ水銀ヲ用ヒ痊癒ニハ軟水ニ升
汞ヲ加ヘ用ヒ急疾ナル荒敗ヲ防禦ス但水銀ヲ
用ヒテ恒シカラサル症候ナキ時ノミ右方ヲ処
スルナリ○総テ此症ニハ所謂拂出療法ニ水銀

ヲ兼用シテ適當ヲ〔下條ヲ見ヨ
予此法ヲ行フニハ常ニ梅毒膿中ノ虫消滅スル
ト復生スルトニ注意シ之ニ從フテ甘汞ノ多少
ト速進徐服トヲ定メ或ハ又汞甘ニ交換シテ莘
涅滿溶汞ヲ用フルニ其分量ヲ定ム○隔晩ニ甘
汞半仄ヲ一仄ヲ足ルヲ度トアリ
○此ニ兼子ルニ飲食ヲ節ニシルヲ所謂防燫療
法ニ於ルカ如クスヘシ
帯緑帯多謨尊人名ハ二十四年赤水銀ヲ用ヒスメ
梅毒病ヲ療ス皆ヨク良効ヲ得タリ

儒佛林地名ノ如尓窓捨児人名ノ説ニハ原始梅毒病
水銀ヲ用ヒスメ施治スル者百四十人ノ中導怒
梅毒病ニ轉スルモノ唯五人アリ又他ノ原始梅
毒病人百五十二人ノ中唯四十一人ノミ水銀ヲ
用ヒ百十一人ハ之ヲ用ヘスメ療シ其水銀ヲ用
ヒタリ病人ノ中ヨリ導怒病ヲ起ス者二人アリ
水銀ヲ用ヒスメ治シタル病人中ニハ導怒梅毒
症ヲ起ス者些カニ三人アリト云
葛沙尓、怒鳥原私人名ハ梅毒病水銀ナシニ排除シ
得サル症一ニ之アルコトナシ又腱関節及ニ骨ノ

梅毒病ニハ水銀適当ニス却テ剥盧福鳥多格児
矢屈謨ヨク此症ヲ治スト云

〔地〕掃出療法ナリ一ニ死救療法ト名ク
此法ハ水銀ヲ尤モ多ク内服シ或ハ間擦剤トメ
外用シ梅毒ヲ制伏スルニ至ルマテ務メテ永ク
吐涎ヲ防キテ其病治スルニ至ルマテ与ルナリ
〇此法ハ急速ニ曼延スル尊発病全身ノ梅毒ヲ
シキリ経タル者皮病等ニ行フヘシ
茲ニ諸般ノ法アリ

〔日〕永剤ヲ用服スル掃出療法ナリ此法最モ多ク
用ヘ易クメ最良ナリ者ナリ之ヲ行フニハ預備
法ヲ要セス故ニ吐涎療法　擦療法鉄鍼療法ヨ
リモ用ヒ易シ其方

甘汞　半氏　若クハ一氏至一氏半
阿芙蓉
金硫黄各四分氏

右混和シ朝夕ニ用フ

一二日此剤ヲ用フレハ又他ノ水銀制剤ヲ撰用
シ殊ニ吐涎ノ徴ヲ見ハ朝夕葦湿滿溶剤半氏ヨ
リ一氏一ヲ金硫黄少許ヲ加ヘテ其一二日

ヲ経テ後吐涎ヲ徴ヲ見ハ永剤ヲ停メ旋那大黄
ノ下剤ヲ与ヘ兼テ温保シテ汁ヲ怒シ芦根山ヤ
房加列尼私亜列那尓　ノ徴温煎湯ヲ多服シ
而ル二局処ノ梅毒症尚消除セサレハ再ヒ上ニ
楊示スル所ノ甘永散或ハ間又升永ヲ与フ
此療法成効ノ後ハ機那徴温硫黄浴最後ニ鉧鉄
浴湯ヨク適応ス
疳瘡及ヒ他ノ局処病ハ只水銀ヲ用ヒスメ療ス
若シ梅毒悪性ニメ治セサレハ次法ヲ試ムヘシ
〔月〕擦永掃毒療法ナリ支格乙混亜鳥及ヒ発鳰
納萬共ニ入名ノ行フ処ニメ吐涎療法ニ於ルカ如最
初ハ棚毒ノ預備法ヲ行ヘ次ヲ日々水銀軟膏ニ
我ヲ取リ炭火ニ添テ手足五ヒニ交代シテ擦入
ス其法患者一室ニ蟄居シ身ヲ温保シ芦根薩尓
撒巴栗刺加列尼私亜列那里亜ノ煎汁ヲ飲服シ
吐涎将ニ起ラントスレハ擦膏ヲ止メ怒汗瀉下
セシムレハ吐涎全ク治ス
吐涎ノ徴候尽ク去レハ再ヒ永膏ヲ擦入シテ後
タ吐涎ノ兆ヲ現ス二至ル此兆已ニ現ルレハ又
発汗剤及ヒ下剤ヲ与フ此ノ如ク三週若シクハ

六週ヨリ八週乃至十二週ノ間交換シ二三回ヲ
ノ永膏ヲ用ヒ既ニ梅毒諸症尽ク消除スル後尚
二週時間連進ス
原始梅毒病ニハ此法適合セス又傳染毒ヲ
悪性ナキ[illegible]ハ亦用ヘカラス
〔星〕佐合掃毒療法ト名ク内外同時ニ永剤ヲ用ヒ
テ吐涎ノ兆ヲ現ハスニ至ルヲ以テ乃チ予ハ外
部ニ水銀軟膏ヲ擦リ同時ニ甘汞或ハ蒸湿満製
剤ヲ用服セシム
此法ハ全身梅毒病ニ施用スヘキ者ナリト雖モ

之ヲ行フヲ多キニ過レハ急ニ大吐涎ヲ怒シ易
シ故ニ前二法〔日〕〔月〕ノ法ヲ良ナリト其中ニ就テ消
食機ヨク調フテ身体強健ナル人ニハ永剤ヲ内
服スル掃毒法ヲ良トス消食機亘シカラス衰弱
セル人ニハ永ヲ擦入スル掃毒法ヲ撰フ
右三法共ニ其病尚久シキヲ経サルヨリ六日ヨ
リ八日マテノ間ニ已ニ吐涎ノ兆ヲ見ハ之ホト
ニ水銀ヲ多量ニ用フヲ急速治法トス若シ其
病既ニ久シキヲ経ルヨリハ唯両三日ヨトニ内外
ニ永剤ヲ多量ニ用フヲ急速治方トス若シ其

之ヲ緩慢治法ト名ク

〔ハ〕所謂排泄療法ナリ是レ梅毒病ノ古治法ニメ唾腺及ヒ皮膚ヨリ梅毒ヲ分離排泄スルヲ主トス〇予輩之ヲ分テ二ト為ス

其一ヲ

排泄療法トス〇此法ハ頼ルニ足ルサル法ニメ四週間日々頭ヨリ足ニ至ルマテ灰白汞膏ヲ擦入シ原ト羽衣中ニ予臥シ病室ヲ列氏驗温器ニ八度ヨリ三十四度マテノ晩サニレ大汗大吐延テ起サレムルナリ二百年前ニハ一般ニ此法ヲ取リ行フトモ晩今ニ至テハ此法ノ悪性癲癇無智病水銀労瘵水銀毒瘍骨膿腐骨ヲ引起スルカ故ニ医家之ヲ忌用セス最之ヲ用レハ許多ノ患者治セスメ梅毒ナルカ将タ汞毒ナルカヲ実驗スレハナリ

其二ヲ吐延療法トス名ク是亦上古ノ法ニメ最モ多ク害アリ且ツ尽ク根治スルヲ能ハス故ニ茲ニ之ヲ畧ス唯的中スヘキ所謂鉄錶療法ヲ論シヘシ

鉄錶療法ヲ行フニハ患者預シメ先ツ八日ヨリ

十四日ノ間微温浴及ヒ軽キ下剤ヲ施シ吹量ノ
食物ヲ与ヘ日々唯一二骨布盂名ノ煮麦水柿麦酒
一二羅土ポート四斐ラ一羅名ックノ小麦飯ヲ用ルヲ度トス
列氏験温器十六度ヨリ十八度マテノ温室中ニ
居ルヘシ〇四十八時洋時ナリ放卵ノ二昼夜ナリコトニ水銀
軟膏ニ斐ヲ擦入シテ吐涎スルニ至ル然レ共此
吐涎ハ連々強ク進ムヘカラス
華設人曰ク此以下数段此人ノ
ノ実験ニ従フニ斯引ヲ論ヲ建ツ今日ニ至ルマテ
重シ下剤セントス水銀ノ内服ヲ禁スヘキ症ア

晩

リ或ハ胃腸水銀ニ感スル機予常ヨリモ増盛シ
之カ為ニ水銀製剤少量ヲ用ルモ忽チ症痛崩下
吐吐ヲ怒シ消食機ヲ妨ケ或ハ剥吐涎ヲ起シ或
ハ之ニ反メ諸疾剤ヲ久服スル後チ已ニ全然對
抗機ヲ怒セス又梅毒病已ニ局処ニ止ラスシテ
全身ニ蒲蔓シ殊ニ皮骨ノ病トナリテ明カニ機
器荒敗スル者及ヒ殊ニ諸種ノ梅毒病水銀ヲ内服
シテ治セス或ハ一回治シテ名又早魃前症ヲ怒
シ或ハ他症ヲ起スヲ者ニ適中ス
之ニ反メ皮系水銀ニ感スル性過不及アル人及

ニ患メ衰弱シ神五質ノ感動敏鋭ニ過キ子宮衝
迸病依剥昆垤児ヲ患ヒ血液丸ニ沸騰シ胸中困
重咯血労瘵熱水腫共ニ甚シク倍苦（此下ノ五症ハ内
外共ニ水銀ヲ禁ス司スノ説トヲ患ヒル者ニハ此療
法宜シカラス
姙娠中ニ亦総テ之ヲ禁ス唯止ムヲ得サル症
ニハ天ニ勤慎メ之ヲ用フヘキノミ諺ニ曰ク
若シ妊婦ニ擦汞法ヲ用ヒテ流産セサルモ其児
産後久フメ後テ必ス死ス多クハ初年ノ間ニ衰
弱及ヒ消耗病ヲ患ヘテ死ス

此療法ヲ行フノ前ニ預備法ヲ処スルハ直テニ
水銀ヲ単用スルヲ禁スル所ノ諸重症ヲ除キ去
テ水銀ヲ用フヘカラスレメンカ為ナリ
此預備法ハ人術ヲ以テ機器ヲ消耗衰弱スル者
ナリ是レ吸収機ヲ増スニ必要ナルコトメ治療
ハ主トメ此機カニ係在スレハナリ故ニ預備法
ヲ行フノ間モ之ニ次テ内外治法ヲ施ス際ニモ
カメテ多ク予生ノ食物ヲ禁ス保生ノ為ニ必要
ナル量料ヨリ多ク用フヘカラス助テ鍼灸療法
法ナリ

此故ニ大人ノ食養ニハ日ニ三度四号ヨリ六号
マテヲ極メテ稀キ肉羹汁ニ少許ノ麦大麦等
ヲ加ヘテ製シタル淡薄羹汁或ハ水八号ニ小麦
銑一号ヲ加ヘ煮タル羹汁ヲ許ス共フルノミ謨
私萬曰ク肉羹汁ハ殊ニ蠕虫ヲ生シ易シ而ルニ
此虫ヲ生スル機営ヲ変スルヲ此療法ノ首義トナ
スカ故ニ之ヲ用フレハ茲ニ妨障アルヲ以テ水
製羹汁ヲ直トス
朝啜羹ニ代ルニ止ムコヲ得サレハ一骨布ノ
骨非ヲ許シ此預備法ヲ行フノ初メ三日間ハ煮

タル甘景少許ヲ許ルス〻シ〇他ノ諸食物殊ニ
肉食ハ嚴禁スヘシ
飲料ニハ水ヨリ他ノ物ヲ与ヘス假令与ルモ薩
尓撒已栗列根山午房根或ハ過尓他根ノ煎汁ヲ
以テスルノミ但消食機ヲ困厄スルヲ避ルカ為
ニ二十四時中ニ三廿ヨリ多キニ過スヘカラス
穆私萬曰ク緩慢ナル梅毒病経久ノ輪癬等ノ患
ヒテ既ニ魯鳥弗私尓又ニ律私多共ニ名ノ擦汞法
銭銭法ヲ用ヒタル人ニハ甚タ稀キ麦酒ノ新ナ
ラス陳ナラス硝子壜中ニヨク貯ヘテ盃ニ移注

スレハ泡沫ヲ起シ茶褐色ナル者ヲ飲料トナシ
共ヘテ曽テ害アルコトナシ
又兼テ一室中ニ病居シ努メテ寒温気ヲ避ケ但
温ニメ善ク乾燥スルヲ要ス日ニハ一二時間開放セ
ル気中ニ出ルモ可ナリ風日ノ宜シカラサルコ
自ラ明カナリ
此預備治法ハ下剤ヲ共ヘテ大便ヲ通ス其方ハ
患者ノ体質ト年齢トニ従テ配合メ異ニス是腸
胃ノ汚物ヲ掃除スル殊ニ体中ノ液ヲ奪除シテ皮
庐及ヒ内臓ノ吸收カヲ盛ニシ水銀ヲ愈多吸收

セシメンカ為ナリ
然レ𪜈此下剤ニハ甘汞ヲ用フヘカラス又茲ニ
浮血法ヲ行フヘカラス但シ恐ルヘキ炊衝若ク
ハ血液鬱滞ヲ兼ル症ハ許シテ血ヲ浮ス
温浴法ハ皮庐ヲ清クシ吸收カヲ強クシ固形部
ヲ軟カニシ流体ヲ泄ス易クシ故ニ茲ニ必要ノ
法ナリ○日々單湯浴ヲ行フ其温度ハ患者ノ意
ニ適フヲ良トス但シ列氏験温器ノ十九度ニ過
クヘカラス度数有誤○患者此湯中ニ一二時ノ間浴
スヘシ譬𪜈曰ク列氏ノ十九度ハ甚タ冷ナリ

恐クハ華説ノ誤ナラン必是二十九度ニウメカ
ヒナシ列氏二十五度ヨリ二十七度マテノ温浴
ヲ尚冷ニ過タリトスル入屋之アレハナリ
茲ニ於テ預備法ト下剤トヲ共ニ飲メテ擦永法
ヲ行フ此下剤ハ十四日間行フヲ常則トス此ニ
次テ行フ所ノ擦永法ヲ良効アルニ右ノ諸法ヲ
厳シク特重スルニ係ル者ナリ
許多ノ実験ニ従フニ此預備法ヲ行ノ間ニ已ニ
梅毒瘡転快スルヲ得未タ水銀ヲ用ニサルニ良
膿ヲ醸シ全病将ニ治セントスルアリ誤ル多日

クヲモ亦自ラ実験シテ右説ノ予ヲ欺カサルヲ
知ル若シ緩慢ナル病ニメ上顕及ヒ懸壅垂速カ
ニ荒敗ヲ受ル恐レナキ症ニハ此預備法ヲ首タ
ル療法トシ多害毒某ナル水銀ヲ擦入スル法ヲ
取用セス唯数週此法ヲ特重スヘシ完ニ此法ヲ
行フテ治シタル陳痼梅毒病ヲ例ヲ以テ明カニ
知ル所ナリ
此預備治法ヲヨク持重シ行フヿハ愈重要ナリ
ト雖モ然レモ患部ノ状態一異変症アレハ則チ
此療法亦変セサルヘカラス或ハ唯其期日ヲ短

クレ或ハ全ク此法ヲ用ヒサルナリ乃チ懸壅垂
硬上顎軟上顎扁桃等ノ如キ貴重ナル部損失ス
ルノ恐アリテ急ニ之ヲ保護スヘキ症ニハ律ル
多人名ハ此預備法ヲ行フヲ日期ヲ短クシテ四日ニ
縮メ屡良果ヲ得タリ
之ニ次テ用ル所ノ擦永法ハ身体諸部ヲ皆悉
ニ尋常ノ水銀膏ヲ取リ時日ヲ期シテ須次ニ擦
入スルナリ此法ヲ行フニハ鍼鍼法及ヒ温室間
蟄法ヲ續ヒテ施スヘシ○擦入スヘキ軟膏ノ量
ハ大人ニハ常ニ二匁ヲ用フ

之ヲ擦入スヘキ部ノモヲ別ケルノ後チ初メハ
朝後ハ晩ニ軟膏ヲ取リ最初ニ両脚共次ニ股券
三次ニ両肘ニ掌前ヨリ肩ニ至リ券四次ニ背脇
ヨリ項ニ至ルマテ温手若クハ他人ノ介助アレハ
草球ヲ以テ擦入シテ敷乾クニ至ルヘシ但シ間日
ニ之ヲ行フ
根治法ニハ十二次ノ擦入ヲ要スルヲアリ此法
ハ通常廿六日ニメ終ル然レモ一異症状急発ス
吐涎アリテ日期ヲ短クスルヲアリ（又上輩ノ説此療
法ヲ行ニハ通常十三日ヨリ十六日ノ間ニ始メ

テ吐涎ノ徴ヲ現ハス即チ煩悶不浄呼吸困難脈
実舌苔腹脹痛心悸不熟蒜屡驚覚シ小便渋小便
秘是ナリ
此急吐涎ノ諸症ハ九ニ汗ヲ発シ二便快利スレ
ハ則チ速カニ治ス
此諸症ヲ発スル時期ヲ病毒分肉ノ時限トナク
此時節ニハヨク注意メ寒気ヲ避ケ蓐中ニ居リ
接骨花ノ浸剤ヲ温服シテ徐々ニ発汗或ハ四時
若クハ六時ヨリ十時ニ至ルマテ続ヒテ発スル
ヲ促スコト医家ノ専務トス

此発汗ノ終リニ至テ腹中雷鳴風気腹痛病毒分
肉ノ汗ヲ発シ全ク体マサル際ハ医家下剤
ヲ与ヘテ之ヲ促セハ害アリ華説人名曰ク医家方
術ヲ進行スル前ニヨク注意シテ此病毒分肉ノ
症ヲ見ハスヲ待ッヘシ
其後テ通常此療法ヲ行フテヨリ第十六日ニ復
晩ニ遅ク標法ヲ行ヘ次日下剤ヲ与フ是レ緑鳥
弗剌尓律私多弗設律人名ノ経験ニ従ヒハ其最終
ニ改正ニ発スル病毒分肉ノ諸症之カ為ニ休シ
且ツ之カ為ニ腸ノ排泄直チニ増加スルヲ以テ

次回ニ用ヒタル擦膏ノ全身諸器及ニ殊ニ強ノ
衰力感スタル唾腺上ニ現発スル効力ヲ制壮ス
ルニ亘レキヒナレハナリ
此故ニ今マテ行ヒタル朝擦法ヲ晩擦方ニ変シ
二三日コトニ其一次ヲ晩ニ遅クシ間日ノ早朝
ニ下剤ヲ与ヘ三四五次ノ晩擦法ト同数ノ下剤
ヲ行フヲ以テ此治法ヲ結尾ス然レモ此下剤ヲ
此時限ニ用ルハ妨メテ小量ナランコヲ要ス之
此症多クハ大ニ浮下セントスル勢アレハナリ
○此療法ヲ行フ間ハ始終乾温ナル小室中ニ居

リ必要ナルコアルニ非サレハ窓ヲ開クヘカラ
ス是此時ニ方テハ些微ノ冒寒ニ大害ヲナセハ
ナリ
食物モ又上ニ挙示スル法ニ従フヘシ但甚タ衰
弱スル人ニハ一卵黄及ニ一食匙ノ蒲萄酒ヲ刺
激尼私ノ塩味ナキ無味ノ製法ヲ云フトヲ為シ与ルヲ許スヲ異ト
ス
此療法ヲ行フコト前方ノ如クニメ第二十六日ニ
至レハ此日ニ患者ヲ微温湯ニ浴シ四分時ヨリ
半時ノ間其中ニ止リ焼酒ニ石欽ヲ溶カシ海綿

ヲ浸シ之ヲ以テ全身ヲ洗浄シ温巾ヲ以テ拭ヒ
乾カシ而シテ佑テ又他ノ清湯ニ浴シヘシ
若シ諸雑症感受機過敏ニメ消耗セル人ニ殊ニ
之アリ或ハ急発大吐涎アリテ尋常ヨリ早ク此
療法ヲ厭メサルヘカラサル時モ亦此浴湯法ヲ
行フ
梅毒病ニ殊ニ侵サレタル部ニ外表ヨリ一種ノ
局処療法ヲ行フヲ此療法ニ兼施スルヲ要ス
（以上華説ノ説ナリ）
黛氏療法ハ吾代ノ梅毒療法ナリ其法躯体ノ患

者ヲ善ク密閉セル箱中ニ居ヒ唯頭頸ヲ出サシ
メ朱砂ヲ熾炭上ニ撒シ其蒸気ヲ以テ全身ヲ薫
シ四十八時ヨトニ此法ヲ行フ
此法ヲ行ヒハ多クハ速カニ大吐涎瀉四支振
掉ヲ起シ或ハ又間卒厥シテ死ス屡又真ノ水銀
労療ヲ怒ス故ニ今改ハ又ヲ用ルヲ甚タ旆ナリ
假令之ヲ行フモ全身ニ施スヲナシ唯近世頑固
ナル梅毒怒瘍病骨病及ヒ咽喉中ニ隠伏シタル
疳瘡ニハ局処薫法ヲ行フテ効ヲ得タリ
咽喉中ノ疳瘡ニハ尋常ノ烟草ニ朱砂ヲ混ス薫

スレハ甚タ大効アリ其方

煙草一ヶ
朱砂二匁

右混和シ次テヨク乾カス日々之ヲ一二三管ツヽ薫シ其烟ヲ患者ノ鼻ニ通セシム

別尓林（地名）吳弗扁按尽（人名）モ亦梅毒咽喉瘍ヲ及ニ殊ニ鼻瘍ニハ水銀ヲ内服シ之ニ加フルニ水銀烟ヲ含舎セル煙ヤラ用フレハ幷永ヨリ速カニ治療スルヲ経験シタリ此人ハ朱砂ニ代ヨリ六ケ敷ヲ製シテ之ヲ薫セシム

梅毒病ノ治スル良法ニ尚一二ノ異説アリ各箇ノ治法ヲ論示スルニ先ツテ茲ニ之ヲ掲示

センコッテン（名地）ノ古医非謨刺（人名）ノ説ニヨレハ梅毒病ヲ治スルニハ昆答芝鳥謨ト檵昌ノ性質トヲ考ヘサルヘカラス昆答芝鳥説トハ動物ノ毒ノ常ニ自ラ補培シテ傳染スル檵カアル者ヲ云フ檵器ノ性質ニハ唯其毒ニ十分對抗セサル負アルカ故ニ諸般ノ状態ニ依テ傳染スルニ多少軽重アル者ナリ

故ニ治療ヲ施スニハ〔第一〕務メテ傳染毒ノ勢イト已ニ患ル部ノ毒ノ水ノ患ヘサル部ニ感スル機動ヲ杜キ局処病ヨリ全身病トナルヲ防禦スヘク〔第二〕患者ニ多ク對抗機ヲ存セシヨク其毒ノ逼迫ニ敵抵セシメンコトヲ務ム

非謨刺ハ此病ヲ五等ニ分ツ

〔第一〕ハ病尚表部ニ在テ其傳染シタル部ニ留リ茲ニ粘液ヲ泄ス〇此症自ラ治スル者多シ譬ヘハ麻疹ノ如シ気中ノ酸素及恐クハ尿中ノ尿酸之ヲ助ケ癒スモノナラン〇衰弱スル人ハ這般ノ痲疾ノ后全身梅毒病ニ轉シ易シ非謨刺曰ク是レ其毒ニ對抗スルカ甚タ弱キニ生スルカ故ニ水銀少許ヲ内服セシムルモ迷レ氏人ヨク全身ニ蒲萄セサル痲疹ノ酷厉毒ト唯慢リニ酒厉毒也トスル処ノ全身梅毒ヲ已別スヘシ是近世起レル仙蒲氏ノ專ラ論説スル所ナリ

又梅毒痲ト梅毒ニ拘ラサル痲トヲ切見ニ弁明スル兆候アルコトナシ唯導発梅毒痲ハ古代ニハ多シト雖モ方今梅全身毒病ヲ患ル者ハ之ヲ系ルコトヲ施ニメ假令之アルモ全身ノ疾患アル

う以テ疑フ容ルヽ地アラヽニ依テ直ケニ安識ス
ヘシ

華設曰ク傳染ノ初メ疳瘡ヲ発スル内ハ之ト異
ナリ此症ニ次テ其毒遠ク他部ニ傳連スル者常
ニ多シ然レ𪜈疳瘡ハ初時尚純粋ノ局処病ニシテ
腐蝕剤ノ酸素ヲ含ム者刺必斯加烏私蟄尼私緑
青赤降汞ヲ以テ瘡ヲ掃除シ其毒ヲ酸化スレハ
此病ノ漲蔓ヲ抑製シ全身梅毒病トナルヲ防止
スト此説気ニ正理ニメ古賀里尼的児モ又其ノ
範中ニ同説ヲ載ス

蘭健別裁(ランケンヘット)ハ及ヒ他ノ諸人ハ之ニ反メ腐蝕ヲ以
テ外部ノ瘡瘍ヲ蝕スルヲ欲セス唯水銀ヲ内服
セシメ疳瘡ニハ更ニ薬剤ヲ貼セスメ内機ノ進
退ヲ伺フヲ標的トナス

予ハ通常多クハ原始疳瘡ニ腐蝕剤ヲ外敷シ水
銀ヲ内服セス唯減食ト水飲ヲ多クスルトヲ命
ス

第二ニ於テハ病已ニ他部ニ漲蔓スル是レ時期ヲ
以テ定ムヘカラス唯病状ニ真人ノ体壮トニ就
テ考覈スヘシ此時ニ方テ非謨刺人名ハ局処タト

ヘハ陰茎陰門中ニ水銀膏ヲ擦入シテ傳染毒ヲ
進跡セシメ内服ニハ設ケ必要トス
〔第三〕ニハ病已ニ全身ニ遍シ然レ𪜈全躰頑永タ
甚ダ衰弱スルニ至ラス患者陰処若ハ咽喉ニ瘡
瘡ヲ生ス此ヒニ方ヲ非謨刺ハ此瘡急ニ周回ニ
侵蝕シ陰茎懸壅垂等ヲ荒敗スルニ非サレハ只
常ニ水銀ヲ内服スルノミ若シ右ノ諸部ヲ急ニ
荒敗スル症ニ過ヘハ升汞ヲ外用シテ或ハ壅潤
剤トス或ハ喇剌トス
〔第四〕患者衰弱已ニ甚タシク梅瘡自壮ノ形状ヲ変
レ不潔ニメ侵蝕シ已ニ自壮ノ圍形ニメ脈肉状
ナル容ヲ失セ消食機衰弱シ慢性奇尓蘇ヲ患
ヘ非謨剌ハ此症ニ水銀必的中セス唯阿芙蓉キ
ナ龍脳ヲ以テ体力ヲ強クスヘシトエフ其后瘡
瘡又自壮ノ形状ヲ現スヒハ甘汞ニ阿芙蓉キナ
龍脳ヲ和シテ与フ然レ𪜈此症水銀病ナルヲ多シ
之ヲ分矢スルニハ唯此素功ノ有無ヲ以テ決ス
ヘシ
〔第五〕経久ノ梅毒病後新タニ又毒ニ染ムヿナシ
ト雖𪜈餘毒尚体中ニ存スルカ故ニ夜吐ニ依テ

寒温気ニ由リ鉄剤及ヒ銅気ヲ含ミタル泉水（ルモシト）
尓門多泉ヲ内服スルニ由ヲホレク再発スルヿ
アリ非謨剌ノ説ニ此症ヲ防クニハ二週未梅毒
諸症消滅スレハ則チ速カニ水銀ノ内服ヲ止メ
テ休息シ一二週ヲ過キテ后再ヒ小量ノ水銀療
法ヲ始ムルヲ以テ経久梅毒症ヲ治スル法トス
ルヲ最良トス此ノ如クスレハ其体再ヒ大ニ
之ヲ感スル壮ヲ得殊ニ他ノ水銀製剤ヲ撰用ス
ルヲ宜トス假令ハ初メテ升汞ヲ用フレハ後チ
ニハ一二週ノ間タ水銀軟膏ヲ擦入シ但吐涎ヲ
起スニ至ルコトニヲ〇若シ此療法ヲ怠メ
リ微シク再発スルヲ見ハ衰弱スル患者ニハ水
銀ヲ与ヘス山酸ヲ内服セシム
非謨剌梅毒諸症ニ首茶トスル方ハ擦汞方華湿
満溶汞及ヒ升汞ナリ其説ニ曰ク諸水銀製剤中
甲品ハ乙品ヨリ多ク金属状ニ近キヲ以テ分ツ
ト〇全酸化汞塩ハ半酸化汞全酸化汞ニ比スレ
金属質ヲ含ルコト遠シ
第二表製剤愈多ク金属質ニ近ケレハ愈吐涎ヲ
起シ易シ故ニ甘汞ハ升汞ヨリ吐涎ヲ発シ易シ

第二吐逆ヲ怒スルコトヤ者ハ全身消食機神復
機ヲ侵襲スル愈多キコト日々実験シテ知ル所ナ
キ故ニ小児感性敏鋭ニメ薄弱ナル人労瘵状ニ
見ユル人老人姙婦ニハ此永塩必適当セス
病諸骨及ヒ総テ労二級ノ諸見ヲ襲フ時ハ碌鳥
弗剌尓及ヒ律私多共ニ人名ノ擦永法ヲ大効アル某
トス然レ𪜈先ツ別尓庶人名ノ方ニ従フテ赤降永
二十分氏若クハ十六分氏ヨリ八分氏マテニ阿
芙蓉ヲ加ヘ粘液質アル某液ニ和シ朝夕ヲヘテ
試ムヘシ

碌鳥弗剌尓及ヒ律私多共ニ人名ノ療法ハ患者羸瘦
セス又悪液質ニナラサル者ニ施スヘシ然ニ間
又此病ニモ之ヲ用フルコトアリ
諸膜譬ヘハ角膜虹彩関節ノ靭帯多ク患ルヤハ
独尊某人名ノ療法ニ従ヘ弁永ヲ用フルヲ相当ト
ス〇黙尓庶里鳥私服(ニットラス)蔦刺私ノ製剤モ又此症ニ用
フ体力尚強キヤハ殊ニ宜シ
病多ク腺ニアル者ハ殊ニ弁永ニ矢鳩答阿芙蓉
金硫黄ヲ配ス患者曽テ腺病ヲ患ル者ニハ殊ニ
宜シ

病多ク神五ニ在リ患者脾病状ニメ痘疹ヲ発シ易キ時ハ亜的尓黙尓辰里亜私ヲ手ヲ非謨刺ト独尊地ハ最モ偏シテ梅毒病諸状ヲ論セス尽ク升汞丸ヲ賞誉ス其方升汞ナニムヲ蒸鎔水適宜中ニ溶シ白蔗餹心白砂糖各適宜ヲ加ヘ分ツテ二百四十丸ト為シ桂未若クハ石松末ヲ衣トス法ニ依テ服用ス

此丸ハ各二十分ムノ升汞ヲ含ム者ニメ間日四十毎二時午飯後ニ直ニ用フ晩キモ食後四分時若クハ半時ヲ過サス胃中充満シタル時ニ用ヒテ胃ヲ害スルコト勿レメ而メ少許ノ水若クハ麦酒ヲ追飲ス

其初メ四丸ヲ服シ毎服二丸ヲ増加ス三十丸ニ至テ此療法ノ終リトス〇大抵升汞ヲ用ルニハ之ヲ小分メ五六丸ヨリ八丸ヲ量ヲ服スルニ至ルマテツヽ毎次此間ヲ急ニメ連々飲服セシム〇若シ之ヲ服シテ吐逆スレハ其後直テニ同量ノ丸ヲ取テ阿芙蓉丁哉二滴ヨリ五滴ヲ加ヘ用フ服后三四五時ニ服痛ヲ起スヤハ老速枢横ニ消

ヨリ六滴ヲ用フ
此一剤ヲ行フ間ハ二十八日原昼七日ニ作ルヲ改ム ナリ
若シ梅毒ノ根治ヲ切実ニセント欲セハ諸症候
ニ拘ラス通シテ此療法ヲ行ヘルヘシ○若シ
吐涎ヲ起スニ由テ一二日此療法ヲ休ムルトキハ
其症去テ後再ヒ其休ノタル数ノ丸ヲ与ヘ四週
時ノ日数ヲ満ツ
兼テ薩尔撒巴粟列ヲ用フ其方此根ヲ細剉シ食
七一碗ヲ取リ八大骨布器名水ヲ以テ徐々ニ煮テ
半ヲ取リ之ヲ終日ニ服シ尽ス冷温ハ其人ノ

意ニ任ス
此全治療中九茶ヲ用ヒサル日モ断ヘス微々茶
気ヲ怒ス且ツ其斯日ノ間ハ食物ノ半ヲ減ス朝
タ少許ノ柿汁ヲ飲マレム○脂油姜ハ尽ク禁ス
且ツ酸ヲ避クヘシ此他禁忌ナシ○腫瘍ヲ治ス
ルニモ局処ニ茶ヲ貼セス
此猶尊地ノ療法ハ一未ハ梅毒病ノアル症ニ有
効ノ茶ニメ一未ハ諸茶ニ越ヘテ大ニ優レリ
若一患者之ヲ用ルニ艱苦ナク天気良ケレハ密
室中ニ蟄居スルヲ要セス又汚穢ナル摩永膏法

ノ如ク嚴密ニ養ヲ禁スルヲ要セス

第二食後直ニ之ヲ用ルカ故ニ曾テ消食機ヲ損セス却テ食気ヲ進ムヲ以テ此法ヲ用ヘテ療スルコト入タ多シト雖モ亦往往脱痛吐ヲ起ス人アルヲ見ス故ニ老達拙誤ハ一度モ用ヘサル者多シ

第三假令療治中ニ不意ニ冒寒スルト雖モ碌鳥弗刺尓及ヒ律私多人各所用ノ鉄錢法及ヒ擦汞法ノ如ク害アルコトナシ

第四冒感甚シキ人及ヒ感動過敏ナル人ハ之レヲ用テ尽吐逆スルコトアリト雖モ丹汞ハ原未金属ヲ去ルコト遠キ製剤ナルカ故ニ吐逆ヲ起スコトヲ至テ旅ナリ

独尊地ノ此方ハ新方ニアラサレモ其用法ハ実ニ新ユヘルノ者ナリト雖モ梅毒痛ノ諸症ニ概シテ之ヲ賞シ且ツ偏倚メ大ニ之ヲ信用スルハ此人ノ憶断ナリ

他人及ヒ予自親ノヨク適中スル者ハ第二経久ノ梅毒症蜜泉瘤口瘡鼠瘍ナリ第三乾キ梅毒及ヒ疹及睾丸腫ナリ

○之ニ反メ諸原始病ニシテ梅毒尚旬処ニアル

者及ヒ第二度ノ経久梅毒諸病（導発病ヲ云フナラン）既ニ骨
質ヲ襲ヘ結腫結節腫骨瘤骨膿腐骨ヲ為ス者ヲ
ハ或ハ効ヲナサ（ママ）或ハ全ク之ナク或ハ又大害ヲ
ナス故ニ之ヲ施スヲ禁ス
梅毒性皮庐病（ママ）ハ別ニ尽（ママ）人名ノ赤降療法（ママ）ノ功ア
ルヿ独尊地丸ニ優レリ是レ別ニ尽（ママ）地（リン）名ノ刺奢里（ファヤ）
的病院ニテ名医尽（ママ）律歇（ママ）人名ノ施治セル独尊地丸
ノ無数ナル試験ヲ以テ定ムルノミナラス且ツ
予及ヒ余カ知己ノ実験ヲ推テ極ムルトコロナ
リ

余之ヲ證スヘキ五症アリ多年梅毒ヲ患ヒ皮病
及ヒ骨病ヲ兼子猶尊地丸ノ療法ヲ行ノニ唯其
症ヲ鎮静スルノミニメ効ナク終ニ鍼灸療法ニ
摩永療法ヲ兼用シ或ハ兼用セスシテ治スルヲ
見タリ○律士微布私律私多地名ノ医沙尽（ママ）施人名ノ
説ヲ所ヲ聞クニ予カ実験ト同一般ノ症ヲ親験
セリト云フ
覺性旺盛ナル人ハ幷永ヲ内用スルニ独尊地丸
ノ如キモ亦大ニ誼慎メヘシ腹内多血ナル人ニ
亦然リ是腸間膜ニ嫩衝ヲ起シ顔頭ニ帯赤青班

ヲ怒シ刺衝熱ヲ起シ易ケレハナ
所謂久萬満煎ハ原未経久ノ梅毒病ヲ治スル泉
トシ軈近ハ緩慢ナル皮疹殊ニ輪癬結腫結節腫
ヲ条タル緩慢性依庶萬ニ賞用スヲ以テ実験ス
ルニ果シテ屢大効アリ
入此先萬満煎ヲ分ツヲ強緩トス強煎ノ方
薩尔撒巴栗列根 十二匁
泉水 二十四丸
右煮ル丁四分時
一匁半

甘汞 半匁
泰那佛尔安奥謨扭 製剤各一匁
此三品ヲ右ノ煎汁ニ加ヘ布尼ニ包ミ楪交メ
溶化シテヲリ
旋那葉 三匁
甘草 一匁半
亜泥私臭
茴香子各半匁
右混合シ涉過シテ十六丸ヲ取リ淨ヲ去リ八
硝子壷ニ收メ貯フヘシヲ強煎ト云

緩煎ノ方ハ前方ヨリモ又多味ナリ

大萬病強煎汁

薩尔撒巴原列根 各六匁

泉水 二十四九

右煮テ尽ク溶化シ了リ

橙皮

桂支

益智 各細末三匁

甘草 末六匁

右四味ヲ加ヘ濾テ十六七ヲ取リ滓ヲ舎リ八

箇ノ硝子壜ニ収ムルヲ稍薄煎トス

此煎汁ノ用法ハ患者初日ノ朝夕ニ永製清下丸十六粒ヲ用ヒ次ニ四日間強煎汁一壜ヲ温服シ午後緩煎汁一壜ヲ冷服ス第六日ニ至テ浮下丸ヲ服スルヿ初日ノ法ノ如クシ次ノ四日間強緩二煎汁ヲ服スルヿ又前法ノ如クシ〇日々二匁ノ弱羊肉及ヒ小麦蒸餅ヲ用ヒ但シ下剤ヲ用ル日ニハ犢羹汁ニ雀麦大麦等ヲ用ヒ〇此療治中ハ蓐中ニ温保シテ並ニ怒気ヲ催進スヘシ且ツコレヲ用ヘヲルタル后ニ尚暫時室中ニ温保シ

素食ヲ守用シ私百六里尽納律謨見テ前 或ハ薩尓
撒終栗列根蔴ヲ飲服シ
患者一剤ヲ行フテ尚全治セサレハ再タ前方
ヲ行フ若シ其人強壮ナレハ療治ノ労二日ニ尚
一次下剤ヲ重子用フ
瘡瘍ハ此療治中只微温湯ヲ以テ之ヲ洗浄シ乾
撒系ニ緩和軟膏ヲ塗テ之ヲ覆フ
患者衰弱スルトキハ日々此煎汁各半壘ヲ用フ〇
之ヲ服シテ悪心吃吐スル者ハ之ヲ小分シ与フ
レハ此症則チ治ス

予此方ヲ用ヒテ速カニ吐涎ヲ起ス止ムコヲ得
ス暫ラク此剤ヲ歇メ阿芙蓉金硫黄キナヲ内服
セシムル症ヲ見ルコ多シ〇予ハ通常此剤中ノ
甘汞素那佛尓妥負謨粒ヲ除キ二十四日中ニ服
用セシム効験猶右ノ如シ

梅毒病諸形状ノ性質治法並ニ
其属症ヲ論ス

第一梅毒漏精病 即淋疾ハヨリ根治スルトキハ次テ
全身梅毒病ヲ尽スルヲ甚タ緊要ナリ是精液ノ泌
別増加スルヲ以テ病毒ヲ分甫排泄スレハナリ

○梅毒痲ト梅毒ニ因ラサル痲トヲ弁別スルニ
確乎タル徴候ナシ
予ハ今日ニ至ルマテ粘液痲ニ蝙虫ノ有無ヲ探
索セサルヲ恨ミトス然レトモ今ニシテ其症ニ逢ヘ
ハ忽チ之ヲ探究スルコヲ得ヘシ
唯全身梅毒病ヨリ導発スル痲病ハ他ノ症ト弁
別シ易シ此症ハ全身ノ患ヲ療スルヲ主トス吾
輩原始痲ヲ療スルニハ多クハ汞剤ヲ用ヒス
〔第二〕原始梅毒瘡ハ前ニ記載スル原始疳療ノ謂
ニメ局処梅毒病ノ徴候ヲ現ハス自然ノ機カヲ
ミヲ以テ制扼スルヲ至テ緊ニメ常ニ皆全身梅
毒病トナルモノナリ、
此症ハ治法及ヒ総身梅毒病トナルコヲ防禦ス
ルコハ余已ニ前ニ論シテ曰幾多ノ医輩各疳瘡
ヲ治スルニ水銀ヲ用ヘスメ素食及ヒ防燃療法
ヲ以テス今日尚之ニ依テ治スト又他医ハ水銀
ヲ内服セス只赤降汞ヲ以テ瘡上ヲ腐蝕シ導発
梅毒病ノ兆候ヲ現サヽル間ハ只素食ヲ命スル
ノミ
又之ニ反スル説ヲ唱フル人アリ乃チ葦設ハ

原始梅毒病ヲ治スル篇中ニ曰ク痕瘡ハ曾テ水
銀ナシニ根治スル者ナシ之ヲ内外ニ用フレハ
能ク根治シ若シ梅毒一回体中ニ侵入スレハ則
チ必水銀ヲ用ルヲ要ス水銀ヲ用ヒスメ疽瘡ヲ
治シタリト云フ説ヲ主張スル人ハ諸実験ニ従
フテ考ルニ皆是臆断ニ出ル者ナリ謨私多許メ
曰ク諸實験トスルハ視ル所正シカラサルニ似
タリ噫又偏執シテ疽瘡ニ水銀ヲ外傳スルモ亦
十全ノ治療トセス又酷烈ナル腐蝕劑ニ由テ疽
瘡ノ周邊ノ硬結ヲ溶解シ其瘡ニ痂ヲ結ハシム

ルヿハ右劑ノ効ナリト雖モ固ヨリ然レトモ患者之カ為
ニ決シテ治セス早旭ニ危殆ナル症ヲ惹スルハ
實ニ歴驗シテ知ル所ナリ〇之ニ反メ適宜ニ水
銀劑ヲ内服スレハ痂瘡ノ周邊大ニ硬脹セス痂
瘡ノ悪性ナラサル症ヲ治シヘシ而メ外敷スル
ニ及ハサルヿ亦是実驗ヲ以テ證スル処ナリト雖
華設ノ説
此ノ如ク相反セル説ニ主張スル者ハ各其実驗
ニ原ク者ナリト雖モ固ヨリ其実驗スル処実ニ自ラ偏
執スレハナリ

予カ上ニ擧ルカ若ク梅毒ニ二般ノ種類ヲ建ル
ハ則チ此相反スルカ如ク見ユル說判然トメ解
ヲスルヲ得ン
予カ原始疳瘡ヲ療スル法ハ症状ノ異ナルニ從
テ次ノ差別アリ
〔子〕原始良性疳瘡ハ必ス水銀ヲ内服セシメス只
両三日毎ニ旋那葉浸劑ニ尾老刖里塩ヲ加ヘタル
下劑ヲ処ス素食ヲ命ス飲料ニハ冷水ヲ多服シ
室中ヲ同等ニ温煖ニスルヲ全治法トス初八日
中ハ冷水或ハ鉱水ニ浸シタル撒系ヲ瘡上ニ被
セ其後ハ乾燥系ヲ以テス或ハ楪皮煮ニ浸シ或
ハ金ノ温フサスメ貼ス
此ノ如ク施治シテ八日内ニ疳瘡治セス却テ益
悪シク或ハ廣大ニナリ亢ヒ痂ナリト雖ニ便毒
之ニ次キ未タ其ハ瘡中ノ膿汁ヲ捺視シ若シ多
ク蠕虫ヲ生スレハ隔晩ニ甘汞一氏阿芙蓉四分
氏ノ和劑メ内服シ六劑ヲ用ヒ蒸テ上
ニ云フ処ノ食養ト云ヒ冷泉ノ多服一昼夜ニ八
七ヨリ十二七ニ至ルト雖ニ注意シ茶骨非麦酒ハ
適宜ニ飲ミ蒲萄酒及ヒ焼酒ハ厳禁シ日ニ三度

少量ノ水炭汁ニ吉麦飯ヲ加ヘ与フ○瘡瘍ハ楡皮或ハ榔皮ノ冷煎汁ヲ以テ被フ

疳瘡膿中ニハ蠕虫或ハ些シク生ス或ハ全ク之ナキ者多シ此瘡ハ上ニ所謂下剤素食冷水ノ内外用ニ依テ治シ歩シモ水銀ヲ用ルコトナクシテ

全身病ヲ經発スルコト(ヒュントル)扶尹的尓(古賢医)已ニ茲ニ見ル処アリテ疳瘡ハ尽ク真梅毒病ニアラストセヒ扁耳人(名)亦疳瘡一百五症中真梅毒病ハ只二十人ニメ八十五人ハ假症ナリトセヒ加尓密奢児(ミヤル)人(名)モ又英國ニ於テ水銀ヲ用ヒテ害アル假梅毒病ヲ真梅毒病ニ比スルニ五ト一トノ如シトセヘリ○瘍科牧敏屋敦(ロンドン)ト云ヘル英国ノ都府ノ病院ニテ陰処腺瘍ノ五異症ヲ実験シ猶細ニ記録シ諸般ノ療法ヲ行ヘリ

丑 原始疳瘡正時ニ十分ノ療治ヲ施サス又ハ加フルニ体質衰弱シ酷厉液ヲ生ス或ハ強猛ナル毒ニ傳染スルトキハ悪性ノ原始疳瘡ヲ起ス此症ハ方今正治適療ノ方法アルニ由テ至テ希ナリ

乾 侵蝕シ出血シ易キ瘡瘍ニメ首タル疳瘡ノ徴

候ナレニ不健ナル人衰弱スル人矢張児倍苦ラ
患ル人若クハ腺病ヲ患ル人或ハ已ニ永ク淌食
機衰弱シ肝病ニ罹ル等ノ人ニ於ス
予此症ニハ痂塩酸二三戈ヲ取リ一壜水中ニ和
シ日ニ三次内服シ兼テ多養ノ食物ヲ与ヘ且ツ
ツ許ノ蒲萄酒ニ幾分ヲ加ヘ用フ○疳瘡上
ニハ次ノ軟膏ヲ貼ス
亜鉛花一戈
阿片蓉越幾私六仏
剥木蔓膏 半匁

右精密ニ混合ス
然レニ此瘡中贅肉ヲ生ス或ハ出血スルヰハ明
蓉丹蓉ノ溶液或ハ痂硫酸ノ湯方ヲ行フ
孕常此ノ如キ疳瘡ノ膿中ニハ虫ヲ見ルコトナシ
其後此瘡自壮ノ円形ヲ為シ豚肉状トナルヰハ
此虫初メテ生ス茲ニ於テ〔坤〕号ノ療法ヲ行フ
此疳瘡ノ要旨ナルハ之ヨリ全身療トナルノ恐
アルトハ傳染毒ノ劇烈ナルニ係ルニアラスメ
患者ノ体質衰弱スルト酷厉液アルトニノミ関ル
者多シ尓又大ニ多姪ナルニ亦此原因トナル說

動脈ノ病院中ニ影多ナル梅毒侵蝕癌乃チ是ナリ此症ハ阿片蓉ヲ内服シ的列並帝那油ヲ外用ス

此癌ハ病人ハ多クハ竜動府ノ平常ノ娼家ヨリ出来ル真症タル始メ陰処ニ侵蝕癌ヲ生ス速力ニ潤大トナリ疼痛焼ルカ如ク又刺スカ如ク帯黄茶褐色ノ膿汁ヲ流シ癌辺顕赤ニメ速カニ黒色ニ変シ終ニ壊疽トナリ真脈小数皮庐乾燥ス神五病性ノ哥尓蒦アリ衰弱脱力ス速カニ適当ノ剤ヲ用ヒテ救治セサレ死ス

〔坤〕患者体質強健ナリト雖ニ烈シキ伝染毒ニ侵サレ癌癌ノ周辺微赤ニメ正中ニ白膿點アリ其形ケ或ハ正圓或ハ楕圓ナリ此癌媾交后速カニ生シ急ニ深ク蝕シ且ツ廣潤ニナリ膿中影多ノ出ラ生シ若享ニメ白色恰モ腦ノ如ク一腫不住ナル甘臭アリ其臭状筆記スヘカラスト雖ニ一度之ヲ嗅タル人ハ常ニ之ヲ忘レスメ又思ヘ出スヘシ劇烈ナラサル毒ノ癌癌ニハ此臭気アルコトナシ

患者癌瘍ヲ自然ノ機カニ信セテ顧ミス食養ヲ

厳禁スルヿニ注意セサレハ已ニ十四日内ニ便毒及ヒ咽中痛瘡ヲ生シ梅毒已ニ全身ニ漫曼シルノ徴ヲ現ハス〇通常陰茎ヲ同時ニ生スルヿアリ癒法　素食ヲ用ヒ外部ニハ

阿芙蓉越哉私　十氏
皓礬　一匁
軟膏　半ヲ

右能ク混和シ貼スヘシ

内服ニハ

甘汞　二氏至四氏
清浄阿芙蓉　半氏
アラビヤゴム
白砂糖　各半匁

右混和シ分ッテ四包トシ三四日ニ晩ニ其一包ヲ用

通常此散剤只二三ヲ用ヒテ全病治癒シ八日或ハ十日ヲ過ルノ後瘡瘍癒着シ患者全ク実病ヲ免ルヽニ至ル〇医鼻乙列モ又此ノ如キ方ニテ原始痛瘡ヲ治セリ然レトモ一剤ニ甘汞六氏ヨリ十

ル二至ルマテヲ手ヲ是其量甚タ多キニ過タリ
癒治ヲ行フノ初日第二日第四五日ニノミ右ノ
軟膏ヲ以テ瘡上ニ貼スヽ第三日第六日ニハ微温
湯ヲ以テ瘡中ヲ洗浄シ乾燥ヲ被ヒ一二時ヲ
後ニ膿汁ヲ探視シ已ニ虫ヲ見サレハ則チ予ハ
微温湯ヲ以テ其瘡ヲ被ヒ次ノ日ニ至テ虫ノ生ス
ルヤハ尚一度此散一刻ヲ手フヘキ徴トナレ〇
通常此後肢ノ右ニ一二次下利ヲ発ス然レハ則
チ吐涎及ヒ水銀毒ノ残留ヲ恐ルヲ要ス
此瘡知覚至テ敏捷ニメ速カニ周囲ニ侵蝕ス治

スルヿ能ハサル者ハ食養度ヲ失ヒ精気多キ飲
料ヲ誤用スルニ至スルナリ此症ハ次ニ挙ル軟
膏ヲ毛筆ヲ以テ日ニ一二次疳瘡ニ揉擦ス其方

升汞 六仏
失鳩各越幾斯
加盛列越幾私 各二匁
阿片蓉 半仏
玫瑰露 一匁

右混合ス

(貳)梅毒包茎及ヒ包皮腫物病ナリ〇此病ハ嫩衝

性ノ原始病ニメ假令梅毒其原因タリト雖モ炎
衝病ノ治法ニ從フテ処置スヘシ故ニ最初冷巻
法ヲ行ヒ下劑ヲ内服シ冷水ヲ多飲シ素食ヲ用
フ

包莖痛劇シクメ出血シ陰莖炎赤腫脹シ防炎衝
法ヲ行ヒトモ治セサルトキハ包被ヲ裂キ或ハ包
皮腫消ノ包皮ヲ切截スル護鳥刺尔度水老鳥扭謨
ヲ以テ其上ヲ被ヒ毎晩甘汞一瓦ニ阿芙蓉半瓦
ヲ加ヘ用ヒ仁ノ六劑ヨリ八劑ヲ与フ〇同時ニ
終シタル原始痛瘡及ヒ痲疾モ亦右法ヲ以テ治

ス

包莖及ヒ包皮腫消病炎衝劇盛ナラス或ハ已ニ
退余スルトキハ濕鳥滿久ハ布片ニ永軟膏ヲ塗リ
其辺ニ貼シテ大効アリ又載消法ヲ必要トセス
ト包莖扁ヲ見ヨ

卵 便毒ハ梅毒ノ刺衝ニ由テ鼠蹊腺炎衝腫ヲ起
スナリ是講交ニ由テ梅毒身体中ニ裏入シテ此
症ヲ発スレハ梅毒病ノ徴候トナスヘキヲハ此
他ノ鼠蹊腺腫ヲ依尽多腺病百私多哥尔黄ノ徴
トスルニ同シ

梅毒亂蹊腫ノ位スル地ハ腺ノ組織中ナリ此地ヲ此傳染毒ノ會処トス然レニ腫瘍ノ所在ハ此地ノミナラス深淺処置ノ腺ヲ圍抱スル蜂窠織中ニモ在リ

〔證狀及ヒ経過〕

梅毒亂蹊腫ハ炊衝ノ諸時限ヲ経歴スルヿ他ノ諸亂蹊腫ニ同シ〇初起亂蹊辺ニ牽張ヲ覚ヘ骨ノ運轉及ヒ行歩コトニ牽張倍加ハリ唯艱苦シヲ腰ヲ屈スレハ些カニ行歩スルヲ得苦ク亂蹊ヲ探索スレハ已ニ腺腫ヲ觸知スヘシ其後劇痛ヲ発シ硬脹シ晩ニ入テ疼痛増加ス歩行スルヿ能ワス大ニ腫脹スルニ于觸ヲ熱セス其後皮上赤色ヲ発ス常ニ哥尔費ヲ恭子晩ニ向テ殊ニ甚タシ其後速カニ疼痛刺スカ如ク鼓スルカ如ク硬腫漸ヤク軟解ス推セハ波動ヲ覚ヘ正中突起ス皮肉薄クナリ膿熱メ或ハ自ラ破開シ或ハ術ヲ行テ刺開シテ便毒ヨリ導発梅毒瘍ヲ起シ永ル

〔辨別〕

感通便毒ナル者アリ此症間殖毒後疳子泥及ヒ

芫青膏ヲ用ルノ後毒虫刺傷后ニ発スル殊ニ皮表ノ感觸敏捷ナル者ニ多シ但シ梅毒性ノ便毒ハ已往ノ諸証ニ由リ且ツ其腫瘍状ニメ著ク突起スルヲ以テ之ヲ区別スヘシ然モ此終リニ載スル形容ハ梅毒ニ起因セサル便毒ニモ間又之アリ腺病性ノ便毒ハ曽テ梅毒性ノ便毒ノ如ク速カニ経過スル者ナシ又梅毒ノ如ク疼痛セス硬固ナラス尋尓潰ヲ兼子ス患者腺病性ノ状態アリ唯患者梅毒病ニ由テ腺病ニ罹ル症ハ便毒ヲ識別スルヲ甚タ難シ

倭麻疹便毒ニ亦其人曽テ梅毒ニ染ヒタル者ハ辨別シ難シ

重キ冒寒病ニ次テ聖京倭状咳嗽咽喉嘔衝耳腺炎衝ヲ冬スル者亦屡嵐蹊辺腫脹ス此他嵐蹊辺ノ打僕癆関節腫等ヨリ発スル症ニ此病ハ其各症自性ノ先ケタル徴候ニヨリ原始梅毒治シテ後日久シキニヨリ曽テ梅毒ニ感傳シタルコナキ等ニ依テ已別スヘシ

木熱ナル区ハ猶リ嵐蹊鼠径及ニ股鼠倭尻ヲ梅毒性ノ便毒ト混雑スル者アリ是此鼠傷尻已

ニ歳月ヲ経ルトハ患者明カニ之ヲ告ルカ故ニ
謬ルコトナシ方今生シ未ル者ハ必ス急ニ発見ス
多クハ劇シキ体動ノ後ニ生ス就中踝骨傷ハ其
位置便毒ヨリ高ク股骨傷ハ便毒ヨリ低クシ
又貌倭屡ハ之ニ觸テ便毒ノ如ク硬カラス又痛
マス若シ鉗結スルトキハ疼痛アレ𪜈別ニ其自性
ノ症候アリテ之ヲ兵知スヘシ
大腰筋膿瘍亦幾許自性ノ症候アリ即チ患者平
臥スレハ膿腫縮小シ直立スレハ脹大ナリ剌鳥
巴尓多発明者ノ名 靭帯下ニ位シ毫尓蚩アリ腫瘍ニ

先チ来リ且ツ身ヲ前ニ屈ルヲ自性トスル等ノ
症アリテ皆梅毒性ノ便毒ト混シ易カラサル徴
ナリ

〔梅毒性便毒中ノ𪜈別〕

常ニ便毒ニ先ツテ梅毒ニ傳染スルコトアリト雖
𪜈其傳染スルヿ一様ナラサルカ故ニ之ヲ分ツ
テ原始尊発感傳ノ三便毒トナス

〔其一〕原始便毒ハ発理説ニ従ヘハ交媾ノ時直チ
ニ梅毒ノ此腺ニ吸収シテ茲ニ傳染シ以テ之ヲ
発スル者ナリトスヘシ而ルニ近衆ハ多ク此便

毒ノ起因ヲ知ルヲ欲セス是他ナシ唯謬ニ
安ンスルヲ以テナリ其謬スル所以ハ或時ハ
患者ニ對シテ明カニ告ケス或ハ未タ曾テ婦
人ニ交ラストシ或ハ已ニ原始疳瘡ヲ患ヒタ
ルヲ忘シ其痕已ニ消滅シテ認ムヘカラス或ハ
又唯タ痲若クハ尿道中ニ隠伏セル小疳瘡アリ
テ之ヨリ梅毒ヲ廣布スル症ナルコヲ詳カニス
ルヲ得サレハナリ

〔其二〕導発便毒ハ原始疳瘡及ヒ痲病ニ兼テ尿
道ニ疳瘡アル症ニ次テ発ス是此傳染毒ハ水脉ニ
従テ腺ニ傳ヘ此腺ヲ刺衝シテ燃衝スルニ至ル
ナリ

理會シ易キ解剖学理ニ依テ考フレハ男子ノ便
毒ハ上部ノ嵐蹊腺ニ位シ婦人ハ下部ノ嵐蹊腺
ニ発スルヲ知ル

屈律傑(クリウテ)名人ノ説ニハ前未腺病ヲ患ヘタル白色ノ
ル人及ヒ水様劑ヲ内服シ湿巻劑ヲ外用シテ原
始疳瘡ヲ治シタルノ人ハ此便毒ヲ患ル一種性ア
リ乾温両劑ヲ交ヘ用ヒタル人ハ之ヲ患ルヿ少
ナシトニフ

〔其三〕感傳便毒ハ腺ノ感直スル刺衝ヨリ発スル病ニメ次シテ傳染毒ヲ茲ニ吸收シテ起ルニ非サルナリ

痲病ヲ癒スルニ初時ニ於テ刺衝ニ過ルカ或ハ患者強烈ナル飲料ヲ服シ舞蹈騎馬等ニヨッテ自ラ喜シ私格尓多(レコルト)(ジント)ヲ帶ヒ尿道ノ燃衝ニ防燃癒法ヲ行ハサル等ニ次テ之ヲ発スルヲ屢之アリ

此便毒ハ毒タ分解シ易シ入術ノ輔助ナシト雖ニ燃衝ノ劇勢減退スレハ忽チ自ラ消散シ

此便毒ト導発便毒トハ一診シテ識別シ易カラス若シ同時ニ原始痼瘡ヲ患ルヰハ殊ニ然リレニ予輩ハ梅毒傳染後急ニ発スル便毒ハ皆感傳症ニメ導発便毒ハ多クハ梅瘡治シテ後チ三四周若クハ八週十週ヲ過テ初メテ発スル者ナリトス

悪性痼瘡ハ強劇ナル傳染毒ニ次キ来ルニ之ヲ発スルヲ要ニメ痲ナリ此症ハ導発便毒ヲ発スルヲ甚タ速疾ナリ〔前〕ニ挙ル〔丑〕條ノ〔坤〕号ヲ現ヲ〔又〕感傳症ヨリ終ニ導発便毒トナル新タニ傳染

スルハ殊ニ此症ヲ発シ
或ハ感傳便毒ヲ交通機性便毒トヲ分ツ交通機性便毒トハ尿道ノ燃衝延テ
此腺ニ及ヒ痲病尚治セサル者ヲ云ヒ又感機性
便毒トハ此燃衝ノ劇シキト他ノ刺戟物トニ依
テ痲病ヲ招歷シ即今病毒轉移ノ法ニ従フテ此
腺ヲ侵襲シ便毒ヲ生スル者ヲ云
梅毒性便毒ノ前徴ト結尾ヲ論スルニ感傳便毒
ハ前徴良善ナリ且ツ殊ニ梅毒ニ傳染セサルハ
常ニ分解シ易キカ故ニ軽良ナリトス ○導咎

便毒及ヒ原受便毒ハ前徴甚タ亘シカラス是レ
此症分解スルヤ直ニ梅毒除去スルカ否ヲ功庶
ニ知ルヘカラサルカナリ其知ルヘカラサル者
ハ何ソヤ高名ナル諸子ノ説ヲ見レハ梅毒病ハ
十歳ヲ経ル後ニモ亦新タニ発起スト云ヲ以テ
ナリ
便毒ハ腫潰スル者最モ多シ此腫瘍ノ順症ナリ
者ハ四週ヨリ六週ノ際ニ治ス他ノ悪症ニ在テ
ハ数月治セスシテカ為ニ許多ノ病ヲ生ス壊瘍悪
状ヲナシ易ク多ク疼痛ヲ甚ニ腫脹悪シク発気

ラ生ス近傍ヲ侵蝕シ漏管ヲナン瘡辺脱疽ト
ナル等ノ症アリ○此症ハ衰弱シテ酷厲液ヲ困
ム人ニアルコトメ茲ニ根柢セル热ヲ兼ネシ良
薬モ之ヲ治スルコト能ハス数年困苦スルコアリ
○燃衝変シテ硬結腫トナルコト数之アリ殊ニ匹
泉妾癌シ寒温剤ヲ用ヒ或ハ壓抑シテ強ヒテ分
解セシメントスルトキハ此多シ
此腫瘍或ハ硬キコト石ノ如クニメ何薬モ之ヲ軟
解スルヲ得ス生涯患苦スルコアリ
又脱疽ニ変スルコトアリ衰弱セル悪液質ノ人尠

多ノ病人充満スル病院ニ居ル者殊ニ之ヲ患フ
又病院脱疽流行スルトキハ殊ニ便毒ノ部ノミナ
ラス尚且ツ肢被ヲ侵襲シテ終ニ死スルニ至ル
コアリ○空気ノ負狢リ脱疽ニ移ルノ因トナル
コ間々之アリ夏熱酷烈ナルトキ殊ニ多シ
○忽倫(ホトン)名ハ千八百零六年ニ便毒ノ脱疽トナル
モノヲ屢々見タリ

〔療法〕

感便傳毒ニメ此腺ニ梅毒ヲ吸收シタル恐レナキ
症ニハ予輩常ニ分解センコトヲ務ム○病初メニ

ニ在テハ冷水ニ浸シタル厚キ氈定巾ヲ其瞳上
ニ被ヒ半時ヨトニ新タニ換代シ以テ之ヲ抑制
シ兼テ大ニ身ヲ安静ニシ素食シ私格尔多番
ヒヨヲ施スヘシ
燃衝已恵ニメ大ニ瞳脹シ疼痛劇シキ時ハ最初
冷巻法ヲ試ムヘシ然レニモ之ヲ行フテ十二時中
ニ効ヲ奏セサレハ則チ緩和合剤ニ非沃斯失亜
密葉及ヒ少許ノ酒石塩緩和剤ヲ一ヲヲ加
ヘタル微温蒸剤ヲ用フ○燃衝ノ極度ニハ蛭針
ヲ施シ消石酒利塩ヲ内服シ刺絡スヘシ其後チ

便毒ノ周圍及ヒ肢ノ上部ニ膏法ヲ行ヒ兼テ
其症状ニ従フテ梅毒ノ内治法ヲ行フ
此等痲病尚治セサルキハ温蒸剤ヲ陰生辺ニ用
フヘカラス之ヲ用フルハ益便毒ヲ催怒スレハ
ナリ
若シ其便毒房ノ怒動ナルカ又ハ感傳便毒ナ
ルカヲ詳カニ知ラサルキハ譬一ハ同時ニ痊癒
尚治セスメ存スルキハ隔晩ニ甘汞一氏ニ阿芙蓉
四分氏ヲ加ヘテ内服シ便毒ヲ癒スルニ導怒病
ヲ治スル法ニ従フヘシ

此ノ如キ便毒ニハ蜘衝ノ状治ニ羅斯ニ委スル
ヿアリ此症ハ殊ニ寒温剤ヲ避クヘシ否サレハ
慢性硬結腫トナリ易キカ故ニ香麝膏薬ヲ充タ
ル麻多剌失私ヲ外部ニ用ヒ内部ニハ少量ノ吐
酒石ニ硇砂及ヒ接骨木花水ヲ加ヘ用ヒテ適当
トナス

右ニ云フカ如ク誤治ニ係ラスメ梅毒性便毒発
硬結腫トナリ蜘衝疼痛共ニ太テ腫瘍益硬固ナ
ルヿアリ此症ハ竟脳軟膏ニ水銀軟膏ヲ和シ擦
剤トナシ次膏ヲ軟革ニ捺シ便毒及ヒ其近傍ノ

被フヘシ其方

失鳩蓉膏
水銀膏
金盞花膏
昆剌私膏 各等分ヲ以テ一ノ方
右混和ス

導尽便毒ノ治法ヲ論スルニ諸般ノ説アリ茲ニ
毋涅尓繆尓剌乙別尓、抗子的児、私萬尓屈忽倫及
ヒ他ノ諸人ハ諸便毒症ニ導尽便毒ヲ合解セン
ト欲スルヿ膿潰スルヿ甚タ難ケメ危ケ且ツ全

身梅毒病ノ発動ヲ防禦スル剤ナケレハナリ又
便毒分解消散シタル後ナ魁ク全身ノ梅毒病ヲ
発スルコナレトスヘカラス然ル膿潰スルト雖
ニ導発梅毒症ヲ全ク防制スルヲ能ハサル例亦
多シ此故ニ分解ヲ最良ノ結尾ナリトメ治癒ノ
初メ先ツ常ニ分解法ヲ試ムヘシ但此法常ニ皆
良効ヲ奏セス解凝剤ノ効ニ反シテ膿潰スルヲ
アルハ実ニ嗟嘆スルニ堪ヘタリ
此故ニ便毒ノ初起ニハ身ヲ安シ仰臥シ防燃
療法ヲ行ヒ清涼下剤ヲ用ヘ外部ニハ便毒ノ全
圍ニ氷寒水巻法ヲ施スヲ良法トス ○若シ其終
増劇スケレハ蛭針法ヲ行ヘ其後灰白汞膏ヲ擦
入ス ○此療法ヲ行フニ時ヲ失ハサレハ八日中
ニ治スルヲ屢之アリ膿潰スレハ八週中ニ治ス
ルヲ雖シ
燃衝膣痛ノ劇盛ナル症ニハ刺絡素食下剤モ又
必要トス
此症数日間治癒ヲ意ヒ陰ヲ棄擲シ或ハ右法ヲ行ヘ
ニ分解セス膿中ニ波動ヲ覚ルニハ膿潰セス
メ治スルヲ能ハス綿細並剤ニ口ヨス東方鳩多

嬰粟球ヲ加ヘ用フヘシ

便毒硬固ニメ殆ンド疼ナキ者アリ最初ニ此症ヲ起スヿハ甚メ希ナレ𪜈此症ニハ結倫士尓人名ノ蒸剤当適スト其方

黒石鹸三匁

沸湯二九

此蒸剤大ニ衝動ノ痛ヲ怒ンレハ白水子ヲ減スト雖モ然レ𪜈醸膿ノ為ニ必要ナル衝効ヲ引起ン炊衝ヲ怒レテ緩和蒸剤ヲ用フヘキニ至ルマテ之ヲ連進スヘシ

必要ノ時期アレハ衝動性ノ蒸剤ヲ用ルニ茶テ緩和蒸剤ヲ與ヒ膿瘍自ラ破壊スルニ至ル此法ヲ行フニ十四日若クハ尚其餘ヲ過ルヲ屢之アリ

又已ニ永ク波動ヲ覚ヘテ其瘍非常ニ廣濶ニナリ而レテ自ラ破潰セサル者仍之アリ此症疼甚

シキ片ハ薬鋏ヲ以テ刺開シ疼ミサルヤハ小孔
ヲ穿タル硬膏ヲ貼シ其孔中ニ腐薬ヲ傳ヘテ確
定セシム衝動性ノ薬ト単緩和薬トハ其瘍
ノ多ク燃痛スルト怠鈍ニメ知覚ヲ失スルトニ
従フテ撰用シ破潰ノ後モ尚多クハ膿ノ大分硬
結スルカ故ニ常ニ長ク連用スヘシ
梅毒性便毒ヲ発スル症ニ在テ便毒ハ原始疳瘡
ト道発病トノ際ノ病ナリト雖モ便毒ハ現存セ
スメ晩ク導発ノ患ニテ候鼻中ニ発スルアリ
然レモ諸導発便毒ヲ尽ク病毒分歯ノ症トシテ

醸膿セシムヘシレトモ又律私多人名ノ思フカ如ク
膿潰セサル前ニハ永剤ヲ内服スヘカラストス
ルハ僻論ナルヘシ
実ニ永剤ノ内服ハ便毒ノ劇シキ燃衝症ニ的中
セス此症ニハ猶リ防燃剤ヲ用ルヲ佳ノ燃衝性
梅毒諸病ニ於ルカ如シ然レモ燃衝軽微ナルヤ
ハ直チニ甘汞ヲ内服シ二三日ヲ過テ葷涅満溶
汞ヲ用ヒ其後晩ク尚佗ノ導発梅毒症ヲ発セス
猶尊地ノ升汞丸ヲ于フルヲ最良トス
便毒性慢ニメ硬結スル症ハ衝動性ノ蒸剤ヲ用

ルノ外更ニ甘汞ニ竜脳阿芙蓉莨菪実芝答里斯
ヲ加ヘ内服スヘシ
已ニ膿潰シタル便毒或ハ漏トナリ或ハ脱疽
トナリ或ハ脱疽トナルヘキハ外科術ノ法ニ依テ
治スヘシ○脱疽トナリタル症ハ内外共ニ水銀
ヲ処スヘカラサルコト自ラ瞭然タリ
屋扁歇乙謨人ハ水銀ヲ用ヘスメ梅毒病ヲ療ス
ル人ニメ諸便毒ヲ分解スル療法ハ尊尚スヘキ
効能アリトテ其療法常ニ便毒ノ周辺ニ冷奄
方ヲ行ヒ尤ハ適宜ノ裁設児石ヲ腫上ニ置テ之

ヲ壓ス其瘍劇痛アリ或ハ已ニ波動ヲ覚ル症ニ
モ尚之ヲ行ヒ兼テ下劑ヲ與ヘ素食ヲ命スレハ
其腫尚分解スルヿ屢之アルヲ見タリ然レ𪜈終
ニ醸膿ヲ防制スルヿ能ハサレハ緩和ナル布ヲ貼
レカヲ以テ膿瘍ヲ刺開シ次テ或ハ乾撒系ヲ貼
シ或ハ羅士寃萬児若クハ石灰水若クハ酷巻若
クハ硫酸ノ溶液ヲ以テ瘡口ヲ封シ其後速ニ
ニ治スルカ為ニ地獄石ヲ以テ瘡縁ニ塗擦スヘ
シ此ノ如クスレハ諸便毒速カニ治ス
余此ノ人療法ニ従テ許多ノ梅毒性便毒ヲ分

消セリ案スルニ石壓法ハ傳染毒ノ廣達ヲ防キ
其毒ヲ他部ニ吸收スルヲ制スル故ニ甚メ鴻益ア
リト見ル蚋蚤蚊等ノ如キ毒傷ニ患部ヲ緊紮ス
壓定スルヨリハ其毒ノ普達スルヲ制止スルト同
一種ナリ

〔辰〕方二傳ノ梅瘡ナリ

〔其一〕此病初ニハ口中噤下具亀中ノ疳瘡トナリ
テ終ス是レ全身梅毒ヲ受クルノ徴ナリ假令全
身ニ漏曼セサルモ其毒陰処ヨリ傳染シ原始疳
瘡尚現存スルカ或ハ已ニ消除シテヨリ茲ニ傳
布ス故ニ全身梅毒病ノ一徴トナス○此病ノ徴
候ト已別ニ上ニ記載セリ

若シ此症原始疳瘡ニ療ヲ假スシテ治シタル后
六週或ハ十週ヲ経テ終ン唯緩々周辺ニ侵蝕シ
疳瘡本性ノ症候ナク膿中虫ヲ見サルヨリハ予ハ
水銀ヲ内服セシメス唯日々小麦餅四羅士十六匁
十羅士四十匁ニテヲ用ヲ三日毎ニ瓦老別里塩若
クハ若塩(洋利塩ヲ云)共ニ佛栗結人名ノ法ヲリ飲料ニ
ハ日々新皮泉水十二九十六九若クハ二十四九
ヲ冷服セシム○此餅餞療法一名水療法ハ小麦

銃ト水トノ外ニハ曾テ少許ニ患者ニ与フルヲ
ナレヨク此方ヲ守レハ多クハ十四日ヨリ二十
一日マテニ根治ス
然レ𪜈強暴ナル毒ニ傳染スルニ由テ原始痕瘡
尚存スル間ニ急ニ導発痕瘡ヲ生スルコアリ此
症ハ速カニ周囲ニ侵蝕シ多ク虫ヲ生ス瘡縁硬
固ニメ其色多クハ鮮紅膿汁白クシテ濃ク遂ニ
骨ヲ侵蝕メ鼻瘡ヲ生ス懸癰垂ヲ荒壊スル等ノ
症ヲ発スルニ至ル
此症始終水銀ヲ用フヘキヲ強猛ナル傳染毒ヨ

リ生スタル悪性原始痕瘡ノ治法ニ同シ〔上ヲ見
ヨ〕其法甘汞ニ阿芙蓉ヲ加ヘテ内服シ升汞ノ溶
液ヲ嗽剤トシ升汞阿芙蓉越幾私矢鴆答加密列
及ヒ玫瑰蜜ヲ以テ製シタル溶液ヲ毛筆ニテ塗
リ悪性ノ鼻瘡ニハ辰砂ヲ混スタル煙ヲ薫シ
ルヲ主案トス○此諸剤効ナケレハ猶尊地丸ヲ
與フ
口内疳瘡疼劇シク知覚甚タ過敏ナルヿ時々之
アリ此症先ツ阿芙蓉半ル若クハ一ルヲ日ニ三
次用ヒ遏尓他亜根亜麻仁菲汰私其ノ含嗽剤ヲ

慮ス疼痛嫩衝太テ后初メテ内外ニ永剤ヲ与フ
此瘡間又侵蝕瘡状ヲ
梅毒疳瘡ノ本性ヲ
リ此症ハ原始侵蝕疳
哉那ヲ内服シ胆谷一ニ升ヲ泉水一升ニ溶シ含
嗽剤トシ其瘡本性ノ
銀ヲ含マサル剤ヲ
至リ初メテ水銀剤ヲ
〔其二〕梅毒皮庐瘡ナリ
スル者ニメ最初局処ヲ傳染スル后数月若クハ

数年ヲ経テ初メテ発スルヲ発之アリ是全身梅
毒ノ緩慢ニメ頑固ナル症ナリ其之ヲ発スルニ
二様アリ
〔甲〕ハ初メ皮疹ヲ発シ後テ膿潰メ瘡瘍トナル
〔乙〕ハ最初皮上ニ醜悪ナル赤青斑ヲ発シ其中點
ニ一小泡ヲ生ス破レテ瘡瘍トナリ初ニハ焚ク
カ如キ疼ミヲ起シ其後テ痛甚シカラス然レト
モ廣ク侵蝕シテ深ク腐ルノケナク漸々廣大ナ
ルニ従フテ辺縁突起シ脂膜ヲ荒壊シ最ニ多ク
前項肩胛胸骨前膊乎脛上ニ発シ其形状百シカ

ラス瘡底平滑ナリ後ケ終ニ其下ニ伍スル骨ラ
剥露シ骨膿病ニ変シ其形ケ屡恵々大ニナリ粘
濃ニメ脉肉壮ナル膿ラ含ム
通常此瘡ノ降究シテ硬固ナラサル辺縁上ニ痂
ラ結ヒ其痂脱落スレハ其下皮新タニ又瘡トナ
リ漸次ニ廣潤ラナス者ナリ
療法 総テ道守咎瘡ニ同シ
此瘡咎ヒテ久シカラス尋常ノ瘡瘡状ニメ其体
悪液負ナラサレハ朝夕甘汞一ケニ阿芙蓉少量
ラ加ヘ内服シ六日ノ后之ニ代ルニ葦湿満溶汞
ラ以テ兼テ私百失里戻納律謨ラ手ラ〇劇痛ア
ル症ニハ蓝菜微温浴韮汎私茉ノ巻法ラ行ヘ其
後次ノ蓝菜ラ用フ其方
升汞 二ケ
石灰水 一ℓ
單方阿芙蓉丁数剤
右混合ス
此瘡已ニ久シキラ経膿栴クメ臭気アリ海綿状
ノ肉ラ生ス体質弛緩シ悪液質トナリ已ニ水銀
ラ多服シタル者ハ梅毒病ナル手将タ亦病ナル

予殆ンド辨シ難キ之アリ
余思フニ膿中虫ヲ生スルヲ梅毒病ノ確徴トメ
可ナルヘシ然レ𪜈数年未タ梅毒癒治中此ノ
如キ悪性ノ症ヲ見サルカ故ニ虫ヲ目的トメ兼
別スルヲ得ス此故ニ大病院ヲ司トル諸医衆
ヨク茲ニ注意シテ此症ニ逢フルヲ顕微鏡ヲ以
テ善ク探視シ務メテ速カニ其実験説ヲ著述シ
世ニ公ニセンコトヲ庶幾フ
予ハ此ノ如キ侵蝕瘡ニハ日ニ三回次純満酸ニ
三十滴ヲ水一廿ニ和シテ内服シ外部ニハ胆巻

一枝ヲ泉水六勺ニ混和シ綿撒系ヲ浸シ貼シテ
大効ヲ得タリ○其後テ此瘡大ニ治シテ終ニ痂
瘡ノ本形ヲナスニハ甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍シテ内
服シ升汞水ニ矢鳩巻越幾斯阿芙蓉ヲ加ヘテ外
用ス
㊁梅毒性ノ有痛息肉ナリ
密果疣(一名息肉)ハ形容ニ従フテ諸種ノ別アリ
或ハ其帯根細小ナルアリ或ハ廣大ナルアリ多
ハ陰処及ヒ其近傍若クハ肛ニ生シ稀ニハ唇舌
已且杏腺懸癌垂眼瞼肛彩子等ニ発ス

屈律傑（名ハ患タヨク務メテ密果疣ヲ精密ニ弁
別セリ）

疣瘡　ハ乾硬輪状ニメ多クハ同形ノ絨維ヨ
リ成リ其色微灰白ニメ其硬キコト角ノ如キヲ以
テ密果疣ト自ラ別アリ〇痔モ又密果疣ニ似タ
リ然レ𪜈痔ニハ必先ッ其患症アリ且ッ其球柱
青色ヲ帯テ軟カナルカ故ニ混ス易カラス
密果疣ト甘結尓状瘡トハ痔ニ於ルヨリ弁別シ
難シ亀頭及ニ包皮ニ発スルヰハ殊ニ然リ然レ
𪜈甘結尓状ハ臭敗膿ヲ分泌ス劇痛ヲ起シテ患

タ治シ難クシテ先ッテ梅毒ニ傳染スルコトナキ
者アリ

子宮口ニハ仮甘結尓ト混雑スル密果疣ヲ発ス
ルコトアリ疼痛ノ微ナルト血便セサルト一種ノ
悪臭ナキト甘結尓ニハ必之アリ緑色若クハ褐
色ノ膿ヲ流泄セサルト諸此徴候ヲ以テ之ヲ弁
識スヘシ

迷ふ多状肉塊　膣中ノ突起スル肉ノ名蓋シ迷尓
ルナテン　自ラ患タ大ナル者多シ庸医ハ之ヲ密果疣
トナスコトアリ然レ𪜈此人ニハ梅毒病諸症ヲ発

ヒス且ツ肉塊ヲ上面ハ疣贅ノ如ク粗糙ナラズ又真色ニ近傍ノ皮色ニ同シ疣贅ハ真色必異ナリ

全身ニ普遍スル緩慢ナル梅毒性ノ皮疹ヲ密集疣ト見誤ルコアリ然レドモ此皮疹ハ其初メ皮庖ヲ唯ツレク降起シ色ヲ変セス小許ノ液ヲ沙別シレ久レク唯班点形ニ上リ其上面剥テ鱗屑状ヲナシテ落ケ後ケ小痕ヲ残スル以テ区別スヘシ又梅毒疣潰ノ中ニ細別アリ治療ノ為ニ益ツレト雖モ梅毒病ヲ論スル諸書ニ載多ノ種類ヲ分テ記スルノミナラス新著述家モ亦此病ノ新形状ヲ採用セツ〇余輩之ヲ分テ三種ト為ス

〔其一〕有蒂密集疣ナリ此疣ハ皮中ニ蒂アリテ疣根ヲナシ長大ニ共ニ増息スルコ真ニ草木ノ如シ其上面枝ヲ分ツコト雞冠ノ如シ液ヲ沙別スルコト広潤密集疣ヨリ少ナク或ハ全ク分沙セサルコトアリ柿ニハ個々別レ生スル多クハ脚シク叢生シテ同時ニ発スル而メ曾テ互ニ合一癒着セス広潤密集疣ノ如ク伝染スル肉色ノ着ヲナス

〔其二〕広潤密集疣ナリ此症ハ根脚広クメ真広サ

ノ増息スルヿ高サヨリ甚タシ○其形チ圓ニメ
胡桃ノ大サアリ或ハ尚大ナルヿアリ但シ其高サハ
二分許ニ過キス○其止面或ハ不平ニメ小凸凹
アリ粕液漏孔其上ニ布滿スヿ或ハ平滑球圓ニメ
赤色也屡帯青白ナルヿアリ或ハ個々散生シ或
ハ互ニ鏈接スヿ且ツ多数同時ニ発ス
此症ハ梅毒班疹ヨリ生スヿ或ハ其班疹ノ開潰ナ
ルヨリ発スルヿ屡之アリ○此症ハ有蒂密果疣
ヨリ多キヿ常トス懸垂及ヒ已且杏腺ニ生ス
レハ汚灰白色ニ見ヘ虹彩ニ生スル説ハ尚永決
定セス

【其三】剥尓設例尹密果疣ナリ佛衆都ハ名初メテ此
名ヲ命ス○此症ハ林設ノ大サナルハ小圓泡ヲ
ナス好ンテ陰門ノ大唇及ヒ肢ノ内部ニ生ス娼
家ノ女ハ最モ多クメ男子ニハ曽テ之アルヿナシ
此症又他ノ密果疣ト同ク皆是假令造物真内ニ非サル
ヲニメ多クハ
ノ変性ヨリ起リ
療法此症本病ニメ梅毒ヨリ発スルヿハ殆ンド
皆其毒ヒニ全身ニ普達スルヿナリ剥尓福鳥多薩
尓撒巴栗剌尤萬滿並殊ニ功アリ若シ此剤功ナ

ケレハ別ニ尿ヘ名ノ法ニ従テ赤降汞ヲ内服シ又ハ
シ其方

越扶屋布斯安質沒扭八分
赤降汞二仏
白砂糖二匁

右混合シテ散トナシ平等ト分テ十六包トナシ朝夕一包ヲ服シ一包ノ汞量即チ八分仏ノ一ナリ

此症内服剤ノミヲ以テ治スヘキニアラス假令治スルモ速カニ再発スヘシ○此症屢新発ノ梅毒病ニ添テ発スヘキ故ニ始疳瘡ト同時ニ生スル但シ局処ニ傳染シテ局処病ナルコトハ至テ稀ナリ

此症ハ格別尓尻ヘ名ノ創製ノ鉄ヲ以テ功ヲ奏リ其後布列乙別尓尻ヘ名ノ溶液ヲ塗擦シ且ツ布ニ浸シテ貼スルヲ宜シトス此溶液ノ方

升汞一匁
皓礬二匁
再餾焼酒

右混和シ綿撒系ニ浸シ

廣潤密景尻ヘ新発梅毒症ニ生スルコト至テ多シ

此症ハ唯内薬ヲ以テ治スルニ足レリヨリ朝緒ス○剔尓設例尹売ハ腐菜ヲ以テ全ク除治スヘシ○虹彩ノ密景売ハ次テ失明スル者ナリ吐涎法ノミ屡之ヲ治ス

午梅毒発疹ナリ此病或ハ内塊トナリ水泡トナリ或ハ疥癬　嫩衝癬及ヒ亀裂脱脓トナリ或ハ疥癬

リ或ハ仇毛病トナリテ発ス密景売ヒ本性ノ正症ヲナキヲハ誤テ此病ナリトスル者アルヘシ○此皮疹ハ他ノ慢性皮病ト弁別シ難キヲ常ニ多シ然レニ乙弟亜児別尓私名ノ書中ニ廣ク之ヲ述フ

梅毒班ハ多クハ顔頸耳後頸胸陰処前膊手足踝ニ発ス○其色ハ薔薇紅ナリ又屡黯赤鋪色ナリアリ其大サハ直径一分ヨリ四分ニ至ル些シク瘙痒アリテ疼痛全クナシ皮上ニ高ク突出セス漸々ニ発見シ其出ルヤ定時ナク次テ痂ヲ為ヲ剥脱シ下皮赤色ナリ而メ又新タニ発見ス頭上鬚間又発ス其部ノ毛髪根死シテ脱落シ許多ノ班瘡湿潤シテ皮瘡トナシ仇脱テ仇根ニ仇瘡ヲ生スル等ノ症アリ

此病時ヲ経テ重疊錯雑シ発スル者ハ梅毒ヨウ後初テ消散ス

梅毒疹点ハ最モ多ク班ノ好テ発スル部上ニ発ス班ヨリ間ヲヲ生スルコアリ〇此疹點ハ小ニメ皮上ニ隆起シ赤色ニメ周辺硬ク疼痛シ焚ク如ク夜中殊ニ甚シク其正中ニ膿ヲ醸シテ恰モ疣癬ノ如ク経ニ漏ヲ結ヒ漏落テ赤痕ヲ残ス其後復新タニ疹點ヲ生ス〇此疹間互ニ近接シテ環状ヲナシ額及ニ亀頭ニ発スルコアリ故ニ入之ヲ梅毒冠瘡ト名ツク

此疹ハ傳染シ班斑燃熱癬鱗屑瘡ハ否ラス総テ梅毒ハ永ク身体中ニ保存スルニハ其傳染力愈々微弱トナル（亜尓別尓私説ナリ）

梅毒性輪癬及ヒ疣癬ハ此等ノ病ト迚別シ難シ此癬ハ顔面ヲ避ケス且ツ其前他ノ梅毒症ヲ発シ或ハ今尚存スルヲ知ルヘシ

〔療法〕総梅毒病ノ療治ニ同シ天蔓滴或ハ別尓尼ノ方剤屢大ニ効験アリ之ニ兼テ微温石鹸浴ヲ行フ但シ硫黄浴硫肝浴ハ宜ア

り（亜尓別尓セツ）此他日々微温ナル水及ヒ醋ヲ以テ洗濯シ終汗法ヲ行ヘ　ヲ以テ毒盡シ灰白汞膏ヲ擦入シテ吐涎スルニ至リ殊ニ皮中ニ破裂ノ瘡ヲ生セス必要ノ方ナリ素食ヲ命スル等皆緊要ノ主方ナリ

〔ホ〕梅毒筋痛ナリ此病ハ殊ニ手足ニ発スト雖ミ浮游シ一処ニ定マルコト無ナリ僂麻質私病ト甚タ相似タリ晩及ヒ夜中ニ疼痛増加スト但シ関節ヲ避ケ多クハ筋膜ニアリ只多クハ経久ノ梅毒ニ傍ヘ未リ発又骨痛ト同時ニ発ス

〔療法〕常用ノ微温浴大毒煎阿芙蓉ヲ用服シ極冷水巻法ヲ用ヒ阿芙蓉膏ヲ擦入スヘシ○疼痛消散スレハ梅毒病ノ治法ヲ行フヘシ

〔ヘ〕梅毒夜骨痛ナリ此症ハ深ク枳椇シタル梅毒症及ヒ汞毒悪液病ノ徴候ナリ

頻々患部ヲ洗浴シ晩ニ阿芙蓉ヲ内服シ兼ヲ消血剤ヲ用ヒ其後劇痛減スレハ矢篤満煎ヲ用ルヲ主方トス〔ト〕骨痛篇ヲ見

水銀ノ誤用ニ依テ発此症ヲ起スヲ以テ其源梅毒ニヨルカ将タ汞病ナルヲ弁別シ難キヲ故ニ

阿芙蓉剥尽福烏多薩尔撒巴泉列山酸硫黄浴等ノ効ナキコト證明スルニ非サレハ水銀ヲ用ヘス

〔酉〕梅毒眼炎衝ナリ已ニ前ニ記ス別ニ本論アリ

〔戌〕梅毒睾丸腫ナリ緩性ノ睾丸腫ハ屢急性睾丸腫又ヒ全身梅毒病ニ次キ来リ膿潰スルノ痿ニメ硬結トナルノ屢多シ〇両睾丸若クハ一睾丸ノ大ニナリ只其重サニ由ル〔患者直立スルキハ殊ニ牽引シテ不住ナル感覚ヲ起シ腰腹ニヒキ症痛ヲ発シ又感機ノ為ニ副睾及ヒ摂護腺ヲ侵掠スル者ハ慢性倒謨ヒ負跌炎衝ナリ

〔療法〕病尚新タニメ急速ナル症ハ防炎療法ニ宜シヒ已ニ経久緩慢ナル症ハ猶尊地丸ヲ服シ水銀軟膏失鳩答膏水銀膏実笑答里私膏次実烏謨膏等ヲ典睾丸炎衝摂護炎衝篇ヲ見ヨ

〔支〕梅毒骨病ナリ骨瘤硬結骨軟和梅毒性結腫及ヒ関節強直之ニ属ス之ニ由テ其骨或ヒハ軟和シ或ハ脆弱或ハ強直或ハ破摧シ易ク次テ骨膿ヲ生ス〇此症ハ皆深ク根拠セル梅毒病若クハ水銀ヲ誤用スルヨリ起リ多クハ悪液病英國病腺病失旨尓倍尿水銀病ヲ患ヒタル人ヒニ久シ

ク夜骨痛ヲ苦ムノ後ニ生ス

〔療法〕九ニ戒慎スヘシ水銀剤適応セサル症多シ患者早ク已ニ水銀ヲ多服シタルトキハ殊ニ然リ○山酸ヲ内服シ或ハ之ニ交代シテ剥尽福鳥多薩尔撒巴栗列煎ヲ用ヒ或ハ同時ニ共ニ与ヘ晩ニハ粑歇尔散ヲ用ヒ失苟児倍苔ヲ患ル人消食機哀弱スル人ニハ機那葛蒲根蒲萄酒等ヲ与ヘ兼テ香竈微温浴ヲ行フヲ甚メ良トス○真後水銀軟膏ヲ試用シ殊ニ失鳩答越哉斯菲私汰越哉斯ヲ加ヘ結腫及ヒ患ルトキ他ノ諸薬皆全ク効ナクンハ碌鳥弗剌尔及ヒ律私多共ニ名ヘ人ノ法ニ従フテ鉄鉄療法及ヒ擦永法ヲ用フヘシ○骨蝕衝変メ膿潰スルトキハ緩和温巻法及ヒ骨膿ノ療法ヲ行フヘシ

梅毒関節強直病ハ始ント皆不治ノ症ナリ他ノ梅毒病ニルト雖ニ此症残留スル硫黄浴剥尽福鳥多失鳩答ヲ試用スヘシ

〔第十三〕

ナリ梅気アリ母ノ毒ハ子宮内ノ胎児ニ伝染スルコトナシ此ノ如キ婦人ノ生ミタル児ハ他病ヲ患ヘ且ツ消耗病ニカヽリ

其後屡腺病及ヒ英國病姙中水銀ヲ誤用スルモ
亦此病ヲ誘発スルヲ患ルコトアリト雖ニ其母ノ
梅毒ニ染ミ未ラサルコト疑ヘナシ
通常児ノ梅毒ヲ受テ生ルヽ者ハ産出ノ時腟中
ノ毒ニ觸テ傳染スルナリ是初生児ノ皮膚ハ甚
タ脆軟ナルカ故ニ傳染毒ニ觸タル諸部ハ原始
梅毒病ヲ発スルナリ或ハ又生産ノ時ハ少シモ
傳染セス其後チ母ノ乳頭ヨリ傳ヲ者時ヲ之ア
リ
又健康ナル児梅毒病ヲハ梅毒姙ノ疫癘ヲ患ヒ
ニタル乳母ノ乳頭ヨリ傳染スルヲ屡之アリ其
病ヲ誤リ認メテ他病トナシ無幸ノ児或ハ速カ
ニ死ス或ハ生涯不幸ヲ蒙ル
證候及ヒ経過　産出ノ際ニ傳染スル時ハ多クハ
其後チ十日ヨリ十四日ノ中ニ其病ヲ発ス其初ノ
メ屡肛門ニ帯青赤斑ヲ大四処ヲ生ス其斑紫赤
ナル者最モ多シ其斑処自ラ隆起シ平扁泡トナ
リ之ニ觸テ硬キヲ覚ヘ此病ノ本性ナル一貫種
ノ着ラナヒ八日ヨリ十日ノ後ニ此泡疱没シテ
瘡瘡トナリ白色豚肉状ニメ疳瘡性ノ着ヲ為ス

○此病肛門ヨリ傳ヘテ前陰ノ方ニ来ル
若シ産時児頭久シク産門ニ滞ルトキハ梅毒病ノ
如ク頭辺ニ発スルコト多シ又痂有ナリト雖ニ産
出ノ時梅毒児ノ眼ニ染ムトキハ梅毒性ノ
乳婆ノ
ヲ生ス
乳頭ニ瘍瘡アリテ産後晩ク小児ニ傳染
スルトキハ先ツ口中ニ病状ヲ現ハス鶯口瘡ト甚
タ混雑シ易シ然レトモ精細ニ考究スレハ此症ハ
唇及ヒ頬ノ内面ニ小泡ヲ鶯口瘡ハ唯舌上ニ
ノミ生ス然レトモ此病モ頑固ナルトキハ梅毒ノ疑
ヒヲ容レスンハアルヘカラス
乳児ノ病急ニ全身病ト為テヨク之ヲ治スルヿ
ヲ得サレハ速カニ羸痩病トナリ扁骨上殊ニ頭
上ニ急ニ腫瘍ヲ生ス其児ハ亡モ慎テ治療スル
モ又死ス真母梅毒アルヲ以テ小児生来衰弱多
病ナルトキハ殊ニ然リ
乳婆ノ乳房ヨリ晩ク傳染シタル小児ノ病古人
ノ思ヘル如ク乳汁ヨリ傳染スルニ非ス〻ハ総テ
大人ニ於ルヨリモ悪性ナリト雖ニ其前徴用ヲ
甚タ悪カラス是小児ノ梅毒ハ速カニ諸部ニ廣

カリ易ク且ツ其体猛烈剤ニ感覚スル機カ自ラ鋭敏ナレハナリ

〔療法〕此病ハ速カニ進ム力故ニ茲ニ水銀ヲ用ヒサルヲ得ス然レ𪜈諸水銀剤ヲ撰用シ且ツ服量ヲ定ムルニハ大ニ謹慎ヲ加ヘレ故ニ精密ニ諸産ヲ究知スヘシ

〔方一〕永塩ハ内服スヘカラスト雖ニ之ニ反シテ小児ハ患タヨク次方ヲ服スルニ堪フ其方

甘汞
金硫黄 各一瓦五二仏

麻尼涅失亜遏尔枝 半匙
アラビヤコム 一匙
白砂糖 一匙半

右混和シテ散トナシ分テ十八包トナス朝夕一包ヲ取リ乳汁ヲ以テ送下ス

此剤ヲ服シ了レハ他ノ永製剤ヲ換ヘ用ヲ即チ

華涅滴溶剤

毎晩唯十二分仏ヨリ八分仏マテ用ヲ然ルニ哺乳ノ児ハ嬰男中ノ酸敗液ヲ患フルカ故ニ麻尼涅失亜遏尔枝ヲ加フ

〔第二〕児患タ弱ク永剤ヲ内服スレハ慢性壊疽ヲ
発ヲ起スヤハ唯乳母ニ甘汞ヲ与ヘ或ハ華涅満
製剤ヲ用ヒ児ニハ薬ヲ与ヘス是水銀乳母ノ液
ニ混シテ乳汁ヨリ小児ニ功ヲ奏スレハナリ

〔第三〕右法ヲ行ヘニ梅毒病治セスンハ只母若リ
ハ乳母ニ興ル薬ニ托スルノミナラス間々日々
灰白水銀軟膏ヲ児ノ皮上ニ擦入シ香竄浴ヲ行
フテ養効ヲ待ツヘシ

〔第四〕梅毒病児母ナク乳婆之ニ乳セハ其乳頭ヲ
真テニ児ノ口中ニ觸シメス弾力強ク華尓斯ヲ

以テ製シタル乳頭帽ヲ被フテ之ニ哺セシメ其
乳婆ニ最初ヨリ甘汞半氏ヨリ一氏マテヲ朝夕
ニ服用セシムヘシ

〔第五〕児疲痩シテ乳婆甚タ強硬ナレハ数日水銀
剤ヲ用ルヲ止メ乳婆ニ私百先里屑納律謨蒭ニ
菖浦根ヲ加ヘ良肉羹汁ニ麦酒汁ヲ与ヘ児ニハ
痛ニ犢羹汁ニ卵黄ヲ加ヘ摸知シ用フ

假梅毒病

梅毒病ニ多少類似セル諸般ノ緩慢ナル病状ニ此ノ名ヲ命ス然レドモヨク梅毒病ト区別スヘキナリ此病ニ属スル者ヲ掲示スル

〔第一〕卵度病ナリ依亜烏私及ニ必安私ノ別アリ亜弗里加州ノ中黒人國及ヒ西印度諸嶋ニ多シ

○此ニ病共ニ慢性ノ傳染スヘキ疹ニメ諸人ニ傳染流布スル事齢男女掲ラス殊ニ小児ニ侵シ一回患フレハ再感セス此地ニ生ヲ営ム白皙人ハそう患ルコト甚タ希ナリ

依亜烏私ハ大ニ癌ニ似テ終ニ膿ヲ醸ス処レ
汎乙状ノ起脹ヲナサス入術ノ助ケヲ候タスメ
治ス

必安ハ之ニ反メ大ニ頑固ニメ恰モ悪性ノ輸癖
ニ同ス其流布スル方境至テ狭シ即チ屓(キュイ)乙涅ノ
亜海湾之ナリ

此故ニ此二病ヲ各別ニ説示ス

〔其一〕依亜烏私ハ多クハ発病前六八週間其前徴
アリテ四支ノ懈怠シ腫痛不安消食機ノ諸病即チ
食気缺損異嗜便秘等ナリ四支頭背中ニ俵广疣

私痛アリ心志沉鬱シ錯乱シ悲憂脈遅緩ナリ之
ニ次テ発疹起脹ス其起脹ノ時期ハ数月連続ス
ルヲ遅(スク)之アリ

最初項喉頭ノ近辺股胫ニ赤班ヲ発ス漸々水ヲ
為シ水泡トナリ周囲ニ瘡状ノ者ヲ発シ其後諸
処ニ此班ヲ発シテ終ニ泡トナル次テ頭腫脹シ
眼未タ皮庐痒ヲ発ス○此泡起脹シ硬ク青色ニ
ナリ其項上ニ白點ヲ生シ破レテ膿潰ス

膿潰ノ時限多クハ数月留連シ癆ニ似メル小瘍
個々分散シ生シテ合集スルヲ痂ナリ疼痛甚タ

劇シカラス口内頭髪間ニモ又怒シ瘡辺ノ毛髪
白色トナル
其膿濃厚ニメ淺黄ナルハ軽症ナリ痂薄ニメ臭
気アルハ諸部ヲ荒蕪シ血管ヲ穿蝕シテ出血シ
ル等ノ症アリ終ニ乾固ノ時限ニ至レハ軽症ハ
厚痂ヲ結テ硬ク ナリ落ヲ健全ナル皮膚トナリ
○悪性ナル症ニメ膿痂ノ臭気アレハ其瘡乾カ
スト雖モ益廣大ニナリ緑辺起脹ス赘肉ヲ生ス静脈
瘤状ニ張出シ関節ヲ荒乱シ強直ノ症ヲ起シ溶
崩下利慢性等ノ候、此候、水腫ヲ發シテ死ス

依亜烏私ハ方土ヲ定メテ他邦ニ及ハス陰処ヲ
侵サス假令之ヲ侵スモ甚タ痂ナルト再感セス
人術ヲ假ラスメ治シ水銀ヲ用フレハ悪症ヲ起
ストヲ以テ十分ニ 梅毒病ト已別シ入レ
此病ハ患者ト健全ナル人ト直チニ相觸接ス或
ハ交媾シ又蝕瘡上ニ承リ其毒ヲ負テ健全ナル
人ニ傳ルニ由テ発ス 我邦ニ於テハ
ニ在テ此ノアルヲ見ル
時期ヲ過ルノ愈速疾ニメ前徴ノ時限愈短ク潰
膿落痂愈好ケレハ病考益軽良ナリトス

療法此病ハ病毒分裔トメ見ルヘキカ故ニ強猛ナル薬剤ヲ以テ経過ヲ妨ケルヲ勿レ〇下剤及ヒ他ノ減殺剤ヲ与フルヲ早キニ過ルヲ害アリ本尼連（ホンテンヘン）名ノ油ニ従テ前徴ノ限時ニハ適宜ニ運動シ温浴ヲ施シ軽キ若シ茶肉羹汁ヲ用ヒ上好松香ヲ薫ヘタル布片ヲ以テ身体ヲ摩擦ス食機缺ルヰハ吐剤ヲ用ヒ便秘スルヰハ開通吉里私爹児ヲ行フヲ宜シトス〕第二時限ニハ起脹ヲ促スカ為ニ軽キ発汗剤ヲ主トス接骨木花浸民垤列里精微温浴是ナリ若シ生力大ニ沉降スル者

蒲萄酒竜脳幾那ヲ与フ〇膿已ニ成レハ之ヲ破開シ幾那茶ノ苦味茶ヲ内服シ桑橋ヲ清潔ニメ之ヲ被ヘ膿良性ナルハ（ルヲヨフ）遏尓他根酋ヲ以ヲ添ヲ軟ラケ治痊スルニ至ルマテ強壮剤ヲ与フ〇若シ真瘡悪性ニメ薄汚臭膿ヲ泌別スルヰハ之ヲ被フニ没薬硫酸巻石ヲ以テス

関節腫起スル症ニハ硫黄浴托歇尓散矢鳩答徴温浴湯加孛巻酒石等適当ス

病全ク治セスンハ患者ヲ欧羅巴州ニ送ルヘシ

〔其二〕必安私ノ前徴ハ皮庐強痒怠惰疲羸尫憂急
痩ナリ依亜烏私ノ如ク四肢及ヒ諸骨ニ僂ア質
斯痛ヲ発セス」次テ迂延神五热ノ徴候ト経過ト
相同シキ哥尓賢ヲ発ス
此病最ニ多ク交媾ニ依テ発スルカ故ニ哥尓賢
ヲ発スル時限ニ方テ同時ニ処陰ニ瘡状ノ輪癬
ヲ生ス痒ク強シ侵蝕ス次テ嵐蹊辺腋下及ヒ身
体中竟テ瘡瘍ヲ患ヒタル部ニ普ク傳布ス
此輪癬ノ中ニ綿鍼頭大ノ赤瘍ヲ発ス次テ白色
トナリ破壊ス然レ𪜈膿ニアラスメ酷厉ナル黄
色ノ汚乙ヲ泄ス終ニ一掌大ヲ黄色ニ見ユル瘡
トナリ青色ナル海綿状ノ臭肉ヲ生ス其形テ仏
刺謨楼仙(ブラムフーレア)景英名ニ似タリ羅甸名ノ仏刺謨蒲(ブラムフーレア)失亜
沙烏発傑(シフヒリス)ハ之ヨリ出ツ
此病ニ又依亜烏(イヘス)ノ如ク発疹ヲ病毒分岐トシ
見ルヘシ若シ是ヲ抑壓スレハ危劇ナル転従病
ヲ起ス是之疹発起スルヤニ諸前徴症消除スヘ
キニ今之ヲ抑壓スルヤ劇烈ナル骨痛骨蝕衝
骨軟和症ヲ起セハナリ

此疹及ヒ瘡小ナルトキハ海綿状ノ息肉赤色ナリ
若シ其ノ大ナレハ其近傍白赤色ニ変ス故ニ
赤必安白必安ノ名ナリ○許多ノ瘡集合シテ一
トナリ緩慢瘡トナルトキハ乳房必安首長必安ト
名ク
此病ノ経過中ニ足底ニ赤ク恵ヒ次テ破壊シ
其中ニ腐蝕ノ膿アリ」手足ノ指ニ輪癬状ノ疹ヲ
発シ患部劇痛強硬ヲ加ヘ加卵涅人名ニ於テハ
トナリル処ノ甘結ル状瘡之ニ次キ来ル○若
シ有カノ人術ヲ以テ制スルヲ得スンハ漸々進

ミ次テ満発病水腫麻痺ヲ起シテ死ス○加卵涅
地名ニ於テハ時ニ又赤病ニ変スルコトアリ〔赤癩ノ
見ヨ○必安私ハ傳染シテ患ルヿ依亜烏私ニ同
シ
〔療法侵蝕毒ニ同シ○水銀剤ハ害アリ故ニ私
百失私里尼納律謨剥尼福烏多薩尓撒巳栗亜安
頁母杜ヲ用フヘシ微温浴簡単ナル滋養ノ食物
ヲ用ヘテ此療ヲ輔ク
〔第二〕傳染梅毒疹ナル此病ハ卵度病ニ等シ
者ニメ恐クハ梅毒ト癩病ト相混スル者ナラン

是此病ハ東方ヨリ非鳥黙（ニウメ）地名ノ方ニ送リ来ルヿ
疑ヒナキヲ以テナリ又矢結尓刹忽病ト名ク〕其
篇ヲ見ヨ

〔第三〕忽尓私的連剌謨黙連実多未尓施（共ニ地名）中ノ
未尓私病ナリ此病モ又伝染シテ起ル〕此病ヲ論
スルニ古史ニ頼ラスメ芙飾ヲ加ヘタル諸憶説
アレヒ千四百九十四年ニ梅毒病終起メ後同様
ニ伝染スルヲ以テ古等ノ梅毒病ヲ詳カニ穿鑿
シ五ニ比較スルト雖モ此病ハ俊智ナル人モ此
病性ヲ弁明スル能ハサルヘシ〔矢尓結刹忽篇ヲ
比較セヨ

〔第五〕私骨多國ノ失弁（ニッセンス）私一名失鳥汐尹私ナリ此
病ハ里弗的尓名ノ説ニ従ヘハ其初メ咽喉及ヒ
口中ニ瘡ヲ生ス急ニ侵蝕シテ周辺ニ蔓延シ上
顎巳且杏腺懸壅垂ヲ荒蕪シ且ツ骨ヲ侵シ顔面
ニ出テ眼瞼ヲ襲フニ至ル此ニ方テ或ハ吹ク
晩ク殊ニ顔中ニ銅色ノ斑ヲ発シ連カニ大瘤ヲ
結ヒ漸々海綿状ノ白色ナル息肉ヲ生ス〇劇痛
アル間ニ患部ヨリ臭気強キ柿膿ヲ出汁シ終ニ
瘡瘍ニ変ス

此病ハ私腐多國及ニ加那多地名ニノミ之アリ里
弗的尓　之ヲ此病ニ定リタル梅毒病トナセリ
○交媾ニ由テ傳染スルヲ緒ナリ然レドモ母及ニ
乳母ノ乳頭ヨリ之ヲ傳フ此病ハ遺毒病ナルヘ
シ
療法水銀之ヲ治スルヲ緒ナリ山酸水葵蔥及ニ
他ノ清血蔥却テ多ク効ヲ奏ス

〔第五〕

此病モ亦傳染シテ怒ス皮声ノ刺衝檢敏鋭ナル
児女ニ殊ニ多シ男子ハ唯柔弱ナル皮上若クハ
創傷セル部傳染毒ニ觸レハ之ヲ発スルノミ○
重キ冒寒粗食北地ノ海濱ニ停滞スル等ヨク此
病ニ傳染セシム
或人ハ此病ヲ癩病ノ変トス実多名ノ説ニ従ヘ
ハ其病狀梅毒病ニ変スル者アリト雖モ且ラク
之ニ命スルニ
ノ名ヲ以テス
症候此病ヲ発スルニハ少許ノ聖原僚様傑声候
私患アルノ外別ニ前徴ナシ其病狀常ニ同シカ
ラス○手足ニ鉛色若クハ暗赤色ノ斑或ハ結節
ヲ生ス進蝕瘡ニ変ス真緑瞳起スル者多シ

○此瘡水様ノ粘液ヲ分泌シ周辺ニ鱗屑状ノ痂ヲ結シ脉絡膨脹シテ静脉漏状トナリ其後骨ヲ荒無シ支ニ至ラ自ラ治シ冬ニ至テ再ニ破壊スル者ハ声嗄シ咽喉燃衝シ頬及ヒ唇ヲ侵スヒハ顔面醜状ヲ為シ鼻骨前肚骨膞骨ヲ冒シテ骨痛及ヒ骨膿ヲ起スニ至タル○陰処及ヒ毛髪アル部ハ此病ヲ免ル○已ニ数月ヲ経且ツ治療ヲ怠レハ消耗病水腫死ヲ致スヘシ之ニ次ク〕病初ニ速治スルヲ要シ又雑シ療法内服ニハ甘汞華混満溶汞ヲ小量ニ取リ五ニ交代シ与ヲ但シ連用セスメ吐涎ヲ催スニ至ル者ヲ私百矢里尼納律謨剥屈福烏多薩尔撒巴栗烈ノ煎汁ヲ温服シテ蒸気ヲ怒スヘシ微温浴ヲ行ヒ硫砂ノ溶液或瑰蓉没茶阿仙茶丁幾剤ヲ以テ瘡処ニ敷キ骨瘤上ニハ水銀膏ヲ貼シ此他素食ヲ用ヒ大ニ浄潔ニシ塩物酸物薫気物及ヒ鋭烈ナル飲料ヲ禁スヘシ

〔按ニ加那連病又斯多巴烏律私扱ヒ病ト名ク私骨多國ニテ矢辨私ト名ツクル病ニ同英國ノ人矢、傳送ス故ニ此邦ノ人ハ之ヲ英國

病ト名ク〔弗剌謨蒲矢亜、私骨質加ノ條ヲ見ヨ〕〔第七〕変形梅毒病ナリ多年前獨乙都國ノ英傑ナル大医令乙藐智屈粟都人名自述ノ書中ニ明カニ此病ヲ載スヲ以テ古今ノ記者説ク処ノ変形梅毒病ヲ如何ンカ理會シテ可ナラン乎ヲ知レルヘシ

総テ変形病ヲ識得スルハ理術ニヨルニアラス実ニ各病共ニ唯其諸症ヲ集メテ其何病タルヲ知ル者ナルカ故ニ其症厭鈌スレハヨク之ヲ考ヘ知ル能ハス然レ𪜈其症現ニ存シテ医者ク其病ヲ知リ得レハ則チ其病ハ已ニ変形病ニアラサルナリ

非謨剌人ハ次ニ掲示スル梅毒病状ニ変形梅毒病ノ名ヲ命セリ

〔其一〕交媾ニ依テ傳染セス只非常ノ路ヨリスル者乃チ吸口烟管古誇匙箸或ハ口中ニ痱瘡ヲ生シタル幼載者〔王典宗ノ小児ノ陰茎ヲ截テ口ニテ血ヲ吸出ス人ナリ〕若クハ外科産科術ヲ行フ時其手梅毒ニ染ム者之ナリ

〔其二〕交媾ニ由テ傳染ス極メテ軽少ノ原始病ヲ

起ス共ニ識認シ得ス方今導尽梅毒病ヲ尽スルモノ

其三原始梅毒病ヲ患ヒテ全治セス数年ヲ経テ後新タニ傳染スルヿナクメ全身梅毒病ヲ尽スル者ハ梅毒ノ里障眼又之ニ属ス然レ𪜈此諸症ハ一モ変改梅毒病ト名クヘキ者ニアラス異族梅毒病ト称スヘシ

葦設名曰ク古代ノ医家ハ変改梅毒病名ヲ以テ水銀ヲテ治セサル諸症ニ命シ他人ハ梅毒多年間体中ニ潜伏シ久ヲメ後其本性ノ勢ヲ終動シ

ル者ニ命セント欲シ又他人ハ諸症梅毒病ニ類似シル諸病即チ依屈多悪性皮疹等名クハ此病ニ梅毒病ト合併スル者ニ命ス然レ𪜈〔其一〕ノ説ハ無根ノ謬誤ヲ守リ〔其二〕ノ説ハ全ク習熟スル実験ニ反シテ論ヲ走ヲ〔其三〕ノ説ハ原梅毒病ニアラサレハ其症状シクシテ梅毒病ト名クルヲ得ス且ツ梅毒病ト他病ト合併スレハ已ニ單一ナル梅毒病ニアラサルカ故ニ採用ヘカラス此名ニ相当ルノ意味ヲ得セレメント欲セハ原始局処病疹ヲ只局処ノ方

茶ヲ以テ療シ病尚未タ去ラス一回随処視ノ健
康ナル時アリ其后導淫梅毒病彼此ノ形容ヲナ
シテ終見シ未ル所ノ症ニ命スヘシ然レハ則チ
近世梅毒病ノ間歇ト名ケント欲スル者ト同義
ヲ徴スヘシ
然レニ予ハ此説ニモ又皆テ定従スルヿ能ハス
何トナレハ原始梅毒病ニ次テ導發梅毒病ヲ起
シ未ラサレハ則チ之ヲ変形病ト名クルハ明カ
ニ迄ノ推量ナリ之ニ次メ導淫病次キ来レハ則
チ其病ハ直正梅毒病ニメ変形病トユフヘカラ

ス実ニ此名ハアレニ益ナシ唯主〔医〕客〔病〕ノ齟齬
シテ正名ヲ得サルヨリ起リタルナリ
薇麻尓〔ニマルレン〕私名ハ他病ト合併シタル梅毒病ノ水銀
ヲ手フレハ良効アリ鉄剤ヲ用フレハ害アルヨ
リシテ知ルヘキ症ニ此名ヲ命スレニ其定処ス
ル処ノ基礎亘レキヲ失ヘリ故ニ変形梅毒病ノ
名ヲ取用セサルヲ宜シトス
〔第八〕水銀病ナリ医家誤ツテ此病ヲ梅毒病トナ
シ頑固ニ水銀ヲ連用スルニ由テ此类ノ患者ヲ
屢多ク黄泉ニ陥ルハアルヿアルカ故ニ益ニ此病ヲ

揭示ス水銀ヲ多量ニ用ヒ或ハ擦膏ヲ行フ後ケ
速カニ発スル処ノ水銀毒病ノ徴候ハ永熱ヲ発
シ忽チ口中ニ永味ヲ覚ヘ耳腺腫脹シ煩悶シ戦
慄頭痛シ脉疾数且ツ其後次テ吐涎スル等ノ症
アルヲ已ニ上ニ記載セリ
習熟セル諸医ハ水銀ヲ用フルニ十分ニ吐涎シ
ルニ至ラスメ傍止スル所以ハ危殆ノ症ヲ発シ
尚且ツ口舌腫脹シテ塞窒スルヲアレハナリ此
他尚恐怖スヘキ永病アリ即チ消耗熱　大衰弱
洟瘡顔色灰白奇形脱肉咽中及ヒ皮上ノ悪性瘍

骨起脹腐蝕全身水腫溶崩下利死斃是ナリ
梅毒病ノ極悪性水銀病トハ屢〻別シ難キヲア
リ若シ吐涎先ツ発スルヤハ則チ之ヲ知リ易シ
是水銀病之ニ次テ発スル易ケレハナリ
次ノ徴候ヲ以テヨク水銀病ヲ弁スヘシ即チ陰
処及ヒ口中ノ瘡瘡已ニ一回治セントスル者復
変シ其形圓ニメ脉肉状及ヒヘキ者自性ノ着ヲ
先ヒ周辺不平ニメ青色ヲ帯ヒ腫タル頬ニ向ヒ
テ歯ノ壓拠スル処ニ新瘡ヲ生ス或ハ前永患者
瘡形変ス便毒変悪シ且性ノ膿変シテ悪性トナ

リ已ニ治シタル痛瘡新タニ傳染セスシテ自ラ
破開シ全身皮上ニ疹ヲ発シ速カニ痂ヲ結ヒ
ニ英似シ殊ニ微腫セル顔面及ヒ頭髪
中ニ生ス
此症ハ十分発動スル梅毒病ニ比スルニ総体ノ
疾患甚タ重シテ乃チ寒気及ヒ元気ノ変ニ大ニ感
シ蓋眼先苟尓倍苦状ヲナシ振戦シ力脱シ悪心
シ食気缺乏シ頭鈍痛シ夜骨痛劇烈ナリ又諸処
ノ骨殊ニ前徴骨及ヒ脛骨ニ結節ヲ生スルニ至
スルニ至布状ニメ数月ヲ経テ后破開スレハ已
ニ其下ニ骨膿及ヒ腐骨ヲナスヿ屢之アリ又間
此瘡ヨリ速カニ豚肉状ノ者ヲ現セシ急ニ膿ト
共ニ流出スルヿアリ
此瘡痊ルトハ扁平ニ其口ヲ収メテ赤痕ヲ残ス
ヿ速カニ又再タヒ破綻ス
骨軟加スレハ大ニ上顎骨ヲ荒壊ス歯窠ノ周縁
全ク消滅ス諸歯尽ク落ツ
足脚ノ痺耳聾吃言喘息皮上疣苟児倍苦状班ハ
屢此病ヲ導発スルモノタリ
習熟スル実験ニ従テ見ルニ此恐怖スヘキ水銀

病ハ擦膏方若クハ水銀ヲ内服シテ発スル真ノ
吐涎病ニ次テ起ルト雖モ然レモ又之ニ拘ラス
不慮ニ先ツ吐涎スルヲナレニ梅毒ヲ患ル人ニ
ヒラ終ス是医家妄リニ唯梅毒ハ水銀ヲ用フル
ハ治シヘシト思ヘ原始疳瘡全治シテ后ニ十
日若クハ尚其餘ヲ経ルヒハ尚此毒素ヲ持重シ
テ連進スルニ至スルナリ
口内水銀毒瘡ヲ生ス噤下困難ヲ苦ニ陰処ノ疳
瘡悪疔ナルトキハ永熱ノ医家之ヲ導発梅毒病
トナルヒアリト雖モ変成梅毒病ナリト誤認ス

スル者多シ
此ノ如キ医家ハ患者ノ口中ニ永味アリ気臭悪
臭アリ歯齦失苟児倍苦状アリ疳瘡歴然トメ悪
性ニ変ス豚肉状ヲ着ルアルヲ疳瘡ヲ失ヘ且ツ
周縁全ク固形ヲ失ヘタルニ注意セス尚水銀ヲ
連用シ又悪シキニ至テハ他ノ水銀剤ヲ立テン
ヲ交換シ用ヒ疾病日ヲ進テ悪疔ニ進ム此之医
ハ梅毒ヲ根治スルニ必ス一定量ノ水銀ヲ要ス
ル者アリト誤リ認テ感受機補復機ノ度ノ異ナ
ル従テ甲人ニハ四匁ノ水銀ヲ用ヒテ乙人ノ

二十四人ヲ服シタルヨリ其功強大ナルヿ譬之
アルヲ考覈セサレハナリ○之ヲ以テ不幸ナル
患者ハ此毒療法ノ為ニ困メラレ或ハ生涯病身
トナル噴セサルヘケンヤ

療法

馬最初ニ身体内外ニアル水銀剤ヲ尽ク除キ去
ルヘシ其法患者ヲ石鹸微温浴湯ニ入レ体外ニ
残リタル水銀軟膏ヲ洗ヘ落シ清潔ナル衣ヲ服
シ若シ水銀ヲ内服スル者ハ蔴油下剤ヲ与ヘ
腸中ヲ清潔ニス

羊患者冒寒ヲ避ケ微温湯ニ
三ヲヲ溶シテ日々之ニ溶シ列氏瞼温器十四五
度ノ暖室ニ在テ養中ニ卧シ軽ク滋養スル犢肉
羹汁ニ卵黄ヲ加ヘ用フ
半此病尚時日ヲ経サルヰハ次方ヲ飲服ス其方

亜剌比亜護謨
護謨達剌倪蔔萬 各適宜

右分テ九十九ト為ス十九ヨリ十五九ヲ服ス
ル丁日ニ三次毎服後次テ醋一食匕ヲ飲服ス

且ツ兼テ同時ニ次方ヲ服ス

浄阿弗蓉 半匁
龍脳 二匁
甘草膏

右混合シ分ツテ八箇ト為ス朝夕其一ヲ用フ

〔鶏〕已ニ右剤ヲ用フ或ハ其病已ニ久シキヲ経ルニハ連々硫黄浴ヲ行ヘ且ツ兼テ菖蒲根浸ニキ及ニ阿弗蓉液ヲ加ヘテ内服シ兼テ有カノ肉羹汁炙肉ヤ訖ノ蒲萄酒ヲ典フ

〔犬〕水銀瘡ニ外敷シ或ハ含嗽スルニハ胆巻一二匙ヲ水一甘ニ溶シタル液大ニ効アリ緑青溶液及ニ刺必私卵獣尓那里斯溶液モ又良効アリ

〔豕〕経久ノ水銀病已ニ骨ヲ壊フニハ痂満酸二十滴或ハ二十五滴ヲ燕麦水一骨布中ニ開加シ十日ニ三次ツヽ飲服スル且ツ幾那煎ニ胡桃越幾斯ヲ加ヘ或ハ私百失里屈納律謨ニ菖蒲根ヲ加ヘ或ハ亜鹸越乙尓仙辛土尓弗（共ニ地名）ノ天然硫黄泉ヲ服スヘシ

〔羊九〕全身梅毒病ノ極所症ニメ緑鳥弗刺尓及ヒ

律私多共ニ名ノ猛烈ナル鍼鍼法及ニ擦永法ヲ行ヘトモ尚全治セサルカ病アルカ故ニ其餘殘ノ毒ヨリ后晩ク諸症ヲ発スルヲアリ此時ニ方テハ最初山酸ヲ試用シ而シテ奏効ナケレハ暫ラクレメル列黙例名ノ法ニ従フテ錄降汞ヲ以テ服シ其方ハ水銀加尔幾ト銅トノ和剤二ルヨリ四ルヲ丸トナシ日ニ二三次宇ルナリ〔非謨剤名ノ方ナリ〕且ツ兼テ膣尓撒巳栗刺盬及ニ〔ホツクホラト〕盬ヲ用フ

〔第十〕依剥昆垤里亜梅毒病ナリサキニ麻病及ヒ疥瘡ヲ患ヒ其病治メ後尚梅毒ノ根治セサルヲ疑イ憂苦シテ其毒尚体中ニ陰伏シ早晩必殆危ノ症ヲ発シルナルヘシト想ヘ大ニ心神ヲ労スル者ニ此名ヲ命ス

此病入ハ屢時ヲ経メテ恐怖不静血液膨脹心悸等ヲ患ニ〇予此症ニハ清涼下剤ヲ與フ其後續シテ收斂亜的尓ヲ用テ常ニ良功ヲ奏セリ

此ノ如キ病人ハ其病状ノ真性ヲ明白ニ告ケ諭フヒハ却テ其匿ヲ下ユナリトス他匿ニ托シ或ハ水銀ヲ服シテ大害ヲナスコアリ故ニ暫ラク

22
F6403

患者ノ意ニ隨フテ梅毒病ナリトスヒ煎薬ヲ用ルノ后ナ時ヲ経テ已ニ梅毒ノ根治スルコヲ明白ニ論スヘシ

謨斯篤梅毒篇 大尾