

疔瘡辨名

青洲先生

以

疔瘡辨名

青洲先生

疔者釘也某若楚如釘刺因以為名蓋疔之為病  
所謂羔梁之變而其人恣食辛雜厚味炙烤腥葷  
及誤食自死禽獸或遇大霧大暑大風大寒天地異  
之氣觸動其毒震發其外迅速如箭荒暴如健有

拾三卷

六書 全

疔瘡辨名

全

疥瘡辨名

此處有若干條垂直的藍色線，用於書寫正文，目前內容模糊不清。

呂

疥瘡辨名

青洲先生著

疔者釘也其若楚如釘刺因以為名蓋疔之為病所謂羔梁之變而其人恣食辛粹厚味多燻腥葷及誤食自死禽獸或遇大霧大暑大風大寒天地暴沍之氣觸動其毒震發其外迅速如箭荒暴如讐有忽斃而忽死者朝斃夕死者有三日五日或半日一月而死者其患千狀方能心或寒熱或惡心嘔吐或謔語煩躁或乾渴或頭暈撮空及眼花至其重則麻木不痛或昏沈失人度或暴死或焦咽損聽或串骨爛筋其形色或赤或白或陷凹者突起者或易腐易陷者或堅牢而不然者或泡子如

菜莫如豆粒如石搯子或盤根四畔四畔偏赤者紫者紅花黑者紫黑者其頭其泡或白泡又遍暈癩粟而黃者赤者白者班而赤者黑者紅黑者紫黑纏繞者或紅絲長引而寸忽復寸尺忽復尺或雲蔓者紫黑而左頭則忽翫遍顏面左手則忽亂滿腕肘者以上症狀多端古人之分之以名遜思鮑說二十三種之名目千金曰白癩癩其症肉上起頭大如黍米色少烏黑四辺微赤及癩已心食麻子及衣麻布并入广油中行

二曰石疔其狀皮肉相連色烏黑如烏豆其硬刺之不入肉內陰之微疼心尾磚石之屬

三曰雄疔其狀泡頭烏壓黑四辺仰瘡泡將起色黃大如錢孔許忌房室

波

一曰挂散 虛浮久大便出ス今不覺之千三トサイ下ルニ用ルツ

老人ノ兒ニ多ク有ルツ 方今ク白木肉豆蔻 乾姜炒 訶子

罌粟殼蜜炒 甘草茶 附子麩裏炮 右生姜二斤烏梅水煎 服

四曰堆疔其狀瘡頭少黃向裡壓黑赤似灸瘡四畔泡將起赤其大如錢孔忌房室

五曰火疔其狀如火瘡頭烏壓黑四畔有泡將起如赤粟米忌灸燥食炙燻等物

六曰爛疔其形狀色少黑有白斑瘡中有膿水大小如匙面忌熱食爛臭之物

七曰三十六疔其狀頭烏浮起形如烏頭四畔起火赤今日生明日生二  
后日生三及至十若滿三十六則茶所不療如米滿者可療俗名黑龜  
忌噴喜愁恨

八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮々浮生形如小豆狀如蛇眼躰大硬忌  
眼人見之及嫉妒人看之

九曰鹽膚疔其形聖面遍瘡皆赤有黑粟起忌鹹食

十曰水洗疔其形大如錢形或如錢孔大瘡頭白裡黑壓黑汁出中硬  
忌飲漿洗渡河

十一曰浮沔疔其形如浮沔瘡躰曲圓少許不合長潤挾如韭菔肉  
黃外黑曲處刺之不痛裏黃處刺痛

仁  
十三曰午拘疔其狀肉飽起指不破

醫學入門所引和劑方亦就千金方論中十三種之目別致龜  
泉疔魚刺之名狀云龜泉疔亦曰虎鬚疔初起疔瘡次發  
寒熱頭痛甚要心乾吐腮項共腫最此疔忌灸不魚疔瘡  
頭黑深形如魚脰破之黃水湧出此疔浮將其毒尤甚

十四曰赤亦說種之名狀證治準繩云疔瘡其形如疔蓋以扶名又

言脾疔生唇眉疔生眉鬚疔生鬚魚骨疔生眼角外顴骨疔

生顴骨上亦名志面疔生角色白頂陷如錢孔耳疔生耳中亦名黑

疔連腮赤腫鼻疔生鼻內鼻如大瓶黑色者不治頰疔生面頰骨高

處氣疔形如氣泡怒感而生腐疔色白者瘡三日之內頂陷狀如茶瘡

鬼疔中陰邪之毒因生瓜藤疔延蔓無數蓋膚疔四辺皆赤有近粟粒  
羊疔形長而白色豬疔形圓而也瘡口內無油狗疔赤色而長驢馬疔  
其形三角頂上黑點疔生胛中暗疔生兩腋下無頭疔手背骨節  
之間生之菜萁疔中凹凹突起疔走疔不定偏身疼痛不可轉側黃  
疔亮齒色黃手足麻木涎出不語死櫻桃疔形如櫻桃蛇頭疔生指頭  
兩傍形如蛇頭甚腥穢紫黑色痛引心潰爛脫落足面疔形如粟米  
痒極微骨

又曰或疫死或中穢氣或蝕於剝割牛馬猪羊之氣潛向身冷遍身  
但生紫泡或忽然惡寒吐逆肩臂麻木心搖痒遂發胸膈自不覺知  
但有一泡之類此疔毒也急灸泡處至熱可用荊防敗毒散古人所謂暴死

保

多是疔毒用燈可見偏身若小瘡紫泡有異於常者即是灸其  
瘡胸腋温者可救陳實切說灸於五經之疔及紅系疔

外科正宗云如毒氣發於心經者為火疔其患多生唇口手掌指前  
間其發初生一点紅黃小泡搖動痒痛非常左右四体麻木重則寒熱交  
作頭暈眼花心煩死躁言詭昏憤等出於神經病也毒氣發於肝

經者生為紫燕疔其患多生手足腰脇筋骨之間初生便作紫泡次

日破流血水三日后串筋爛骨疼痛若楚重則眼紅目翳指甲純青

名強神昏睡詭驚惕此等出於肝經之病也毒氣發脾經者生為

黃鼓疔其初發生黃泡光亮明潤色紅色纏繞其患初生口

角腮顴眼胞上下及大陽正面之處發之便作疔痒急硬強重則惡

疑心字之行

心吐肢體本痛寒熱交作煩渴乾噦此等出於脾經之病也毒氣  
發於肺經者生為白丹疔其發初白泡頂硬根突破流脂水痒痛驟  
然易腐易陷重則損咽焦毛聳肌<sub>此</sub>咳吐膿痰鼻煽氣急此等出  
於肺經之病也毒氣出於腎經者生為黑腐疔其患多生耳  
竅胸腋腰腎偏僻軟肉之間其發初生黑班紫泡毒  
串皮膚漸攻肌肉頑破如針痛徹骨髓重則手足青紫驚悸沉  
困軟陷孔深且透<sub>睛</sub>靈此等出於腎經之病也以上五疔相應五臟又  
紅絲疔起於手掌節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手臍令人  
及作寒熱

其他王素外臺秘要宋醫官院聖惠方及和劑方聖濟總錄許

邊

疑說字

寂微本事方陳無擇三因方楊氏家藏方朱氏家藏方陳氏外科精  
要楊氏直指方嚴氏濟生方張氏儒門要親真氏萬病回春及壽  
世保元等論之其脫<sub>及</sub>不過上四氏之論而或<sub>亦</sub>精焉<sub>其</sub>四氏之論  
亦其的確詳明者僅數十中之八九其中或有其論可聽而其方不  
可取者其方可取而其論不可聽者矣尚<sub>且</sub>曰<sub>氏</sub>中穢氣或觸<sub>及</sub>督<sub>心</sub>  
之論則全其<sub>之</sub>妙而非疔也蓋<sub>疔</sub>之為患荒暴迅速其形狀或有<sub>于</sub>疔相  
似者人由于其以相感焉郭石陶<sub>疔</sub>脹王<sub>衝</sub>讀<sub>疔</sub>混<sub>亦</sub>本<sub>邪</sub>植<sub>本</sub>頭<sub>行</sub>亦  
好說<sub>疔</sub>云<sub>疔</sub>者即<sub>疔</sub>也何<sub>不</sub>精<sub>之</sub>甚也夫<sub>疔</sub>之起也天地間濁氣之氣射  
人之取根基而變態<sub>種</sub>然<sub>疔</sub>者自<sub>疔</sub>也<sub>疔</sub>者自<sub>疔</sub>也故<sub>為</sub>其<sub>治</sub>亦<sub>疔</sub>  
之治疔者自有疔之治唯其放血同之亦<sub>疔</sub>偏見血而已疔漸待膿而

脫者自有  
疔字

已是亦其異也、豈混濁以之我若瘵之相溷誤以痲擊疔以可攻按則  
上攻昏沈出暴百端或卒死或不死漸至終不得為完人而已、又不可畏哉、  
是吾不得默而不辨也若其治方亦並載而錄于左、諸子量之、家以子味

家方十卷  
敗毒散

疔瘡初發寒熱頭痛主之

柴胡 桔梗 川芎 櫻茄 荊芥 防風 連堯

茯苓 生姜 甘草

右十味以水二合煎取一合或加大黃、連黃芩

黃連解毒湯 疔瘡入心內熱口乾煩悶恍惚脉實者

本方中加連堯甘草大力子 各半分

右七味以水二合煮取一合服

登

護心散 疔瘡內攻口乾煩躁惡心嘔吐者

綠豆 乳香 硃砂 甘草 各五分

右但極末每服二錢白湯調服早晚二度

沈香解毒湯 治諸疔瘡

霍香 連堯 沈香 黃連 黃芩 木通 防風 櫻茄 各五分

右八味以水二合煮取一合服口傳曰堯于左者加独活堯于右者加羌  
活此湯類可用焉若魚象人棄之諸醫放手頗可用此湯

三四十貼而見瘡頭膿出則生不然則死但此湯將飲促服是以急症  
也凡疔瘡頭膿上則生色黑赤而瘡頭乾者惡

凡疔瘡毒赤尽流注於遍身腿脚結腫塵塊疼痛者作此膠加

木附湯頻以令服之或兼以紫丹攻之毒尚未盡腫塊不散者必成大膿治之宜流注膿后之法焉

賽命丹 一號求童奪命丹 治癰疽癰背疔瘡乳癰便毒一切無名腫

物及小兒疳疔皆與之奏回生之效若夫不癰起者即癰之不痛楚者即痛楚昏即醒痛者即不痛嘔吐者即止膿氣未成者消之已成者即潰之實是可謂瘍療第一之方耳

蟾蛛 雄黃丹 卷血竭 乳香 沒藥 各三錢 蜈蚣 射香 各五分

細辛 全蝎 蟬退 穿山甲 白姜 礬石 牙皂 各六錢 白凡疔

脛 各五分 朱砂 三錢 可兒字

右為手端疔日用酒糊丸綠豆大每服三服用葱酒一小鐘吞下被震

知

發汗或吐或不刺再進一丸服后喫白粥調理忌黃瓜木茹一切動風之物

應用方

蟾蛛丸 或作錠用之

拔疔膏

破敵 各蝨期 右合貼

南星 巴豆 鼠屎 各五分 右為膏貼瘡上

拔疔方 又方 四邊貼青蛇有腫熱痛貼中黃可

三物擊疔丸 疔毒熱劇而可下者

巴豆 四錢 甘遂 代赭石 各八錢

右三果為丸每服二分或三分白湯送下用紫丸亦可

疔瘡辨名終

利 鹿城先生三本附辨

桂木附之辨

楊梅瘡ノ初起疱瘡ノ様ニ生スル桂木附ニ七寶丸ヲ用テハ色々ノ変症  
起ル也又桂木附ヲ用ヒ脱スル者アリ結毒ハ所在ヲ定メテ毒滯ニ故ニ或  
ハ口眼喎斜或ハ手足不遂或ハ骨節疼痛其變計リ難シ桂木附  
ニ消毒ヲ兼用スヘシ

癭瘤ノ條内ニ寒熱脚軟痛スルニ甚シ或ハ脚氣トシ又風濕トス其  
中ニ膝頭大ニ腫レ屈伸スルニ能ハス然レテ手ニ按ヒハナリ能ク見ルハ膝頭  
ノ節ハツクナル也如何トナレハ膝ノ間ニ痛出来ル故ニ膝頭拔ルニ是骨痛  
ナリ即チ桂木附七寶兼用

楊梅瘡ノ條附子ハ凡テ古キ深キ者ニ用ルナリ都テ初ニ用ユハ返テ  
害ニナル者ナリ薰方杯モ初中ハ同シナリ  
多骨疽肉煉セル者固本養榮湯桂木附ニ消毒丸兼用シ瘡后  
敗血流注シタルハ散リ難シ通經導滯湯桂木附ニテ効ヲ得タリ左毛潰  
右ハ莖飯劑ナリ

附骨疽膿ニテラ又前ニ七宝丸竜門丸桂木附ヲ用ユハ斂リ易シ鶴膝丸  
胴内外大ニ腫虎ノ咬カ如ク痛寒熱ニ次才ニ股ニ及ヒ肉脫スルナリ桂木附  
七宝丸ノ萎瞑眩セテ様ニ長用スヘシ

癩疾ハ痛ナシ桂木附黃鐘消毒丸或ハ五星化毒生々乳ノ萎兼用ス淺キ  
者ハ防通ニ時々竜門ヲカケテ効アリ凍風毎年患ル者アリ桂木附ヲ早ク

又

用ユヘシ

梅毒ニテ聾耳ノ如ク丸者アリ初ハ蟬鳴ヲ為セ膿汁ハ余リ多ハ出ヌ  
者ナリ必頭痛頭眩ヲ兼ヌ辛夷清涼欠山午湯効ナキ者ハ桂木附靈  
天蓋ノ應鐘丸兼用或消毒丸化毒ヲ用ヒ五宝丹ニテ治ス症モアリ凡ソ  
結毒諸症數年治シ難ク或ハ骨節疼痛或ハ羊身不遂等ノ病ヲ為  
ス者ハ葛根木附症ニ從ヒ選用スヘシ七宝梅肉兼用モ亦可ニ結毒外障  
内治ハ桂木附ニ甘草芍黃ヲ兼ヌ

舌上舌根諸症舌垣ノ類腐潰スル者ハ桂木附ニ甘草兼用ス破傷  
凡ノ症ニハ葛根木附選用桃花ヲ兼用スヘシ  
上齧瘡附骨疽ハ鼻口ヨリ瘡裏面腫痛スル者數月ナル者外術

ヲ施シ桂木附選用且甘录ノ類兼用スヘシ

蜈蚣串ハ桂木附ニ粉劑ヲ兼用ス治スルナリ寒熱アル者ニ附劑應キテ  
ルナリ脱ル者ハ莖飯劑ナリ

金瘡家気血不遂ニテリ麻痺ノ屈伸ニ難キハ症木附ヲ与フヘシ

血脱スル者ハ附劑ヲ忌ムヘシ

葛木附之辨

瘡腫少ク汗ヲ取テ后ハ<sup>治</sup>陽虛實ニ抱ラス葛木附ニ白州散ヲ兼  
用スヘシ

疔腫身熱煩渴スル者ハ大青竜奪命丹或ハテリヤカヲ瘡  
頭ニ塗ル此処ニ葛木附ニ七宝丸兼用シ四日ニシテ死タリ

流

梅毒ハ初起内治ハ葛木附或ハ土骨皮湯

癰瘰腫ニテク難キハ葛木附ニ白州或七寶ヲ兼用スヘシ平劑ハ新  
旧ヲ分タス速堯湯ヲ用ユヘシ

梅毒欲癢者先登汗スヘシ敷加遺糧葛根加将又葛木附ヲ可用跡

ハ端的ヲ兼用ス又木通湯ヲ用ユヘシ又<sup>一</sup>等深キ者ハ葛木附ヲ用ユ

ヘシ然レ毒皮膚ニ有ル者ハ宜カラス又<sup>一</sup>等深ク頭面瘡ヲ成者五宝丹

兼劑用テ可ク

骨槽風ニ柴胡加石或ハ正宗ノ逍遙散<sup>一</sup>等腐深キ清阳散火湯中

和湯葛木附選用消毒モ兼スルナリ

破傷風ハ流注ノ所左ヲ緩シ腫物ト成ル者アリ胸膈ハ迫リ自汗出

毒

者ハ必ス苑スルノ症ハ葛木附ニ紫丸ヲ兼用スヘシ  
 癰腫初起増寒増熱アル時ヨリ頰ノ潰膿ニ至ル迄葛木附ヲ与テ煩燥  
 ノ形アラズ大青竜湯ヲ以テ汗ヲ取ルヘシ  
 紅絲疔初痛痒甚者葛木附ヲ与テ紫丸ヲ兼テ以テ下利ヲ得ヘシ  
 慢喉風ハ舛ハ鼈甲湯或葛木附ヲ与テハハ緊喉風初其大患所ヲ刺舛  
 廣鼈甲湯雄黃蜀椒或ハ葛木附ヲ与テハ兼用桔梗白散ニ吐下セシ  
 ヘシ口時毒初頭痛患凡等ノ者葛根湯ヲ与テハ温覆ノ大汗スヘシ  
 后ハ葛根加將大宜ニ痛者葛木附ヲ用ヒ紫丸ヲ以テ下スヘシ  
 胸骨ニ塊有テ皮色不色石ノ如キニ硬膏ヲ貼シヨリ経テ葛木附ヲ与テ  
 次日変シ紅色ニテリ疼ヲ覺ハ漸々ト起テ膿ヲ出タス

変

遠

流注初起寒熱スル者陰陽ヲ辨セ葛木附白州或ハ壞液散凡毒ヲ兼ル  
 腫物ハ冥ク白煎法ニ蚊蟻膏ヲ施シ潰后アボス紐ヲ入ルベシリヲ貼シ葛木附ニ白  
 州兼用潰后宜ニ從ヒ葛根加桔梗更襍膿ノ毒ヲ用ユ  
 乳瘡項背強急寒熱スル者葛根木附ヲ用テ汗ヲ發ス潰后痛止又痛甚  
 者膿久ク及ミサレニテレメニテリナラ貼シ葛木附ヲ与テ潰后ハ襍膿湯ヲ与テ寒  
 熱不止者ハ葛根加桔梗ヲ用テ膿水スシ不尽者ハ大黃牡丹湯ニ宜シ  
 乳岩ハ至テ治シ難治務テ(シキウタ)膏ヲ貼スヘシ葛木附(シキウタ)兼用  
 ス猶治セサルモハ其塊ヲ取ルヘシ

乳裂ハ糸ヲ以テ結ヒ葛木附ニ甘草兼用メ良効アリ下疳瘡雞冠ノ如ク  
 細長大狀ヲ為ス者ハ腐壞シ落ツ解毒劑宜ニ痛甚ニキ者葛根木附

下疳以下  
系可提書

便毒一系  
又可提書曰

或或黃症三隨ニ梅肉七宝應鐘等ヲ兼用スヘシ

囊下疳内疳瘡發熱者鮮毒劑三箇ニ痛甚ニキ者ハ葛木附ヲ与ハ紫丸

ヲ以下ス。便毒熱増盛ニ頑硬ヲナス者ハ葛木附ニ鹿茸白洲之兼用

ス若クハ梅肉ヲ以下スヘシ潰后ハ大黃牡丹皮湯ニ箇ニ

囊瘻腐爛シ類ロヲ附ス者ハ桂木附或ハ葛木附ニ百洲散兼用后ハ委

牡丹皮湯更日不收者或ハ委ロヲ為ス者ハ葛木附加桔更大黃七宝丸兼用

懸瘻初起諸症有テ暫ク消散セズ膿ヲナス者アホスヲ貼ス内服ハ葛木附或

ハ鮮毒ニ乳没ヲ加ハ梅肉甘录ノ類ヲ兼用殿背瘻潰后腐爛メ疼者ハ洗革

ヲ与フ初ハ葛木附ニ箇ニ膿皮下ニ在テ不潰者ハ大黃牡丹皮湯ニ百洲散兼用

梅毒段々治来リ腐ヌク或痛ニキ者葛木附ニ百洲散ヲ兼用シ類ニ紫丸

醫瘻の上

⑦ 四指散里三百也

加 ⑧ 以下スヘシ

諸毒雜症数年治セズ骨節疼痛或ハ半身不遂等ノ症アリ瘡キ者葛

木附類ニ七宝丸梅肉ヲ兼用スヘシ毫膿汁ヲ出シ若クハ骨ヲ脱シ或皮色変

シテ鼻梁ヲケイル等ハニ葉葉ヲ施シ内服葛木附ニ五宝丹ヲ丹ニ附牙疔ヲ

支者ハ硫黃粉ヲ點シ内葛根加桔更ヲ用ユ

結毒灼痛ヲナシ或骨膜ニク附骨疽ナリ如此委ハ葛木附ニ蟾蜍梅肉ヲ

兼又消毒瘡大抵七早鮮毒甘录丸四周腫ル者ハ刺テ后ヲリウニ貼シ内鮮

毒劑ニ用テ痛者葛木附ニ箇ニ瘰癧大依内葛木附ニ甘录丸或ハ化毒丸

丸兼用スヘシ 兼用穿眼瘻ハ大抵葛木附ニ甘录丸

癩輕症ハ刺血葛木附ニ甘录丸兼用

七

腦漏六事

木

翻花瘡、葛木附或ハ七葉解毒五宝甘露ノ類症隨テ用ニ取瘡、葛木附  
或葛根加桔更大黃ヲ用ニシ

骨槽凡散ニ欲ハ葛木附ニ七宝ヲ兼用時ク梅肉ヲ以テ下スニ腦漏ハ葛

木附ニ甘露兼用

傷

外襲者ハ破傷凡ハ輕症者ハ瓜蒌桂支湯重者葛根湯破傷濕ノ創

ハ葛木附桃花兼用。○甲疽ハ葛木附ヲ用ユ

蘭唇ハ葛木附ニ甘露ヲ類選用スニ

合口毒ハ葛木附ヲ用ヒ紫丸ニテ攻ム

臙瘡ハ浮萍加大黃或ハ葛木附ヲ用ヒ兼テ鷄子ヲ食セム

蜈蚣串ハ葛木附ヲ用ユ

瘰

重舌ノ類ハ賴血ノ七葉解毒葛木附姜ニ梅肉ヲ兼用スベシ

臭田螺葛木附ニ感享丸七宝丸宜ニ從フ

午程寒痛強者ハ葛木附ニ言ヒシ。○田螺泡ハ葛木附ニ紅花藍汁ヲ加用ユ

陰毒ハ大黃牡丹皮湯或葛根木附ノ姜ニ宜シ

越木附之辨

疔愈テ后日久ク痕ナク遍身定ラス或腿脚ニ流注ノ腫塊ヲ生ス

尤モ赤ク腫レシテ紫黑色ヲナス考ルニ本患先ニ瘡癩必黒色ヲ

疼痛スル者ナリ越木附附ニ紫丸兼用或ハ桃花姜ニテ是ヲ下

附骨疽漏ニ成テハ洗スニ瘡新キ者ハ洗スカラス新キ者ヲ洗ハ浮

腫杯出テ害ヲ考スニ又破傷ノ如クナリ反テ腐リ廣クル者甚キ時ハ

田螺の上

又



越木附ヲ用ユヘシ口流注初ノ発熱スル者ハ越木附ヲ用ユ  
 痔毒ノ条内ニ頭瘡白屑凡ヲ患ヒ瘡口凡寒ニ龍衣ワル者有リ破傷  
 湿ト見テ越婢湯ヲ用テ不効ハ大頭瘟ナリ  
 附骨疔初起漫腫ノ大疼痛スル者ハ烏頭湯ニ紫丸兼用痲瘡疔狀  
 ナル者越木附ヲ用ユヘシ口膿窠瘡腫アル者越木附ヲ用ユヘシ  
 漆瘡内攻シタル者防通或ハ化班解或ハ越木附ノ類合見用ユ風火傷ニ  
 毛越木附ヲ用ユ見痘凡瘡越木杯用ヒ時々紫丸ニ下ヘシ

鹿城先生三木附附辨終

禮

金創口授

目錄

全創治範

全可備置具

全治術

全惡候

全一方八処

止血之方

頭創

面創

眼胞創

耳創

鼻創

咽喉創

胸膈創

藏腑創

納腸術

舌創

及血經

突創

箭創

鉄炮創

筋創

全膏方

放平術

缺唇治術

縫法圖

整骨法

金創方品

活穴

卷木綿可尺

目錄終

人多用ル言蓋家  
ニテハ廣東人ム  
不用ノ補ノ効ナ  
シト虫厄誤ニ  
元來廣東人ハ  
物産家ニテモ  
少シ誤居ル  
廣東ト称ス  
ル者ハ思フニモ  
根ニモハ血分ニ  
渡ルル此ノ効テ  
出血スル処ハ賜  
見ルニ能血止  
痘瘡ハ脫血産  
后杯モ血液ヲ  
補フテ廣東  
ニシクハ故ニ金  
創ニ用テ効アリ  
ヲカ家ニハ多ク  
調榮ヲ家方ト有  
ル是ヲ三貼調合  
メ用ヘ尺ス昔ヨ  
ハハルサヨクハ

小疵ヲ大疵ト云テ咎ヲ蒙ラス医モアリ此処能念ヲ可ヘテ其各付ハ大低左  
ノ如シ此度何町何丘衛手ニ疵ヲ蒙リ候ニ付御療治御頼申上候右療  
治中如何様ノ異変有之候共少モ甲分無御座ル為後日及如作右ノ体  
テ其役人ノ印形ヲ取ル之若シ儉便来ラサル前治療スハ疵ノ大少淺深且ツ何  
ケ処ト云テ委細改メ各付ニ牧ハ役人ニ渡シ牧ハ自身懐中ニ療治ニカルヘシ  
若シ儉便来テ何故治療セシト云ハ其中ハ出血モ及ク大患故治療遅延  
ニ及テ変ラ出シ益ハ公儀ヲ勞ニ奉ラシコラ恐レ檢使ヲ待ス治ヲ施シタリ  
疵処改メナハ糸目扱可申ヤト云ハシテ人ニ丸人返ハ扱ニ不及ト云テ更故ナリ  
濟者ニ如是大患ハ格別ノ更其他ト処スル程ニテモ無キ疵ナラバ儉便ニ對  
シテ九タケ輕キ様ニ執成置クニ相手ニ方ノ思入モケカコト大ニ悅フコト

渡ル稀ニ故ニ金創油ヲ用テ何ニシテモ時宜ニ隨フヘシ或御子曲ヲ用ルルモアリ  
金創ニ三日終タル  
ハ創口禰肉 曾  
ノ如ク脹ル  
燒酒ニ洗ヒ温  
ムレハ和ク者ニ手  
引加減ハ上カニテ  
ル

治範

儲ニカケノ大法ハ患者ノ室ニ入ル前ニ氣ヲ丹田扱メ先ツ手負ノ次第ヲ尚ヒ  
疵ノ數幾ケ処ト定メ又医来テニ療セ子ハ去ヌテモアリ其節ハ傍人ノ伶利  
ナルヲ招キ手傳ヲ取置クニ先人々調榮湯杯ヲ煎用セシム又氣引入テ  
来ル様ノ為回生ニ生神ニナトヲ備テカルベシ蘆合香丹延齡丹等ハ機  
發多ク尾手負ハ不用儲ニ道具ヲ失念ナキ様櫛へ置クニ禰具ニ尚  
盆カ抗敷様ノ者ニ紙ヲシキ道具ヲ並へ置クニ針ハタクサニ貯へ置ク  
ヘシ大低系一筋ニテ三針ヨリハ縫工又者ニ

木綿 卷木綿其処ハ尺有雜テ木綿酢木綿同ク置クニ晒薄木綿ヨシ  
縫糸 麻糸ヲニタニツニメ各二尺五寸程ツミ針ニツケ置ヘシ  
麻糸ヲ ヨクスコキ節ニキ様ニスヘシ

肉厚キ処ハ六セテ  
中ニ針位三ハ  
ヨリ又者ニシテ  
リニセ椽ハハ  
應シ先ツ大抵  
セテラキ其高  
縫テ直申ラシ  
ヨリヨリ者ニ深キ  
疵ハ五分程モ  
テヌウハシト  
ラヌトテモツ  
ト膿ヲモツ者  
縫テテ后創口ハ  
ルサハ金創口油  
ヲ塗リ創口  
子油ヲヌル腫痛  
ノ患ヲフセク  
縫テ后尚出血不  
止者ハ雞子白  
和シ木綿ニ捲  
貼ス

縫終テ患者痛ヲ覺  
ハ五日ニ至リテモ  
痛<sup>ハ</sup>甚キハ是縫  
ヤウ不正ニ肉<sup>痛</sup>  
創者ツリタル  
ニ偏ト肉ノ縫目  
ニ無理キ様縫  
ハカクスレハ不痛  
ニ  
王子木綿ト酢木  
綿ト一枚ハサニ  
ル<sup>ア</sup>アサ家  
ニテハセヌ  
枕木綿ハ三重  
ニス或ハ血ニ添  
タルモ裁テアル  
ハ血ノ所ナレハ  
束テヨ

金創肉厚処動搖ハ臍分肉ニケヌヤウニ糸ヲトクスヘシ  
ウスキハ糸ヲホリセ子ハケルヲ得  
椰子油<sup>今不用</sup> 金創油<sup>或ハバルサン</sup> 燒酎<sup>底深キ燒酎ハカクサロトル四分近ヨハ燒酒</sup>  
若無キトハ清白ニテ 右ノ品傍ニ備置クヘシ又血ツ燒酎酢雞卵ヲ入峇也  
ヨリエカニラウリスルナリ

夫ヨリ燒酎温冷ヲ計ルテ緊要ニ熱スルハ肉セテ死肉トナリ冷テ凡  
濕患アリ故ニ不熱不寒俗ニ云手引加減ニスヘシ燒酎ヲ手引加減ニカ  
綿布ニ浸シ疵品切ヨリ徐々ニ洗ヒ指ニ木綿ヲ巻キ疵ノ中ニ入ラ無キ椽ニ  
能ク瘀血ヲ洗ヒ去量<sup>ル</sup>シカ<sup>ル</sup>常ノ木綿ヲ用ルニ倍<sup>ハ</sup>内ノ瘀血燒酎等  
ヲス。ホイトニテ能ク吸ヒ取ルニ燒酎熱ニ過ヒハ肉ハセルニ兔角心ヲ落付テ  
丁寧ニ洗フシ洗内ニ出血ニテ不止<sup>ア</sup>リ指ニテ<sup>カ</sup>ト押止ムヘシ他家ニテハ擦  
ヌハ燒金杯アテル<sup>ク</sup>有<sup>レ</sup>ヒ甚要<sup>ナ</sup>シ后必ス膿ヲ催ス<sup>ル</sup>若血止ラヌハ直ニ可縫縫

法口傳先ツ疵直中ヲ縫ヒ又正中ト疵端ト正中ヲ縫ヒ夫ヨリ次第二間ハ  
リニ縫ヘシ大低針ノ間アラク縫テ五分細キハ三分位ニ見合スヘシ余リ細キ  
ハ氣カシク<sup>ラ</sup>又故ニ腐ル者ニ五分位宛ニ縫ヘシ余ニ雞子白ヲ引モ<sup>シ</sup>ス津液ヲ  
塗ルモ<sup>レ</sup>行余<sup>ノ</sup>疵<sup>ハ</sup>何<sup>レ</sup>ヲ入ルニ五分以上ハ疵ハニサ<sup>ル</sup>或ハ<sup>ハ</sup>半<sup>モ</sup>入<sup>ル</sup>ハ  
突或ハ雞子黄ヲ交ルモ善ニ倍肉ノ厚キ処ハカ<sup>ハ</sup>六<sup>ハ</sup>歩<sup>モ</sup>カ<sup>ケ</sup>縫<sup>フ</sup>ヘシ淺キ処ハ二歩  
許ニテヨシ縫テ后創口<sup>ハ</sup>四<sup>ハ</sup>辺<sup>ニ</sup>六<sup>ハ</sup>口<sup>ヲ</sup>サ<sup>リ</sup>ト<sup>ル</sup>椰子油<sup>ノ</sup>類ヲ塗ルハ<sup>ハ</sup>腫<sup>サ</sup>ル<sup>ナ</sup>手<sup>ヲ</sup>當  
ニ創口ニバルサン<sup>或ハ</sup>金創油ヲスルヘシ次ニ王子木綿ニ枚重テ貼ス雞子ハ疵  
淺ケルハ白ヲ用ヒ疵深ケルハ黄ヲ用ルニ其<sup>レ</sup>ヨリ酢木綿ニ枚重子置<sup>ニ</sup>又其上  
ヨリ<sup>テ</sup>ス<sup>ニ</sup>ス<sup>イ</sup>ブ<sup>ニ</sup>ラ<sup>シ</sup>蓋<sup>ヒ</sup>貼<sup>ス</sup>ヲ<sup>ハ</sup>ニ番<sup>ヲ</sup>用<sup>ヒ</sup>貼<sup>ス</sup>或ハ先鋒ヲ貼ス此方第  
凡氣ヲ防ク為目ツ<sup>テ</sup>糸<sup>ヲ</sup>ケ<sup>ル</sup>カ<sup>ク</sup>サ<sup>ル</sup>ヲ知<sup>ル</sup>為<sup>シ</sup>四<sup>日</sup>目<sup>ヨ</sup>ツ膏<sup>ニ</sup>カ<sup>ル</sup>故<sup>キ</sup>

針油

針油

可

今ハ糸ニ津液  
ヲヌルニタマフ不  
用

針ニ油ノ付糸  
ハキニシテアシヨ  
ク扱ヒ去ルハ  
血ノニシムニハ血勝  
ヲ交セ貼スルハ

針ニ油ノ付糸  
ハキニシテアシヨ  
ク扱ヒ去ルハ  
血ノニシムニハ血勝  
ヲ交セ貼スルハ

用意之扱其津マケルハ疵ノマワリゾシホク汗ホノ様ニツブクトナリマケサルカマケ  
ハ能知ルシ羔ニマケルハ白雲ニ交勝ヲ交ヘ貼ス此ニモマケル者ハ紫雲ニ交勝ヲ  
交ヘ貼ス膏ニマケルハ何レ愈ハ遲キニラタ羔ハ酢木綿ヨリ余程大ニメ不動ホ  
トニスヘ次ニ枕木綿ヲ置是ハ木綿ノ動サル為之其上法ノ如ク巻木綿メ  
動揺セサル様ニ能或調護護也世異日焼耐ヲ温浸シ徐々ニ重ツ  
木綿ヲキ取ルヘ手荒クスハツニナルテ取ルニ尤下ノ重ハ其俛置テ能  
ク伺ヘシ其木綿血ニ滲テアラハ其俛殘シ置キ其ヨリ前日ク如ク木綿ヲ  
ハルヘシ安ニ手荒ク木メシラハ六再出血ニテ止ニ難キトアリ若シ血染ルナカ  
ハ取去テ佳ニ夫ヨリ三四日之間ハ始如ク至子木綿ニ枚前ノ如クスヘシ四日  
ヨリ木綿委皆取去リ羔ヲ貼ス是ハ則創全愈ニ羔ヲ五日或七日后

繻

最

縫タル糸ヲ毛引ニテ試ニ動シ見ルハ糸固クニマリ有ルハ肉十分ニイタ合ガルト  
知ルハ糸元ニ有ルハ肉愈付タルト知ルハ肉接ニタル状ヲ見定ハ見合テ可  
ミ糸ヲ切扱クヘシ矢張羔ヲ貼スヘ取一針ツ間ヲ隔テヌクヘシ一度ニ殘  
テス扱クシカラス手荒クスハ出血スルトアリ創内膿氣アリ者ハ縫ヲ斷  
ク如ク其ヘ膿尽ニタラハ縫ヲ止ヘシ膿尽ニテ后水アル者ハ水氣ツキル迄其  
ヘシアマリ深々ヌヘカラス

凡縫ハ攻補アリ世医サセヨキ搽ニ患ニ無法ニテス故創口愈ニト欲スレモ  
是為ニ不愈ニ補ハ深クサス少シヒイテ置ク此ニ左突雞子黄杯場  
攻尙フニ突アテサニテ置是ハ破敵杯ノ行トヨナリ

金創惡候

直視上竄創口乾燥 面赤如狂譫語 反張欠喘此症危篤  
額上生汗復不通氣多 面赤目黃下利或自利唇失色寒戰交  
身強直 吐噦 脉浮大数及沈屋或弱

右ノ症ヲ見ス者ハ不治心得シ

一少ハ所ノ創

兩手脉所尺沢 結喉 耳下動脈 會陰 乳下動脈 天庭

鳩尾 兩膝頭又ハコウズ子ト云傳受ハ此又ナク少

又別ニハ所

足阴明經及氣多血所故出血多キ所之 大阳兩穴即左右顙顱

足大阳動脈腎脉之衝脉所脩 章門穴 阳股動脈カラスナド

合縫ノ処

奈

子ツキスナト夕所謂顙骨与后項骨合縫ノ処 へルナト夕所謂顙骨与前項骨合縫ノ処

右何レモ急所ニナケルニ創ヲ得ル者ハ命ヲ失スルヲ無ト虽尾神經及  
動血脉布蔓スル処故危難上可心得ルヲ苑生ヲ誠ルニ重便ヲ夕ニ  
度共ニ吐スル者ハ死スニ度受ル者ハ生ク

〇

頭ニ如此ニツク合目アリ前ヲ顙ト云子ツキスナト夕是也 儲血ヲ止ルト古來種々

茶アレ洗スヘキ処ハ止血茶ヲ用難シ是ハ術ニテ自止血ハ両方ヨリ出ル者アラ

何レクテ来ル方ヨリ出ル者ニ先血出ル脉道ヲ左手ニテ按住シ右手ニテ

法ノ如ク洗ヒ手早ク脉道ノ傍ニ歩計去テ縫フヘシ針又イサスハ肉ニツク

ト合テ血止著シ血出ル脉ヲ按メ止ラサハ脉道ノ下肉ヲカケテ指ニテ押上ル  
道ヲ塞ク様ニ縫ヘシ燒金杯ヲ用ユハ后腐ヲ生シ若又前ノ如クスルト虽尾

廿

出血不止糸ヲ切ステ縫直スヘシ糸ヲ少シ筋違ニ絡脈ノ下カケ絡ヲ括ル様ニ  
ヘシ必止者之ヲ深キ脉道ハ唯上<sup>カ</sup>ヘヒツタリト縫<sup>キ</sup>内合テ自然止者之筋違  
ト縫ニ誤テ絡ヲ刺ス<sup>テ</sup>無シ必刺ロヨリ再出血スル者之少シ深ク縫ヘシ傳ナ  
ラテハ筆ニ反シ難シ指ヲ切リ落シタルハ又血ス血管ヲ縫ハ止ルニ黄散  
ヲ用テ能功ヲ奏ス指半切テ不落者血不止者之夫ハ冷水ニ暫クツクハ云  
ナリ此出血勢ニ有故水不入湿スルハ愈ニ欲スル中ニアレ之金創家ニ服  
黄色ヲ見ス者ハ脱血ノ徵ナリ

頭ハ神圣ノ本源ニ又是ヨリ一身へ廻ラス此ノ人身中主タルノ心臓ヨリ  
重シ胎<sup>ハ</sup>赤子モ先ツ頭ヨリ成ル者之頭ニ神圣ノ筋ニアリ脊骨ニ至

良

リ分テ六十有リ前ニモ云如ク頭ニツノ合目アリ此合目ニ楨リタル  
疵ハ必ス死ノ症ナリ都テ頭腦ヲ包皮ニ有皮膚層内薄皮薄  
英ニ投ナリ上皮ヲトラトマ<sup>ア</sup>タテト云ヒ下皮ハヒイセ<sup>ア</sup>ラト云ヒ  
アマタラト肉トノ間モイヌシト云者アリ所神圣ニコレニ疵付タル大功之  
疵浅クメ鉢ヲ包<sup>セ</sup>右薄皮ニアタラスメ皮膚層内汗リ切タルハ瘡治  
メ生ヲ可得勿論<sup>ハ</sup>撲指傷又ハ右之合目ヨリニ三歩モ去タ

膜

得都テ身内何処モ肉ト骨トノ間白膜ヲセ<sup>ス</sup>ント云者ハ白蟻ヲキ  
タル撽ナル者ニテ子ハキ者之倍又頭骨亦ハ<sup>ハ</sup>ミレハ<sup>マ</sup>マ<sup>マ</sup>ト云  
ニテ引上<sup>テ</sup>アレ是ハ引上ズノ佳ニテマ<sup>ミ</sup>ト云ハ<sup>ミ</sup>ツ目<sup>ノ</sup>錐ノ如キ者之夫ヲ

ゼイヌシ油皮腦  
ト云

骨へモミ引先く夫ニテハ腦ニ瘀物入テ至テ患シマハリ夫ナリニ法ノ如ク  
片ハ長肉ノ碎ケニ骨ハ自然ト腐リ定ルニ候ニ此ニ抜去ルヘカラス血  
者ト自ラ定ルヲ待テ取ルヘシ

頭ノ骨ニカリン創ハ麻油ノ入ル膏ヲ禁ステ申ステイヲ貼スヘシ但シ  
浅疵ノ者ハ麻油ノ蒸若シカテス

木石ニアタリ破レタル者ハ法ノ如ク縫ヒ瘉スニ破サル者ハ歩撲法ヲ以  
可治腫痛甚者ハ毛ヲ切り去リイニグエントヒクマヲ付シ能痛ヲ止  
ル膏ニ兼テ保生湯ヲ用ユ今ハ和經湯ヲ与或ハ神中湯ヲ用ヒカナルニ蒸  
ズベシ右法ニテ痛不止者ハローサワトルヲ塗其上テニスウテ付ヘシ若  
ニテモ不止イテエントスツテリトニ或ホツホリコシ善ニ尚腫痛不止患寒

発熱ノ高腫ニ溜ノ如ク丸ノ極テゼイコト骨トノ間ニ瘀物滞リタルニ  
談ニ細管ヲ以テ前齒ニテ咬シメサセ管ノ先ヲ指ニテ彈キ見ルニ瘀物  
アル者ハ痛所ニ徹シ忍難キ者ニ或膏藥得テ咬キラセ見ルヘシ得テ咬  
キラヌ者ニ此ハ刺テ瘀物ヲ抜去ルヘシ然シ急処ヲサケテ刺ヘシ若ヌ其  
終捨置ハ瘀物腦ニ入り耳ナトヨリ膿汁出テ死スル者ニ都テ頭骨破  
レ有ル者ハ如前ノ談ムヘシ

面創

面創ハ元テ針目近ク縫ヘシ痕ツカヌ為ニサハトテ余リ近キニ過ハズ膿  
ヲ催スニ又眼胞肉薄キトコノ隨分シワノヨヲヌ様ニ縫フヘシ又油ノタル蒸  
ヲ忌ム其他酢燒酎ヲ用  
○眼中ニ入リテ劇痛シ府内ルテアル故ニ牙ハ缺唇

ノ法ニ隨ヒ無名異麒麟血ヲ雞子白ニ煉リ貼ス眼ノ疵ニテモ兩眼生ヲ  
ヒ可置<sup>遊来ヲ點ス</sup>兩方内ニ通シル者ニ<sup>眼疵ニ移リテ</sup>雙眼明<sup>失名下有</sup>又玉ヘカリシ  
疵ハ目ヲ少モ動スヘカラス神水出ル者ハ失明スルニ至テハ疵大ハ失明  
セサルニ至ル者ハ多ク膿ハ片ハ必ス失明ス点茶ノ外治方ナシ神水ハ澄々  
ル水之

耳創

耳ノ疵ハ唯常ノ如クニ縫テハ縫目齟齬スルニ外側ヲ針堅ニ縫ス  
シテニテ后ハ常ノ如ク縫シ傷處后ニカス

鼻創

鼻ノ創ハ正面ヲ切り兩傍ニ及フ者ハ先ツ正面ヲ縫テ后兩傍ヲ縫  
シ三針ナレトギニ通シアトニテツ宛結ブヘシ總テ面部ノ疵ハ凡々

字

ケ皺シヨラス様ニ縫ヘシ

咽喉創

咽喉ノ疵ハ氣道ヲ切ハ速ニ死ス前ノ喉上云后ヲ咽ト云食道ヲ切ルハ  
間々タスカルナリ結喉ヨリ上ハ多ハ不若氣食緒喉ヨリ下ハ甚ニ<sup>ケ</sup>  
敷ニ兩傍五分皆テアル疵不<sup>レ</sup>死者ニ

都テ此辺ノ疵ハ皮ヲ撮ミアゲ少シヒ子リテ縫ヘシ口授ニ血氣道ニ不<sup>レ</sup>  
ハ神氣氣昏胃脉忽々絶ス如是中<sup>急ニ膈下ノ治法ヲ行ヘシ瘡</sup>治ヲ用テ  
固生スヘシ能クツ付テ治ニ温ヘシ

金瘡口授ニ終

テアルツオフゲ子ノスヘール

曆數一千七百三十七年 鏤板我安永六年丁酉之文化十年迄三十七年

啗蘭大医ヨアア子スアウキユス々々スユニスル著

### 救溺論

前取余凍死ヲ救フノ法ヲ論著セシカ如ク溺死ヲ救モ又如何ニ生  
蘇セシメントスル也今此篇ニ於テ僅ニ獨示スル所ノ論說マサニ能ク  
相並ヒ應セシトヌ溺死人ハ則溢死人ト同ク氣息ヲ努散シテ死  
スルヲ明ナリ何ハ則其腸中或ハ腹中ニ水ヲ停留セシ者ヲ見タ  
ルヲナシ但彼水中ニ墮落シ天ニ敬馬駛スルヲ以テ空氣ヲ肺臟中吸  
收スルノ最モ深ク且ツ水中而ニ氣管甚ニク塞ニスルヲ以テ呼吸ノ道

墮

井

ヲ閉塞ス故ニ水中ヨリ援出スル所ノ溺者毎ク胸膈膨脹ニ腹突出シ  
タルナリ其氣息ヲ復ヒ肺臟中ヨリ出セハ膨脹突出シテ胸腹更  
ニ復スル也此理ヲ推テ其溺死者心藏皮心ニ血液ノ運動歇止スル起因  
并ニ弱死者ハ僅ニ刺戟衝動ニテ活機ノ動ヲ再ニ得セシメテ其閉  
塞スル氣息ヲ後開舒開セシムルハ再ヒ呼吸ニ復蘇スキ所以ヲ  
知ヘシ此理ヲ令得ニテ右之法ヲ施サバ假令ニ三時又人ニ因テハ日ニモ  
徑過シタル者ト云ヒ亦悉ク救助スベシ既ニ二日或ハ其奈モ徑久溺  
死人ヲ此法ニ因テ生活シタル明白ナル實談ハ疑ニキ他ノ說ヲ奉テ三  
加ヘズト云ヘヒ甚多シテニロクト書名ト同ヘクソニハアレキサニヘキニイ  
クテニスハサクニス等及ヒ其他ノ諸書ニ就テ之ヲ搜索スベシ

○溺死ラ回生スル真個人療術ハ唯胸膈中ニ歌止スル氣息ヲニ緩  
潤シ以テ生命ノキヲ再ニ故ニ復セシムルニ有リ

○先ツ最初該ニ施ス諸術アリ即其患者ヲ仰臥セシメ少ク其  
頭ヲ低クシ下腹ニ温暖ノ綿布ヲ置クカ或手ヲ以テ其ヲ摩擦直  
ツ徐々ニ其胸膈ニ向テ撫按ニテガヲ押ベシ又吐ラ催ニ為ニ油ヲ燒キタル  
羽毛或ハ其他ノ法ヲ以テ咽喉ヲ刺觸スベシ然ルハ氣管再ヒ緩  
開スル下ヲ得ル也

法

○是等ノ術ヲ施ス一或ハ半時モ為レ止スト虫ニ身註曰半時ノ間此方ヲ  
施シメ縫ニ其効ヲ得ルノ數  
ヲ施スベシ這ノ術人如キハ少シモ危殆ナキトハ近世能ク人知ル所ナラハテツレ

按スルニトロイカ  
ルノ説ハイステ  
ルニアリ

ノ

カ術最モ簡便ナリ其法ハ導水管ニ穿母貝ニ其管ハ氣管ニ止唯  
其針ノミヲ拔去スヘシ如此スルトキハ氣息然トノ胸中ヨ発スルナリ此管  
ニロラ当テ吹キ且吸フテ肺ヲ縮張セシムルト四五次ナレバ猶救スベキ  
者ナレハ忽チ心臓搏動ヲ起シ遂ニ大息ノ呼吸スルヲ得ルナリコト  
ルリニキ各及ヒトストル上ハ他ノ諸術ヲ止テ先且最初ニ此術ヲ施ス  
良ニト云此法ヲ施シテ後僅ニテモ生活スベキノ標的ヲ有ラセバ直ニ又  
他ノ生機ヲ復サシム方法ヲモ施スベキト尤緊要ナリ

○此生機ヲ助ケ復セシムルノ方法ハ或ハ温暖綿布ヲ以テ其身體  
ヲ繞縛シ或ハスウエイド地人カコレニ帯ニ用ル法ノ如ク温暖ナルト  
榻サシメ或ハ各日ナラハ温メタル衣衾或ハ綿布ヲ以テ縛扎シカ

目

温タル鑊器銅壺麥ヲ足心脰間及腋下ニ挾ニ或ハ漸次ニ遍躰ヲ  
 不同ナク温暖ニシヌ催曉葉 未詳ヲ鼻中ニ插ニ或ハ患者服スルヲ能  
 セハ吐劑ヲ用ニ或ハ倉道及ニ咽喉ヲ肉瘻ニ或ハ其躰ヲ遍置ニ動搖  
 或ハ野菊花煎湯及ニ此他ノ心臍ヲ強仕ニスル羊汁ヲ用ニ  
 ニステヌ各ヲニテ及ヨリトマンノ諸症ハ許多ノ溺死ニ此野菊花  
 ノ煎汁ヲヨク強收ニ且温暖スルノ腸鏡法ヲ用テ救助セリコレハ常  
 ニ必用セスニハアルベカラサル処ノ要法ニシメ尊崇スベキモノナルカ故ニ須ク  
 務テ之ヲ施与スヘキ已

○萬國歴史第十四卷中ニ云ク亞墨利加國ニ於テ野人等ハ溺死者  
 ヲ回生スルニ肛門ヨリ烟草ノ烟ヲ腸中ニ吹収ストナリ此方ハ前ニ云ス

黄

気管穿貫法ト同位ニ置ベキ良術ナリ即当テハルイヌヲニスノ  
 外科トトマス各ハツス他ニ於テ人溺婦ヲ療スルヲ見タリ其人古  
 昔ノ置逆ニ因循ニ腹内必ス水ヲ停タルヲニテ其溺婦ヲ倒  
 懸ニタリ時ニ烟草ヲ嚙サカテ来ル士ナリ是ヲ見テ誓テ曰  
 予是ヲ速ニ瘡治セト即己カ含ム處之烟官ヲ溺婦ノ肛門中ニ  
 穿入シ其火門ヲロニ含テ満リ烟ヲ腸中吹入セルト身五段  
 ニ至ルトキ腸中雷鳴ヲ發シ而シ患婦其ヨリ水ヲ吐出シ須更  
 ニ回生セントナリ假令此婦ハ水中ニ在ルト多取テラズ速ニ援出セ  
 シニモセヨ又彼ヨトシ各カ吹烟腸鏡法ハ著ク効ヲ見スト云ニ  
 ニモセヨ既ニ此野人カ用ル処ノ事ハ今此條ニ記スル處ノ症徴アルハ

予モ亦此烟ヲ吹ノ法及ヒ氣管ヲ穿貫スルノ術ハ他諸法ヨリハ遙ニ  
勝リト思フナリ即此吹烟ヨリ催発スル処ノ効ハ腸中ヲ載シ從テ  
能ク收斂シ及ヒ下腸ノ諸筋胃膈膜ニ連及シテ腸ノ運動ヲ起  
ス等皆呼吸ヲ復起スルノ因トナル故ニ胸膈ヲ緩開シタル後愈  
能ク呼吸ヲ故ニ復セシムルナリ此術ノ如キハ少シモ危殆ナキモ大ニ  
忽諸ニテ棄擲スルコト勿レ

○頻年我カ符ニ於テ溺死之モノ多キハ人皆知ル処也毎是  
ヲ速ニ求得テ務テ援救スヘシ大躰ハコシ少シモ生命標的ナレ皆  
人救助ノ法ヲ施ス者ナレモ溺者水中ニ在リテ面肢ヨリ及ビカ  
サル者救助ノ法ヲ施サシテ直ニ埋葬セバ真ニ是レ已覺スヲ以テ

久

人ニ對スルテ能ワサル者ナリ何者前ニ記スルカ如キ者ヲ再ニ生  
活セシムヘキノ諸法アルニ由テナリ尚其實ノ如キハ未タ腐敗標  
的ニテキ弱者ハ洞視微疵之竊理者及ヒ特達ノ各医不  
ラズルハ少シト思ハルニ

明治癸酉年

初冬而写之求

百忍堂

疥瘡并名略

大野良三郎





