

心小腸部

醫學綱目

自十九
至二十九

十一

醫學綱目卷之十九

癰疽所發部分名狀不同

疔瘡 石癰

諸腫 癰癰附馬 結核 癭瘤 偷鍼

天蛇頭代指 甲疽嵌甲 乳癰乳巖

囊癰陰頭癰 便毒 貼骨癰 內癰有

三 肺癰腸癰胃脘癰

五臟身有五部伏兔一腓二腓者腦也背三五臟膂四

項五此五部有癰疽者死寒熱病為王海藏云腦鬚髮

不可患癰疽者七處 眼後虛處 頤接骨處 陰根

根上毛間胛與尻骨接處 耳門前後車骨接處 諸因

小腹風水所成癰疽 頷骨下近耳後虛處 鼻骨中並

能害人但以諸法療之或有得瘡唯眼後虛處最險 正

腦上一處起為腦癰及腦疽腦鑱並在大椎骨上入髮際

通診癰疽要言部分

腦癰宜急破

生腦癰皮起易得破穴急破急出膿不害腦疽皮厚難得破穴須急發內毒使破穴方可

腦鑠難愈

腦鑠一處初起如橫木掘上起頂門下止大椎發腫如火燒其色青黑如靴皮大硬不見膿即損外皮如犬咬去肉之跡難愈錄式約切

髮髮防漏

左右鬢兩處癰疽初起如虫咬癢疼痛腫不赤紅難見膿汁是為鬢發此亦危篤之患既損破多為漏瘡

左右髮際起如粟米頭白肉赤熱痛如錐刺此疾婦人患

多丈夫患少始因風濕上攻髮際亦宜出膿無傷

左額右額發赤疽不拘大小狀如桃李急宜藥貼破見膿

無害右額角一處發毒疽及惡癬為近太陽穴如腫滿太

陽即成虛損為近穴而難消不可破如破後傷外風水即

能害人亦宜用藥潰膿後速斂合瘡口如經冬月即成冷

額及太陽發疽慎風水

瘡緣此處近太陽穴上至額角都為險處

左右太陽穴或發疽癰及癰五七日不潰毒氣流入眼眶

攻眼眼合不開用藥貼破破後慎外風水所入即損其睛

疔損眼臉而成大疾

左右眉稜兩處發為發眉不拘在頭尾宜速未穴已前攻

擊在眉頭即攻入眼損睛在眉後即攻入太陽並宜戒慎

鼻下一處人中兩處為發髭此多因摘髭外入風而結攻

作不常寒熱相併此亦害人

下頤一處發為發頤肥人多有此疾恐手搔傷而發腫

左右牙又骨接處發癰疽處腫脹攻骨及牙關張口不得

因諸風熱上攻或多食燒灸之物所為或因患牙癰即從

牙縫中破出膿血切忌外風水觸犯

垂臂兩處發接骨不臂驚上起如鷄鴨卵大皆由榮衛不

發眉處攻眼與太陽發髭

發頤

牙又發忌風水

臂射發慮筋卒

調所為也喜患實處而不透內亦宜急消或發穴早療
兩臂肘起在接骨下引手至小骨之上發癰癩此處雖實
奈連大小筋骨舉動不便垂手多墜疼如膿深沉徹骨即
傷筋脈拳縮不舒搗撮宜急以緩慢筋脈藥餌治之
兩手背發癰疽初生如水刺無頭腦頑然滿手背腫滿後
聚毒成瘡深入至骨而為發手背此屬五種皆發毒之類
也

發手背

發筋處
內攻

兩肋起疽名為發肋初腫盛至十數日不穴攻即腫大如
杯碗高如鍬背痛徹內腸絞刺左邊患應右邊痛右邊患
應左邊痛唯有此處多是內毒却入攻而死者多人有斯
患急以針刺出膿血則免內攻傷內矣
三里發
三里兩處起癰疽初發如牛眼睛青黑便五七日破穴出
黑血汁膿腫攻腸肚連腿裏拘急冷疼此因傷筋氣勞力

三里發

所成宜用湯藥注射去其外毒自平息矣

接骨
上發處
損筋

兩脚接骨近上膀肚下一處起丹疽如胡桃大硬如物打
搯之狀不苦疼但腫急脹慮其損筋亦須早出膿毒可保
平安也

脚心發
毒淺可
治深不
可治

兩脚心發徹骨者不治如脚心微皮破不至深發膿不多
者可治 癰發雖重不至損人但世人不曉醫治自至危
殆耳

上焦宜
用解利
藥處傷
風水

上焦發癰為陽是壅塞實候宜解利溫涼湯藥去其積熱
上攻外即貼消毒逼腫藥如已結定即用發穴藥候穴破
出其膿毒腫平方貼生肉等藥然後歛合瘡口亦慮外傷
風水勿食發風熱醬麪毒物等忌房事

中焦宜
用暖內
藥防內
攻

中焦發癰至腰上一節前後心不定所在皆是滯滯候亦
乘虛而作不拘大小前起心雄尾者最要緊近兩腋是虛

處兩脇肋下至臍上及臍下兩傍一二寸發癰填氣伏硬
難潰膿為此等處偏難發穴穴後難合瘡口並須先用煖
內藥服後用熱藥貼令軟和慢慢破穴不得急破急破即
朝夕出膿不住緩慢破穴即一頓出膿易為將息後心者
唯有十一椎脾俞下十四椎上為腎俞腎俞下為腰俞兩
處起癰者防毒氣內攻為此處皆是至虛處凡有癰起先
須補內氣令實方可放破內氣實則不內攻且易得潰唯
腰俞兩處多成漏疾預防節慾則免矣

下焦宜用和平

下焦發為流注虛損候前陰股兩處起如鷄卵大長橫摺
內初起腫核結塊後四畔浮腫相併伏硬色青黑先用和
平內藥服三五日後用發穴散及發藥令軟即穴穴後其
瘡口即隨摺子內作長瘡瘡口破宜急用抽毒膏出膿膿
盡便貼合瘡口藥為此處無肉可壞更不須長肉也

便毒防漏

腿腫兩處起為便毒跨下兩醫尖下大道前穀小道後
成懸癰皆是虛極人患此癰近穀道左右亦名痔癰宜急
補脾臟及發處貼藥即用發穴散破後用抽膿膏膿盡用
合瘡口散合之慎勿過冬即成冷漏難治

兩垂珠兩曲膝防漏

垂珠左右兩處起癰為騙馬墜初起大小不定此處微實
皮肉薄紋緊口亦難合瘡初起宜以消散藥貼令內消此
處亦易成漏瘡唯宜消散之硬即恐緩慢難為功矣又云
交膈一處近稜線上亦為騙馬墜防漏騙馬墜是也
兩曲膝膈肚下內外兩踝前有廉刃兩邊為裏外廉上結
癰腫此處近骨難瘥宜用收毒散外貼四畔中心即用活
血肉藥貼無害

下至兩脚心發癰癰沉深不治如微似皮薄易破者猶可
也 凡有癰腫皆屬六腑有疾

癰發於噎中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不瀉塞咽
半日死其化為膿者瀉則合豕膏冷食三日而已 發於
頸者名曰天疽其癰大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋
前傷任脈肉薰肝肺薰肝肺十餘日而死矣 俱出瘡疽
篇下同
消百脈疽腫起環頸項疼痛身體大熱不敢動止怕怕不
能食此有大畏恐駭上氣咳嗽其發引耳不可以腫十五
日可刺導引不刺導引見血八十日必死 土龍疽發背
起胃俞及腎俞大發寒熱十數日大汗展頸引身盡熱如
沸不穴二十日死九日可刺不刺其上下亦黑若膿青黑
者死血膿者不死

陽氣大發消腦溜項名曰腦爍其色不樂腦項痛如刺
以針煩心者死不可治

疽赤色疽發頭額及腦前并手掌中十日不穴者死七日

可刺出赤血七日未有膿不可治 不穴者不作穴
而東攻西擊也 疔疽

發鬚鬚及兩耳不穴十五日死可刺其膿色黑如豆豉或

見血者死 黑疽發大椎骨上連兩夾脊上七日可刺導

引為癰疽出膿不可止吐碎骨身痒後痛者此故傷寒氣

入臟腑發為食疽也九日可刺導引之不刺不導引十一

日死

發於肩及臑名曰疵癰其狀赤黑急治之此令人汗出

至足不害五臟癰發四五日逆熯之 癰疽篇○
此當入瘡

消丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發成疔疽五日

腫大令人口噤寒戰十二日可刺不治二十日死 陳乾

疽腫發起兩肩及兩大臂連胛骨二七日痛不息亦不可

動五十日身熱不赤六十日可刺刺之無血者死

靈發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎

疔之塗以豕膏六日已勿裹之其癰堅而不潰者為馬刀
挾癭急治之

消內疔疽發兩腋下及臂并兩手掌中振寒熱血噎乾飲
多即嘔煩心忪脗脈盛六七八日診如此可汗不汗死

靈發於胸名曰井疽其狀如大莖三四日起不早治下入
腹不治七日死矣 發於膺名曰甘疽色青其狀如穀實

瓜蘇常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十歲死死後出
膿 發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀大

癰膿其中乃有生肉大如赤小莖治之剉蔞菟草根各一
升以水一斗六升煮之竭為取三升即強飲厚衣坐於釜

上令汗至足已疔疾宜切○甲乙經於赤小莖下
作治之蔞菟草赤松根各一升
消使熒疽腫起發肋及兩肩肘頭二十日不穴死九日可
刺發赤白相間膿多可治全無赤白者不治 蜂疽發髀

背起心俞及心包絡俞若肩髃二十日不穴死十日可刺
其色赤黑膿清者不治 特疽發肺俞及肝俞不穴二十

日死八日可刺其色紅赤內隱起如椒子者死 陰陽二
氣疽廣濶滿背或大或小不常腫熱脹大十日可刺導引

出膿不拘深淺多少發渴體倦十日外不見膿不治 筋
疽發夾脊兩邊大筋上其色蒼八日可刺有癢在肥腸中

九十日死 衝疽發小腹疼痛而振寒熱四日脗脗五日
變色可刺不刺即導引出膿毒不治五十餘日死

靈發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死
矣治見經
虛條

消湧泉疽腫起發太陰如伏鼠二十日不穴死十日可刺
發清膿赤黑者死白者可治太陰尻尾
前是也

靈發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變色癰腫內薄於骨

發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變色癰腫內薄於骨

不急治三十日死矣股脛劉消于作股陽發於股陰名曰赤施不

急治六十日死在兩股之內不治十日死

消陰疽發腿髀及陰股始發腰強數飲不能多七日發堅

腫脹惡疼心煩躁死不治

靈發於膝名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石石

之者死須其柔乃石之者生堅如石者用生樟陸根擦之則効諸癰疽

之發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於陰

者三十日死陽謂諸節之背陰謂諸節之脘却發於脛

名曰兔齧其狀如赤莖至骨急治之不急治害人也發

於內踝名曰走緩其狀癰色不變數石其輪而止其寒熱

不死發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之百日

死發於足傍名曰厲癰其狀不大初從小指發急治去

之其狀黑者不可消輒益不治百日死發於足指名曰

脫癰其狀赤黑者死不治不赤黑者不死治之不哀急斬

之否則死矣

瘡腫敦疽發兩足指五日不穴死四日可刺其色發黑癰

丹琥珀膏

歸鬚

細辛

草麻子

獨活

川芎

皂角

木鱉子

川椒

黃芪稍

升麻

芍藥

藜蘆

蜂房

甘草稍

白斂

防風稍

枸杞子	芎藭	降真香	官桂
瓜蒌	蘇木	白芷	杏仁
黃連	槐枝 <small>已上各一兩</small>	琥珀	沉香
木香	丁香	藿香	零零香
雲母石	乳香	雄黃	硃砂
安息香	甘松 <small>已上各三錢半</small>	輕粉	麝香 <small>各一錢</small>
髮灰 <small>五錢</small>	白礬 <small>枯一兩已上十味為極細末</small>	羊腎脂 <small>四兩</small>	
蟾酥 <small>二兩</small>	香油 <small>四斤</small>	黃丹	

右先以前十六味剉槌碎用水五升文武火熬至二升半去查再用水五升又熬至二升半去查與前汁一處慢火煎用槐枝不住手攪成膏用磁器盛頓起將後琥珀等十六味研為極細末用帛包起於前膏內下淨羊脂四兩真酥二兩同膏入香油內攪令勻以文武火熬

膏內水盡用昏燃點油燒不爆為度漸入黃丹以二兩五錢重為一次仍用槐枝不住手攪滴水中不散軟硬得所如軟添黃丹如硬添油再上火熬却入前藥細末五兩微煎數沸用磁器盛貯如用於紙上攤之量瘡口大小專治五發惡瘡疔腫癰癤遠年冷疔痔漏一切無名惡瘡蛇傷蝎螫大吹並皆治之

疔瘡

也
 疔瘡皆生四肢發黃痂中或紫黑必先痒後痛先寒後熱也
 表裏
 羅丙午歲予居藁城人多患疔瘡縣尹董公謂予曰今歲患疔瘡者極多貧民無力醫治近於史侯處得數方用之者無不效官給藥錢君當捨手治之遂諾其語董公榜示通衢命予施藥如此一年全活甚眾其用保生錠子千金

托裏散神聖膏藥破棺丹凡四方

保生錠子治疔瘡背疽癰瘰一切惡瘡

金脚信二錢

雄黃三錢

輕粉二錢

硃砂三錢

麝香一錢

巴豆四十九粒

另研文火炮生用尤妙

加蟾酥一錢

右為細末用黃蠟五錢溶開將藥和成錠子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開每用一餅次用神聖膏後用托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹世傳疔瘡必有一條紅線可針紅線所至之處出毒血然後傳藥

神聖膏藥治一切惡瘡

當歸

藁本各半兩

沒藥

乳香各二錢

白芨

琥珀各二錢半

黃丹二兩

白膠香三兩

黃蠟二兩

粉霜一錢

木鱉子五十箇

巴豆十五粒

清油

槐柳枝各一百二十枝

膽礬一錢

右件一處先將槐柳枝下在油內熬焦取出復下餘藥熬勿至焦濾出却將油澄清下黃丹再熬成膏用緋帛攤之立有神効

托裏散治一切發背疔瘡

黃芪一兩半

厚朴二兩

川芎

防風

桔梗各二兩

白芷一兩

連翹二兩二錢

芍藥

官桂

甘草節

人參各兩

木香

沒藥

乳香

當歸各半兩

右為細末每服三錢酒一大盞煎二三沸和查溫服

破棺丹治瘡腫一切風熱

大黃二兩半生半熟 甘草 芒硝各一兩 右為細末煉蜜丸如彈子每服半丸食後溫酒化下或

方數貼雜

童溺半盞研化之忌冷水

濟 金砂散取疔瘡

道人頭微炒存性一兩即蒼耳子

硃砂半錢

雄黃三錢

蟾酥以多為妙

右將瘡四圍刺破以少油調藥末置於瘡內緋帛封之

數日疔自出如瘡入腹嘔逆者將蒼耳搗汁飲之但用方

綱砂雄黃等分研細用蜜調先破瘡頭去血入藥豈大在瘡口內紙花隨之亦効

無 蒼耳散治一切疔腫神効用蒼耳草根莖苗子但取一

色便可用燒灰存性研細用好米醋米泔澄淀和如泥隨

瘡大小塗上厚二分乾即易之不過十度即拔根出須針

破塗之更加雄黃尤妙

世 蒼耳與白梅研爛貼疔上拔去根

濟 蟾酥丹治疔瘡取蟾酥以白麩黃丹搜作劑九如麥粒

狀針破患處以一粒納之取蟾酥法用癩吧破眉核一以竹篦刮下然後插在

皆陰處自乾用之

新 苦苣搗汁傳疔瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調

傳本草云取苣苣莖中白汁傳疔腫出根又取汁滴瘡上立消

保 治疔用磁石為末苦酒和傳封之根出立瘥秘要

疔瘡用白蘞為末水調傳之聖惠

世 治疔瘡用麻內蛙虫一條研傳瘡上却用膏藥貼上一

飯時去膏藥其疔自出

治疔瘡最有功効用蟬蛻僵蚕為末酸醋調塗四圍留瘡

口俟根出稍長然後拔去再用藥塗瘡海藏方單用僵蚕

為末津調塗亦佳

保 治疔瘡奪命散

烏頭尖

附子底

蝎稍

雌黃

雄黃各一錢 蜈蚣兩一 礞砂 粉霜

輕粉各五分 砒二錢半 腦子少許 麝香少許

右為細末先破瘡出惡血以草杖頭用帛帶藥末插入口內以深為度

日本三藏傳疔瘡方江子肉十粒半夏一大顆研末附子半枚羌螂一枚各為末四味臭麝香也相和看瘡大小以帛繩子圍瘡口以藥泥上又用絹帛貼傳時換新藥以可為度此方活人甚多

聖治疔瘡甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金方同

丹琥珀膏方見癰疽雜方條 又方用鍼刀斫破疔頭以蟾酥傳之後用野菊花

莎草根 甜菜葉 搗細以無灰酒盡量調服之酒醒疔化水即痛定如熱除不必去疔亦自愈也

托裏維方世治疔瘡

獨脚茅 防風 細辛 甘草節

白僵蚕 青皮 黃連 羌活

獨活 蟬腿 赤芍藥各等分

右咬咀每服五錢先將一服加澤蘭葉少許薑一兩同搗爛熱酒和服然後酒水各半薑薑三片煎服此方神

無治十三種疔皆以此法治之 以緋帛一片裹藥取匝為限先用亂髮鷄子大攤布帛

上牛黃如桐子大又以棘刺針二十一枚赤小豈七粒為末並布髮上捲緋綿作團外以髮作繩十字縛之置

熨斗中急火烧灰研細以枸杞或子或根皮枝葉隨得為末用枸杞末二七緋帛灰一七共成三七研勻分二

既汗

服空心温酒調下

世奪命丹治疔瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥錢半

硃砂水飛三分

輕粉

枯礬

寒水石水飛各一錢

海羊二十箇研

銅綠一字

麝香半錢

右件為細末將海羊另研為泥和藥一處丸如菘荳大

如丸不就加好酒成之病輕者一九二九重者三九未

效再服服時嚼蔥白一大口極爛置手心放藥丸於蔥

內裹合以熱酒送下暖處臥取汗出為效忌米水

瑞返魂丹治十三種疔

硃砂

膽礬各一兩半

血竭

銅綠

蝸牛生用各一兩

雄黃

枯白礬各一兩

輕粉

沒藥

麝香少許

瘡毒又

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥為細末同研和丸如鷄頭大

每服一九令病人先嚼蔥白三寸吐在掌心將藥丸裹

在蔥白內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出

卽瘡如不能嚼蔥研爛裹下極效

治疔瘡毒氣入腹多嘔吐欲死者卽服內托香粉散滴乳

半兩另研真菘荳粉一兩為細末煎生甘草湯調三錢時

時飲之常令灌潤胸膈一方用雄黃菘荳粉乳香等分爲末水調服

世疔瘡入腹嘔者煎道人頭濃汁飲之

治疔瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁

蟬腿

貫仲各一兩

丁香

乳香各二錢

右為細末每服二錢空心温酒下

蒲公英狀但蒲公英開黃花地丁開紫花

紫花地丁麥熟時有之開紫花質甚脆如

瑞治疔危篤者二服即愈輕者一服立効

土蜂房

小窠全本草云土蜂房有毒利大小便

蛇蛻一條

右作一處器皿中盛用黃泥封固火煨存性研為細末每服一錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止其瘡已

化黃水矣仍服五聖散

大黃

兩

瓜蒌

皂角針二兩

甘草

兩

金銀花

兩

半右咬咀用好酒二升同煎至八分去查不拘時服

羅破棺丹

一方有當歸赤芍芍連超牡蠣金銀花紫花地丁宜選用之

山梔

兩

牽牛末

大黃各一兩

京三稜

炮各七錢

右煉蜜丸如彈子大酒化服之

世治疔瘡最驗用蒼耳臭牡丹各一大握搗爛新汲水或

順流水調服一碗瀉下黑水即愈

追毒丸

有寒者熱下之

海浮石

燒赤醋燂七次半兩

乳香

沒藥各一兩

巴豆

四十九粒

川烏

一兩

右為末醋糊丸如桐子大若患二三日服十丸五六日

服十四丸隨病上下服之先喫冷酒半盞或一盞又用

冷酒吞下如嘔吞之不妨出藥依上服之病人大便不

動再用三丸如疔看得端的爪破用頭垢留患處後服

藥

海肘後犯疔腫垂死菊花葉一握搗絞汁一升入口即活

此神驗亦用其根

丹溪云根莖葉花皆可紫梗者佳

疔腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞汁冷服一升日

三服甚驗

危困通治方

針灸

疔瘡於所屬經絡各瀉之 疔瘡者必發於手足之間生黃疱其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之際急宜以針於紅線所至處刺出毒血然後以蟾酥乳香膏等藥於正瘡上塗之針時以病者知痛出血為好否則紅線入腹攻心必致危困矣

治疔腫以針刺四畔用石榴皮末着瘡上調麩圍四畔灸痛為度調末傳上急裏經宿連根自出

診忌

禹錫患疔腫中風疼痛者爛驢馬糞熨瘡滿五十遍極効
無六曰麻子疔其狀肉上起頭大如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子及衣布并入麻田中行 二曰石疔其狀皮肉相連色如黑莖甚硬刺之不入肉內陰陰微痛忌瓦爍墼石之屬 三曰雄疔其狀炮頭黑靨四畔仰炮漿起有水出色黃大如錢孔形忌房事 四曰雌疔其狀瘡

頭稍黃向裏靨赤似灸瘡四面炮漿起心凹色赤大如錢孔忌房事 五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有炮漿起如赤粟米忌火灸爍 六曰爛疔其狀色稍黑有白癩瘡中潰潰有濃水流瘡形大小如匙面忌沸熱食爛帛物 七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑莖四畔起大赤色今日生一明日二後日三乃至十若滿三十六藥所不能治俗名黑炮忌噴怒畜積愁恨 八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮上浮生形如小莖狀似蛇眼大體硬忌惡眼看并嫉妬人見之及毒藥 九曰鹽膚疔其狀大如匙面四畔背赤有黑粟粒起大忌食鹹物 十曰水洗疔其狀大如錢形或如錢孔瘡頭白裏黑靨汁出中硬忌飲漿水水洗渡河 十一曰刀鎌疔其狀潤狹如薙葉大長一寸左側肉黑如燒爍忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以

藥治不可亂攻 十二曰浮濕疥其狀瘡體圓曲少許不合長而狹如殭葉大肉黃外黑黑處刺不痛黃處刺則痛
十三曰牛拘疔其狀肉胞起插不破

此十三種初發必先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子疔一種始末唯痒所最忌者不得觸犯犯即難治其浮瀝疔牛拘疔兩種無忌縱不治亦不殺人欲知犯觸但看脊強瘡痛極甚不可忍者是犯禁也炮步

石癰

治石癰如石不治腫者生商陸根搗擦之燥則易之取軟為度仲癰未潰以苦苣白汁滴之立潰本草云亦出疔根

保木香散治瘡難消不能作膿通不止酒調下三錢方見

諸腫

卒腫起大痛羌菁根大者杵之和苦酒如泥煮三沸帛上包之葛氏風毒腫三年苦酒濃煎蔥白以布包慰腫上

治一切熱毒腫商陸根和鹽少許傳之日再易孫治一切毒腫疼痛不可忍者搗草麻仁傳之立瘥

治腫蒺藜子一升炒黃杵細以香油和如泥再炒令焦以舊布如腫之大小攤之貼腫上勿開頭搗上外臺

治惡刺及狐狸刺毒腫取蒲公英草根白汁傳之多塗立瘥余七月十五日夜左手中指背措着庭木痛不可忍

十日後瘡日深漸高大痛欲死用此而安孫患熱腫水研山荳根濃汁塗乾再塗

臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴硝二升投湯中攪散掛北簷下俟硝滲出罐外却收之以人乳汁調半盞掃一

方

切風熱毒氣攻注目臉及發頭面四肢腫痛應手神効
腫毒或疼痛處以赤小豆為末水調傳頰換或用香白
芷水調傳尤妙 又方白芙蓉葉晒乾同皂角為末水調
傳

丹治諸處皮裏面痛何首烏末薑汁調膏以帛裹於痛處
用火灸皮鞋底熨之妙經驗方

療癰馬刀

結核連續者為癰癰形長如蛤者為馬刀

表裏交攻

羅曲陽縣劉禪師善治瘡瘍癰癰其効更捷授予四方太
乙膏玉燭散尅効散翠玉膏用之每每見効
太乙膏治癰子瘡神効

- 沒藥四錢 清油一斤 黃丹五兩 腦子研一錢
- 麝香三錢 輕粉 乳香各二錢

右以清油黃丹熬成膏用柳枝攪又用葱蔥七枝旋旋
加下蔥盡為度下火不住手攪至滴水不散却入沒乳
腦麝輕粉等味攪勻磁器內盛用

尅効散

- 斑猫四十九箇不去翅足炒 官桂半錢 粳米四十粒
- 赤小豆四十粒 硃砂半錢

右五味研為細末初服一字次服半錢次服三字又次
服四字煎樟柳根湯送下空心服以小便淋瀝併作瀉
為効惡心嘔吐黃水無妨其癰癰日日自消矣

玉燭散治癰癰自消和血通經

- 當歸 芍藥 大黃 甘草
- 熟地 芒硝 黃芩 川芎各等分

右為釐末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣

温服日進一服七八日効

翠玉膏

方見
廉瘡

內除
臟之本

楊氏家藏治瘰癧方

荆芥

翅足用
大米炒

白僵蚕

黑牽牛

各二錢

斑猫

二十八箇去頭

右為末臨臥時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時
又一服五更初却用温酒調藥一錢或二三錢量強弱
用服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第
三日五更初先進白糯米稀粥湯再進前藥一服更以
燈心湯下調琥珀末一錢重服以小便內利去惡毒為
愈如小便痛用青黛一錢以甘草湯調送下即止

嚴三聖丸治瘰癧

丁香

五粒

斑猫

十箇

麝香

一分

研錢

右為末用鹽豉五十粒湯浸研爛如泥和前藥令勻丸
如菴荳大每服五七丸食前温酒送下日進三服五七
日外覺小便淋瀝是藥之効或便下如青筋膜之狀是
病之根也忌濕麪毒食

保連翹湯

連翹

一斤

瞿麥

一斤

大黃

三兩

甘草

二兩

右剉每服一兩水二碗煎至一盞半早食後已時服在
項兩邊屬足少陽經服藥十餘日後可於臨泣穴灸二
七壯服藥不可住至五六十日方効一方加大黃木
通貝母一作知母各五兩雄黃七分檳榔半兩減甘草不用
同前藥為細末熟水調下三五錢

無必勝丸治瘰癧不以年深月近及腦後兩邊有小結塊
連復數箇兼勞瘵腹內有塊

鮑魚一箇去腸并子雄黃一粒雞子大礪砂一錢已上二味並入
于炭火燒蜈蚣一條蓬朮兩半梔子五箇
烟盡取出皂角二挺已上四味並燒存性草麻子五箇去皮
 黃明膠三文

右為末另用皂角二挺去皮搥碎以水三碗揉去滓煮
 精羊肉四兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研成
 膏和藥末丸如葉荳大硃砂為衣溫酒浸晨下十九一
 服至晚看肉疙瘡子若項有五箇則以五服藥取之視
 其所生多少以為服數既可更進數服

痛
 白花蛇酒浸軟去皮犀角鎊半黑牽牛半兩

炒半
 青皮兩

右為末每服二錢加膩粉半錢研勻五更糯米飲調下
 已時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌
 發風蘊熱物如已成瘡一月可効神驗

世
 小犀角丸常服除去根本截其源流應効如神諸癰並
 宜服之

犀角 青皮 陳皮各一兩 黑牽牛一兩
炒半 連翹兩半

右為細末用皂角二條去皮弦子炮搥以布絞取汁一
 碗許又用新薄荷二斤研取汁同熬成膏以前藥末為
 丸如桐子大每服三十九連翹煎湯食後服間以薄荷
 茶湯服

一婦人病癰癰延及胸臆皆成大瘡相連無好皮肉
 求戴人療之戴人曰火淫所勝治以鹹寒命以滄鹽吐之

外敷藥方

即一吐而着加次用涼膈散解毒湯等劑皮肉反復如初

世治瘰癧未破者如神百藥不應者累効

杏樹葉陰乾為末五分

萬年霜火煨為末二分半即人中白

蝙蝠火焙乾為末二分半

白花蛇燒為灰存性為末二分半

蜜蜂七箇焙為末

右將杏樹葉末用清水調却入前四件藥末調勻傳患處却將皮帛一片用針刺孔貼藥上如乾用清水就昏上刷之每一晝夜換藥一次如面上發熱服清涼飲子數貼其熱自退

敗散瘰癧方神効

白膠香

海螵蛸

降真香

用心無土氣者

右等分為末摻患處外以水帛掩之一夕而退

已破者

蜜蜂二十箇

蛇蛻七分半

蜈蚣二條端午前收者

右用香油四兩將前三藥入油內用文武火熬成入光粉二兩用葉枝七條如筋大者急攪候冷出火氣七晝夜方可用帛攤作膏貼患處已上二方得之於義門鄭氏累驗不須服藥貼上五

七日便消

貼瘰癧方用大烏頭五箇火炮五箇生用並去皮臍大

皂莢二條半以好米醋一鍾刷炙醋乾為度一半焙乾並去黑皮又用炒糯米一百六十粒同研末以好米醋於火上畧頓微煖傅貼患處入蜜少許尤佳 不問有頭無頭

大蟾五枚日乾細研酥調如麪日兩度貼之出聖惠方蟾一作蜘蛛

或破或不破項以下至胸前者皆治之用九真藤如雞

卵大洗生嚼常服之取葉搗覆瘡上數服即止出斗門方九真藤即

何首烏也

無蝸牛散治瘰癧潰與未潰皆可治

蝸牛不拘多少以竹簽穿瓦上晒乾燒存性

右為末入輕粉少許猪骨髓調用紙花量瘡大小貼之

一法以帶殼蝸牛七箇生用取去肉入丁香七枚於七

殼內燒存性與肉同研成膏用紙花貼之

項後側少陽經中疔瘡不辨肉色不問大小及月日深

遠或有赤硬腫痛用

生山藥塊 草麻子箇

右研勻攤貼之如神丹溪云山藥補陽氣生者能消腫硬經曰虛之所在邪必湊之留而

不去其病為實其腫硬之謂乎故其氣則留滯自不容不行

粉金散

黃栢等 草烏等 為末密調傳之

清涼散餅

山慈姑生 良薑等

右俱搗為餅去汁罨之能散去寒熱或以山慈姑磨

酒服大妙此藥大能散癰如神

東龍泉散塗癰

瓦粉 龍泉粉炒即磨刀石上粉也

廣茂 京三稜各半兩酒浸炒乾

右件同為極細末煎熱水調塗之用此去疾尤速

世治癰用鮑魚堯花燒灰存性水調傳 治鼠癰小嫩鼠

未出毛者焙乾蝙蝠糞小麥炒鬼箭根焙乾各為末和勻

油調傳乾再傳之

本治鼠癰瘰癧刺蝟皮瓦上炒右一味研為末加水銀粉

乾傳

廣治瘰癧經年不瘥者生玄參搗碎傳上日一易之

外科治瘰癧燒狼屎灰傳上
本治諸瘰疾

硃砂

砒霜

礞砂

馬牙硝各等分

右乳鉢內研細麪糊搜如香附子狀相瘡口大小作之
盡送入瘡口中恐腫時用薄葑研細塗之待收口却將
大栢皮白丁香並為末盡入孔中如邊不乾却用江子
去殼不拘多少用麻油煎令赤去火氣後去江子入蠟
合如膏看瘡口大小塗之及將白芨末水調塗上立効
治漏癧用蛇菰子不拘多少瓦上晒乾為末用紙燃蘸藥
入瘡口立効蛇菰子未詳
恐即慈菰子

又方用大田螺肉燒存性為末麝香少許濕則乾摻乾
則油調傳

虛實

脈人年五六十其脈浮大者痺俠背行苦腸鳴馬刀俠癭

者皆為勞得之

又治瘰癧

人參

白朮

當歸

陳皮

芍藥

川芎

香附

茯苓

半夏

甘草

右作一服薑二片以金銀藤煎湯一鍾半煎前藥食後

就吞絳宮丸五十粒

又方絳宮丸

大黃

山查

連翹

川芎

當歸

麥芽

桃仁

蘆薈

甘草

芸薹子

黃連

南星

海藻

升麻

羌活

桔梗

防風

白朮

黃芩

醫學綱目卷九

五

右用神麩糊為丸已破加人參一兩作膏用甘草節僵

蚕同煎
治頸上塊動者

夏枯草末六錢 甘草末一錢

右和勻每服一錢至二錢茶清調下食後

本言夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之功而經不言觀其能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取効此草三四月開花夏至邊便枯蓋稟純陽之氣得陰則枯耳世人不知故表而出之內瀉病本之法並見前表裏條

分經處治

東連翹散堅湯治耳下至缺盆或至肩上生瘡堅硬如石動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇或已流膿作瘡或未破並皆治之

當歸酒洗半兩 黃芩生半兩

柴胡根二錢 連翹兩半

黃芩七錢 甘草炙六錢

京三稜細剉半兩同廣茂酒洗一次微炒乾

右以一半為細末煉蜜為丸如棗葶大每服一百丸或

一百五十九一半咬咀每服半兩水一盞八分先浸半

日煎去渣熱服臨臥頭低脚高去枕而臥每口作十次

嚥留一口送下丸子服畢如常安臥

升陽調經湯治遠項下或至頰車生瘰癧此症出足陽明胃經中來也若其瘡深遠隱曲肉低是足少陰腎中來也是戊傳癸水夫傳妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸服亦得

升麻八錢

連翹兩半

葛根五錢

草龍膽酒炒半兩

桔梗兩半 細黃芩酒炒六錢 黃栢酒炒二次去皮七錢
 知母酒洗炒兩 廣茂酒洗炒一兩 甘草炙半兩 京三稜酒洗
廣茂炒五錢 黃連去鬚酒洗五錢 瓜萋根酒洗半兩 黃栢去皮酒炒半兩
 右秤一半作丸煉蜜為丸如菘荳大每服一百丸或一百五十九丸一半咬咀每服半兩若能食大便硬可旋加至七八錢止水二盞先浸半日煎至一盞去查熱服臥身脚在高處去枕頭噲一口作十次嚥之留一口在後送下丸子服藥畢臥如常此治法也
 散腫潰堅湯治馬刀瘡結硬如石在耳下至缺盆或至肩或至脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍下頰或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二瘡已破及流膿水並皆治之服藥多少臨病斟酌量病人飲食多少大便硬軟以意消息之

通治少陽陽明二經

柴胡稍四錢 升麻六錢 桔梗兩半 草龍膽酒炒半兩
 黃芩稍三錢 白芍藥二錢 連翹三錢 甘草根三錢
 當歸三錢 瓜萋根酒洗半兩 黃栢去皮酒炒半兩
 知母兩半 葛根二錢 黃連二錢 京三稜酒炒三錢
 廣茂酒炒三錢 昆布去土半兩
 右咬咀每服六錢或七錢水二盞先浸半日煎至一盞去查稍熱服於臥處伸脚在高處頭微低每噲一口作十次嚥至服畢依常安臥取藥在胸中停留故也另攢半料作細末煉蜜為丸如菘荳大每服一百丸此湯留一口送下更加海藻半兩炒食後量虛實加減多少服皆做此例
 救苦勝靈丹湯治馬刀挾癭者從耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中者乃手足少陽經之分野其瘰癧在於頰

下或至頰車者乃足陽明經之分野受心脾之邪而作也
今將二證合治之

黃芪 一錢 護皮毛實腠理及活血氣又人參 三分 補

氣短及不調 真漏蘆 半錢 勿以白 升麻 錢

葛根 半錢 此三味俱 甘草 半錢 能調中和

連翹 一錢 此一味乃十二經 諸藥為火益胃

牡丹皮 三分 去腸胃 當歸身 三分 生地黄 三分

熟地黃 三分 此三味諸經中 肉桂 二分 大

月倍之其味酸其氣寒能補中 散結聚如陰症瘡瘍少用之此寒因熱用之意又

柴胡 功同連翹如瘡不 黍粘子 三分 無

昆布 二分 味鹹若瘡堅硬甚 京三稜 炮 二

廣茂 三分 此二味滄堅硬甚 羌活

獨活 防風 各一錢 已上三味必關手足太陽

似按防風辛溫如瘡在膈上難無手足太陽

益智仁 二分 如唾多者胃不和也或吐沫

大麥芽 一錢 消食胃中寒者加之無則勿用

厚朴 薑製一錢 二分 黃栢 炒 三分 如有熱或腿

欲去衣者此腎中 伏火也 更宜加用

右共為細末湯浸蒸餅捏作餅子晒乾搗如米粒大每

服三錢白湯下 如氣不順加橘紅甚者加木香少許

量病人虛實消息之毋令藥多妨其飲食此治之大法

也 如止在陽明分者去柴胡黍粘子二味餘皆用之

如在少陽分為馬刀挾瘦法活漏蘆升麻葛根加瞿

麥三分 如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短促

者不可考其平素宜作氣盛而從病變治之權也加黃

濕痰

本治鼠癩瘰癧

芩黃連黃柏知母防已視邪氣在上中下而用之假令
 在上焦加黃芩半酒洗在中焦加黃連半生用在下焦加
 酒製黃柏知母防已之類選而用之 如大便不通而
 滋其邪盛者加酒製大黃以利之 如血燥而大便乾
 燥者加棗仁泥大黃 如風結燥不行者加麻仁大黃
 以潤之 如風澁而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽
 以利之 如脈澁覺身亦氣澁而大便不通者加郁李
 仁大黃以除風燥 如陰寒症為寒結秘而大便不通
 者以局方半硫丸或加炮附子乾薑前候米冷服之
 大抵用藥之法不惟瘡瘍一家凡諸疾病氣素怯弱者
 當去苦寒之劑多加人參黃芪甘草之類以瀉火而補
 元氣餘皆倣此

土附子簡

食鹽三

小便五

右三味同浸半月日取出將附子去黑皮陰乾為末用
 黑荳爛煮研為膏丸附子末如桐子大每服十九酒吞
 下早晚二服

雜方

初發頭項硬未破者其効如神牡礪四兩甘草二兩為

末每服一大錢食後嚙茶同點日二服半月除根物虞世

鹹炙

溪治世義大官一切丈夫婦人瘰癧經効牡礪用炭一

稱煨通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄

參三兩并搗羅為末以麪糊丸如桐子大早晚食後臨臥

各三十九酒下藥將盡瘰亦除根出經

治領下瘰癧如梅李大宜速消之海藻一斤酒一升漬

數日稍稍飲之

辛散

取蓼子微炒研為細末薄苧酒調二三錢服治瘰癧久

則効

酸收

世治瘰癧用夜合草遇夜則其葉閉合本草名合明俗名連錢母出禾田中貼水面生取其葉搗自然汁服之查盒患處効

甘緩

器中熬成膏子白湯化下一匙日三服紅者晒乾為末湯調服

聖治瘰癧腫硬疼痛年深時久不瘥用狸頭蹄骨酥炙黃搗羅為散每日空心粥飲調下一錢七

針灸

靈黃帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脈而不去者也鼠瘻之本皆在於藏其末出於頸腋之間其浮於脈中而未內着於肌肉而外為膿血者易去也黃帝曰去之奈何岐伯曰請

從其本引其末可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐來以去之其小如麥者一刺知三刺而已寒熱篇

右經一章皆從經脈取臟腑之本以治瘰癧之末也其末出於耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中者當於手足少陽經取之或針或灸如後穴

扁瘰癧天井 肩井

瘰癧天井 半寸灸七壯瀉之

東腋腫馬刀挾瘻善自嚙舌頰天牖中腫寒熱 臨泣

丘墟 各一分灸五壯 太衝 一分灸三壯 腋下頸項腫 天池 順皮

三分灸 如頰腫加後谿 二分灸五壯 腋下腫馬刀挾瘻喉

痺 陽輔 五分灸二七壯 申脈 一分灸三壯立愈

用胸中滿腋腫馬刀瘻善自嚙舌頰天牖中腫淫灤脛痠頭眩枕骨頰顛痛目溢身痺洒淅振寒季脇支滿寒熱

脇腰腹膝外腫痛臨泣主之 馬刀腫癢淵液章門支溝

主之 出於頰下或至頰車者當於手足陽明經取之或

針或灸如後穴 三里足陽明 合谷手陽明

搗生商陸根作餅子置於瘰癧上艾炷灸餅子上乾即

易之灸三四餅出外臺秘要

世當瘰癧上貼肉灸十四壯神効

東瘰癧馬刀將先出一瘡用四楞鐵環定住不令出移破

作口子以油紙撚維之勿令合了以絕其瘡之源其効至

速如瘡不破或病人不肯破更以藥塗之三日一易之以

龍泉散主之方見表裏條

世瘰癧多生肩項或赤或白或沉或浮初生如莖久似核

年月浸久其大如梅或如雞卵排行成列或生二三或生

六七俗云蟠蛇瘰癧是也用性努力思慮過久則疾痛赤腫

診治

繼之早治為上

流注瘰癧婦人多有之其性急躁其氣怫鬱其心執着初生

在項破後膿注四肢遍體結毒如梅李狀不療自破孔竅

相穿寒熱疼痛或流膿汁是名流注瘰癧也又名千歲瘡宜

服托裏救苦神應丸

川烏附去皮臍生用一兩 烏頭五兩 當歸酒浸一宿

沒藥 白芷 陳皮 甘草節各一兩

蟬蛻水洗半兩 大皂角七錠去皮弦子 薑黃一兩

右用皂角敲碎水四大碗煎至二大碗濾去渣用汁一

同煮烏頭川烏候烏頭爛為度搗如泥其餘諸藥却另

為末和烏頭泥為丸如桐子大每服六十九丸飢飽皆用

薄荷湯下若瘡既破穿鑿孔穴其處必生腫肉如指大

或黑或白乃風與氣搏宜驅風行經散氣之劑以化氣

調經湯主之

化氣調經湯與神應丸間服治流注癰

香附末

酒浸一宿
晒乾一兩

橘皮

二兩

羌活

一兩

白芷

一兩

牡蠣

煨半兩

天花粉

皂角刺

各半兩

右為細末每服二錢用清湯不拘時候調下日三次

如脈有力者先用追毒神異湯下之却服救苦神應丸

辰砂

血竭各一錢

麝香

一字共為細末

大甘草節

半兩

右為咬咀作一貼河水一鍾煎半鍾調前末子臨臥服

之

單窠癰者生一箇也發於頸項最難治但宜如前藥服之日久自消或發於顛骨亦難治用毒藥療之勿令浸漬日

久 蓮子癰一胞裹十數枚生於項之左右以手觸則自

轉動尚可用藥治療如堅硬挨不動者乃不可生憎寒發

熱燥渴凡遇此症至難治雖神聖亦無如之何也已

重臺癰生於項頸或左或右初則單窠結在上或在下重

疊見之是名重臺癰此症藥不可療不可針灸若是毒行

其腫痛發渴生痰萬死一生害人極速初覺有之急用小

犀角九粉金散治之 燕窠癰形似燕窠不可治

肺脈微瀼為鼠婁在頸之閒下不勝其上其應善痰

全文見治虛癰法
色白脈主瀼

黃帝曰決其生死奈何岐伯曰反其目視之其中有赤

脈上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二

脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲而死見赤脈

不下貫瞳子可治

寒熱

禁忌

夫瘰癧初發必起於少陽經不守禁戒必延及陽明經大抵食味之厚鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端招引變換須分虛實彼實者固易治自非痛斷厚味與發氣之物雖易亦難殊為可慮以其屬膽經主決斷有桂火而且氣多血少婦人見此若月經行不作寒熱可生稍久轉為潮熱其症危矣自非斷欲絕慮食淡雖神聖不可治也

結核

獨形而小核者為結核

熱

結核火氣熱甚則鬱結堅硬如果中核也不須潰發但熱氣散則自消

痰積

結核或在項在頸在臂在身如腫毒者多在皮裏膜外多是痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散核

結核在頸項方

僵蚕炒

大黃酒浸

青黛

膽星各等分

右為末蜜丸噲

結核在下頰二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡

結核在臂二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼朮皂角刺僵

蚕麝香行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷

治頰下結核不消經効用大肚蜘蛛不拘幾箇以好酒

浸之研爛同浸酌酒去查溫熱臨臥服之

瘰癧

虛實

虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內着寒勝其

熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷

骨為骨蝕有所疾前筋疾前二字衍文也筋當作結筋屈不得伸邪氣

居其間而不及發為筋瘤有所結氣歸之衛氣留之不得

雜方 火

反津液久留合為腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有
所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚
居為昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣
并日以益大則為骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而
不去有熱則化而為膿無熱則為肉疽凡此數氣者其發
無常處而有常名也刺節真邪篇○此皆虛邪中人為病
弗去而久留着故積歲累月而成疽

子和也新寨一婦人年四十餘有瘤三辨戴人令以醃吐之
三涌三汗三下癭已消半次服化癭之藥遂大消去夫病
在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

丹癭氣赤瘤丹癭氣先須斷厚味
海藻洗 黃連二兩

右為末以少許置掌中時時砥之津咽下如消三分之
二須止後服一方用黃栢二兩海藻一兩不用黃連亦
佳

治癭氣結核痛腫腫硬以昆布一兩洗去醃搗為末每用
一錢綿裹於好醋中浸過舍之咽津藥味盡再嚙之
治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去醃酒浸飲之

無破結散
海藻洗 草龍膽 海蛤 通草
昆布 礬石各三 松蘿各三 麥麩分四
半夏 貝母各二

為末酒服方寸七日三忌鯽魚猪肉五辛生菜諸雜毒
物十日知二十日愈

玉壺散治三種癭

海藻洗 海帶洗 昆布 雷丸各一兩

青鹽 廣茂各半兩

右等分為細末陳米飲丸如榛子大噲化以煉蜜丸亦好

子和 人參化瘦丹

海帶洗 海藻洗 海蛤 昆布已上四味皆焙

澤瀉炒 連翹已上各等分 猪靨 羊靨各十枚

即猪羊外腎乃囊中之卵也

右為末蜜丸如鷄頭大臨臥噲化一二九忌油膩物

寶金散 偏醫瘰氣無不瘥

猪羊靨十對 煖水洗去脂膜 海藻洗

海帶各二兩 丁香 木香 琥珀研

麝香研各一分 真硃研半兩

右件先將丁香木香海藻海帶杵為細末入下項藥珠

合和再研細重羅過每服一錢熱酒一盞調服夜臥服

垂頭而睡若在室男女十服必効如男子婦人患者一

月見効有胎不可服

海帶丸治瘰氣久不消

海藻洗 貝母 青皮 陳皮

右件各等分為細末煉蜜為丸如彈子大食後噲化一

丸大効

羅枯 溜方名一井散

硃砂 粉霜 雄黃已上各二錢 輕粉

沒藥 乳香已上各一錢 土黃三錢 雄黃三錢 輕粉二錢

兩去殼巴荳半兩去油硃砂另為末二錢右以硃黃一處為末用木鑿子同石腦油成一塊油帛裹定埋於地坑內四十九日取出於磁器盛

右為細末以津調塗瘡頂外邊歇一菲葉先以花紙貼
之上用小黃膏貼之

小黃膏

黃栢

黃芩

大黃各等分

右為細末以水調為糊比前藥大一遭三日一易至八
九日不取直候可取一方單用黃栢末亦佳

羅小兒丹瘡草麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚

妙出小兒門

羅生肌青龍散

訶子皮

高茶

龍骨

右件各等分為細末乾摻上

又枯瘡方

砒

礪砂

黃丹

雄黃

輕粉已上各一錢斑猫生用三箇硃砂

乳香

沒藥各一錢

右研為末糯米粥為丸捏作棋子樣爆乾先灸破瘡頂
三炷以藥餅蓋上用黃栢末以水調貼之數日自然枯
乾落下

一方以銅綠為末草刺瘡破摻上以膏藥塗之

世點瘡癩方神驗

桑柴灰

棗樹灰

黃荆灰

桐殼灰各二升半

蕎麥灰少

右以沸湯淋汁五碗許澄清入斑猫四十箇川山甲五
片乳香腦子不拘多少約五碗煎作二碗用磁器盛之
乳香腦子候冷入之後臨用時入新石灰調成膏神妙
傳瘡上乾以清水潤之其効如神

羅枯瘡方

桑柴灰三碗 石灰三碗 朽木三兩 乾桑耳三兩

草烏半斤 川烏四兩

右朽木等四味一處燒灰令有性同前二灰研勻用水一桶淋汁如法熬成膏用之

針灸

東諸癭惡氣

肩顛男左灸十八壯 右十七壯 女右灸十八壯 左十七壯

又法

天府壯七 衝陽隨年壯

甲癭天窗

一作天容 千及孺會主之 癭瘤氣舍主之

在西華眾人皆訕以為吐瀉而已一日魏壽之與戴人入食肆中見一夫病一瘤正當日上綱內背色如灰李下垂覆目睛不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別有一術其人從之乃引入一小室中令俛臥一床以繩束其胸刺委中大出血先

令以手揉其目瘤上亦刺出雀糞立平出戶壽之大驚戴人曰人之有技可盡窺乎 郟城戴人之鄉也一女子未

嫁年十八兩手背皆有瘤一類雞距一類羊角腕不能鉤向明望之如樨膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背者為膠瘤在面者為粉瘤此膠瘤也以銚針十字刺破按出黃膠膿三二匙立平瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢用此法耳

本治果報面生癩瘡方用艾丸灸十壯即用醋磨硫黃塗帛上剪如螺螄掩子大貼所灸處更用膏藥重貼二日一換候痒擠出膿如葦葢粉即愈硫黃羅謙甫作雄黃

診禁

無癭多着於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石癭皮色不變者名曰肉癭筋脈露結者名曰筋癭赤脈交結者名曰血癭隨憂愁消長

者名曰氣癭五癭皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致
天在癭則有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰肉
癭尤不可治治則殺人唯脂瘤破而去其脂粉則愈

服癭瘰藥先須斷厚味

目皆瘍即俗謂之
偷針也

運氣

皆方有二

一曰熱經云少陰司天之政三之氣大火行寒氣時至民
病目赤皆瘍治以寒劑也

二曰燥經云歲金太過民病目赤腫皆瘍又云陽明司天
燥淫所勝民病目眦皆瘍治以溫劑也

雜方

治偷針眼方

南星生為木
三錢 生地黄不拘
多少

右一處研成膏貼太陽兩邊腫自消

雜方

又方治偷針眼生薑搗細盒之淚出即愈

天蛇頭代指

蒲公英草清明時節如薺菜狀中開一朵花如菊花者

取乾與蒼耳草二味等為末以好醋濃煎浸洗即愈

蒲公英忍冬酒治天蛇頭極效方見乳
癭門

治天蛇頭蒲公英搗細水和調去查服之又搗查盒患

處屢効

治天蛇頭用

野落蘇即兼
絲子金銀花藤 天蕎麥

右切細用好米醋濃煎先薰後洗

又方用人糞雜黃泥搗之裹在患處即愈

治手指忽腫痛名為代指以烏梅入醋研浸患處立瘥

治手指腫酸漿水入少鹽熱浸之冷即易孫真
人方

雜方

甲疽嵌甲 嵌正齒反

治甲疽因剔甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復緣穿窄靴研損四邊腫焮黃水出浸淫相染五指俱爛漸漸引上脚踏跑漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能療者用綠礬五兩形色似朴硝而綠色置於鐵板上聚炭封之吹令火熾其礬即沸流出色赤如溶金汁者是真也候沸定汁盡去火待冷取出研為細末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡帛裹乾用此末傅之愈

治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不瘥凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡不瘥用乳香末膽礬燒研等分傅之內消愈

精勝金方治甲疽努肉膿血疼痛不瘥用紅礪頭厚處生研為末每服二錢研錠花酒調下如癰盛已潰者以此末

傅之更服煎藥一日三服

嵌甲陷甲割甲成瘡久年不瘥者用烏頭尖黃柏等分末之洗淨貼之

精華陀治嵌甲累効方

硃砂

乳香並研各一錢膩粉半錢

橄欖核燒存性用

三箇

黃丹一字

右為末以生麻油調先以鹽湯洗淨挹乾傅之二次効

乳癰乳巖

乳癰陽明厥陰所屬

乳梗論○乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣焮熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可

消散失此不治必成癰癤治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汚濁之血以生甘草節消腫導毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸頭或湯或散加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾穴兩三壯於腫處其効尤捷彼村玉喜於自銜便妄用針刀引惹拙病良可哀憫若夫不得於夫不得於舅姑憂怒鬱遏時日積累脾氣消沮肝氣橫逆遂成隱核如鱉棋子不痛不痒十數年後方為瘡陷名曰妳巖以其瘡形嵌凹似巖穴也

不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理予族姪婦年十八歲時曾得此察其形脈稍實但性急躁伉儷自諧所難者後姑耳遂以單方青皮湯間以加減四物湯行經絡之劑兩月而安此病多因厚味濕熱之痰停蓄脛間與滯乳相搏而成

又有滯乳因兒口氣吹噓而成又有拗怒氣激滯而生者煨石膏燒樺皮瓜蒌子甘草節青皮皆神効藥也婦人此病若早治之便可立消有月經時悉是輕病五六十後無月經時不可作輕易看也

乳癰

青皮 瓜蒌 橘葉 連翹
 桃仁留 皂角刺 甘草節 破多加參芪
 神効瓜蒌散治乳癰妳巖神効丹溪亦云妙捷恐貧賤之家未能辦集者用後蒲公英草尤妙

瓜蒌一箇去皮焙為末子多者有力 甘草生 當歸酒浸焙各半兩
 乳香另研各錢半 沒藥另研各錢半

右為末用無灰酒三升於銀石器內慢火熬取一升清汁分作三服食後良久服如有妳巖便服此藥可杜絕

病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即於大小便
中通利如疾甚再合服以退為度 立効散與前方間
服神妙但於瓜蒌散方減去當歸加紫色皂角刺一兩
六錢是也

本蒲公英草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及
封之立消

丹蒲公英在處田間路側有之三四月開黃花似菊味甘
解毒散滯意其可入陽明太陰經洗淨細研以忍冬藤濃
煎湯入少酒佐之隨手便欲睡睡覺已失之矣

張氏橘皮湯治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍
者神効因小兒吹乳變成斯疾者並皆治之用陳皮一味
湯浸去白晒乾麩炒微黃為細末麝香研酒調二錢初發
覺赤腫疼痛一服見効

滯乳食
痰

丹乳癰初發腫硬一服差真樺皮末酒服方寸七睡省已
失出
苑

羅金丹治婦人吹乳極有神効用百齒霜即木梳
上髮垢右一
味不拘多少用無根水為丸如桐子大每服三九倒流水
送下食後令病左臥者左臥右乳者右臥於溫處汗出愈
用新水傾於房上接之乃倒流水也

圖治婦人妳疼痛不可忍用川山甲灸黃木通各一兩自
然銅半兩生用三味搗為細末每服二錢溫酒調下不拘
時候

簡婦人吹乳獨勝散白丁香半兩搗羅為末每服一錢七
溫酒調服無時

雲治婦人吹乳皂角散譚曰婦人吹乳意如何皂角燒灰
蛤粉和熱酒一杯調一字頃間揉散笑呵呵

又方

乳香研一錢 瓜蒌根末兩一 右研令勻温酒調服二錢

有熱者清之

楊孺人乳腫痛

青皮

石膏煨

連翹

皂角刺炒

黃藥子

當歸頭

木通各一錢

甘草生三分

作一貼入好酒些少同煎飲之又有別藥洗腫處

義二孺人平時乳內有結核不為痛忽乳邊又有一腫核

頗却有些痛

黃芩

川芎

木通

陳皮各四錢

人參錢二

芍藥錢一

大腹皮錢三

炙甘草

生甘草各一錢 當歸頭錢一

分二貼煎服

二孺人但經將行而乳腫先兩日發口乾而不渴食少

減脈左弦帶數右却平治用四物湯加陳皮白朮茯苓

熱下與點九三十粒

產後乳膨調麥牙飲自消

產後輕者內消實者下之

連翹湯治產後妬乳并瘰

連翹

升麻

芒硝各一兩

玄參

芍藥

白欬

防已

射干各八錢

大黃錢二

甘草錢六

杏仁四十箇去皮尖

右咬咀以水六升煮二升下大黃次芒硝分三服

一婦人年六十厚味鬱氣而形實多如夏無汗而性急

忽左乳結一小核大如棋子不痛自覺神思不佳不知食

味絕半月以人參湯調青皮甘草末入生薑汁細細呷一

日夜五六次至五七日消矣此乃妳岩之始不早治隱至

五年十年已後發不痛不痒必於乳下潰一竅如巖穴出

乳岩在早治

雜方數
貼

膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得於夫者有之婦人以夫為天失於所天乃能生此謂之巖者以其如穴之嵌呀空洞而外無所見故名曰巖患此者必經久淹延惟此婦治之早正消患於未形餘者皆死凡十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安

用用蒲公英草搗爛盒患處神妙
雲用天南星末以溫酒調塗之

聖治婦人乳痛成癥以益母草為末水調塗乳上一宿自瘥生搗爛用之亦得

山婦人吹乳用素樹蛙脣飯搗成膏貼之

丹乳頭裂破下香末傅之梅師方

怪穴乳癰 乳中穴在乳下中針入五分皮向後一寸半灸瀉

甲乳癰寒熱短氣臥不安膺窓主之 乳癰寒素寒熱痛

針灸

不可按乳根主之 大驚乳痛梁丘主之 乳癰有熱三里主之乳癰諸藥不能止痛者 女子乳癰驚巨虛下廉

主之千金云臂腫重足踰不收跟痛 乳癰太衝及復溜主之 妬乳太

淵主之 婦人乳餘疾盲門主之

囊癰陰頭癰

丹外科精要云癰疽入囊者死囊屬厥陰今以死言之將以為屬少陰腎經邪予親見入囊者七八人悉以濕熱入肝經施治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫辜丸懸掛可畏者皆不死但未知下虛年老者如何耳

子治丈夫陰頭癰師所不能醫用鱉甲一枚燒末以鷄子白和傅之良

便毒

精治穀道前後生癰謂之懸癰用橫紋甘草一兩四寸截

虛

囊癰屬厥陰

斷以長流水一碗文武火慢慢煎水炙自早至午炙令水盡甘草中心見水潤為透細剉却用無灰好酒二小杯入甘草煎至一杯溫服之二三服便可保無虞此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如椀子即破若破難治此藥雖不能消過二十日後必盡消矣投兩服亦無害林判院嘗患此癰已破服此藥兩服瘡即合甚妙

丹毒腫或着陰卵或偏着一邊痛牽引小腹痛不可忍方見

疔青皮湯治便毒
防風
當歸身
甘草稍生各等分

右咬咀分作四服水一小碗煎至八分去粗大溫服空心日進三服

內疎

癰疽雜病痛牽引小腹痛

和玉燭散即四物湯調胃承氣湯各半服之也

世又方
劉寄奴
王不留行
大黃
金銀花

木鱉子
右等分酒水煎露一宿五更服

便毒初起
射干二
生薑如指大搗細

右取順流水煎微沸服之以瀉為度又用牛皮膠醋煮塗患處

已結成膿者
大黃兩半
枳實三
厚朴三錢
甘草節一錢

連翹半錢
桃仁泥共一枚
生薑三片

右作一貼煎服之
又便毒

青皮 白芷 柴胡 赤芍藥

檳榔 朴硝 烏藥 木瓜

大黃 連翹 瓜蒌 生地黄

甘草節 三稜 蓬朮 黃芩

犀角 皂角刺

右咬咀水三碗煎至一碗大飢服以瀉為度

丹 便毒取大蜘蛛一箇研細熱酒下

丹 又方用甘草節白芷黃連各等分如破者龍骨白枯礬

赤石脂并用鐵圍散癰疽腫毒亦治用之效

乳香 沒藥各半 大黃 黃連

黃栢 南星 半夏 防風

羌活 皂角刺 木鱉子 瓜蒌

甘草節 草烏尖 阿膠另研

右為細末醋調成膏以石器內火熬黑色驚翎傳之

貼骨癰

保 諸瘡大痛不辨肉色漫腫光色名附骨癰如神三生散

露蜂房 蛇退 頭髮洗淨等分

右燒灰存性研細酒下三錢

丹 附骨癰熱在血分之極初發時以青皮甘草治之破後

當養血

內癰有三

癰 肝滿腎滿肺滿皆實即為腫王註云滿謂脈氣肺之癰

喘而兩胛滿仲景云肺癰吐膿肝癰兩胛滿臥則驚不得

小便 腎癰脚下至小腹滿大奇論林億云脚下當作胛

腹腫強按則痛便數似淋仲景云腸癰小腹痞堅蓋小腹
痛而痞堅者腎癰也小便數而似淋者腸癰也即肺癰肝
屬之

胃脘癰人迎脈逆而盛全文見後
胃脘癰條

肺癰腸癰胃脘癰

肺癰治法

肺癰疽發於內者肺癰肝癰腎癰腸癰囊內癰附骨癰惟
肺癰須先解表今表而出之

欬唾膿血其脈數實者為肺癰若口中欬即胃中隱痛
脈反滑數此肺癰也

問曰病者欬逆何以知其肺癰當有膿血吐之則死其脈
何如曰寸脈微而數微為風數為熱微則汗出數則惡寒
風中於衛呼氣不入熱逼於榮吸氣不出風傷皮毛熱傷
血脈風舍於衛其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多吐濁沫
時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌

可救膿成則死 問曰振寒發熱寸脈滑數其人飲食起
居如故此為癰腫醫反不知以傷寒治之不應何以知有
膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胃中者為肺
癰其脈數欬吐有膿血設膿未成其脈自數去但數為
膿已成也

小青龍湯方見傷寒條

葶藶大棗瀉肺湯治肺癰喘不得臥

葶藶炒黃芩細 大棗十二枚

水三升入棗先煮取二升去棗入葶藶又煮一升頓服
之又曰治肺癰胸滿脹一身并面目浮腫鼻塞清涕出
不知香臭酸辛咳逆上氣喘鳴迫塞用前方三日一劑
可至三四劑須先與小青龍湯一劑乃與之

要桔梗湯治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥

先解表次取膿終補裏

臭久久吐膿如粥者肺癰也

桔梗

甘草炙各一兩

水三升煮取一升去渣分温再服則吐膿血也亦治喉痺三因甘草倍之每四錢名四聖散千金亦名桔梗湯用桔梗三兩甘草二兩服後必吐膿血

要葶藶湯治肺癰又云一本治欬有微熱煩滿心胸甲錯

葶藶切三升

薏苡仁半升

冬瓜仁半升

栝仁五十枚去皮

水一斗先煮葶藶得五升去粗入諸藥取二升分温五

服當吐如粥千金云肺癰當吐膿血葶藶即汀洲間蘆葦之粗種也

治吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入男子

髮灰研細入和之清米飲下可除根只兩服亦治吐血消風散方荆芥川芎羌活人參茯苓獨活防風藿香薄荷各二錢厚朴陳皮各半兩為末是也

常山獨行方治心胃甲錯為肺癰黃昏湯主之用夜合皮

掌大一枚水三升煮取二升分再服夜合根按木草即烏農樹

右肺癰證治要畧以小青龍湯先與一劑乃行氣取膿之藥將以解表之風寒邪氣此治腫瘍之例也後以葶藶方終之者將以補裏之陰氣此治潰瘍之例也已上方皆丹溪所集

取膠雜方

如聖丸治風熱毒氣上攻咽喉通痺腫塞妨悶及肺癰喘嗽唾膿血胃滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣臭腥久久咯膿狀如米粥

樟腦研另

牛黃研另

桔梗

甘草生用各一錢

右為細末煉蜜丸每兩作二十九每用一丸噙化

濟生桔梗湯治肺癰心胃氣塞咳嗽膿血心神煩悶咽

乾多渴兩足腫滿小便赤黃大便多澁桔梗貝母川歸瓜

蒺藜仁枳殼薏苡仁桑白皮防風已上各一兩生甘草杏仁

蒸百合各半兩黃芪一兩半右修事咬咀每服四錢水一碗半生薑五片煎至八分去查服若大便秘加大黃小便秘加木通

仲桔梗白散治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗 貝母各三分 巴豆一分去皮炒研如脂

右三味為散強人飲服半錢七羸者減之病在膈上者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一碗則定此要畧方丹溪不刪採用之者必有微意存焉

丹肺癰醫壘元戎搜風湯吐之搜風湯未考

本治肺癰吐膿血作臭氣胃乳皆痛升麻湯

川升麻 桔梗 薏苡仁 地榆 牡丹皮 芍藥各半兩 甘草二分

右劉龕末每一兩水一升半薑五片煎去查日三服

濟生排膿湯治肺癰得吐膿後以此排膿補肺生綿芪二兩細末每二錢水一碗煎一半服 肺癰收斂瘡口止有合權樹皮白欬煎湯飲之

診

肺癰已破入風者不治 腸癰千金謂妄治必殺人腸癰為病小腹重而強按之則痛便數似淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀其脈數者小有膿也巢云洪數者已有膿脈若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲或遠臍生瘡或膿自濟出或大便出膿血

脈問曰羽林婦病何以知腸有膿師曰脈滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為敗濁小腹痞堅小便或澁或自汗出或復惡寒膿為已成設脈遲緊則為瘀血血下即安

腫瘍

要薏苡附子敗醬散治身甲錯腹皮急如腹脹本無積聚身熱脈數者

附子炮二分

敗醬五分

薏苡仁一錢

右為末每服方寸匕以水二合煎頓服小便當下三因薏苡仁附子同煎敗醬用一兩一分每四錢水一盞半煎七分去查空心服

大黃牡丹湯治腸癰小腹痞堅或偏在膀胱左右其色白堅大如掌熱小便自調時自汗出脈遲堅者未成膿可下之當有血脈數膿成不復可下

大黃四兩

牡丹皮三兩

芒硝二兩

冬瓜仁一斤

枳仁五十箇

右咬咀水五升煮一升頓服當下膿血刪繁用芒硝半合瓜子五合劉涓子用硝石三合肘後同名瓜子湯三

因用大黃枳仁各二分瓜子三分牡丹皮一錢硝二錢劉散作一貼水三盞煎至八分去查入硝再煎沸頓服無時

薏苡湯治腸癰腹中痛煩躁不安或脹滿不食小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑是者便可與或有差亦無妨薏苡仁五兩牡丹皮桃仁各三兩瓜子仁四兩劉散每四大錢水盞半煎七分服姚氏去桃仁用杏仁崔氏加芒硝二兩千金方同

潰瘍補

醫案曰女子腹痛百方不治脈滑數時作熱腹微急孫診曰腹痛脈當沉細今脈滑數此腸癰也以雲母膏一兩作丸如桐子大以牛皮膠烱溫酒調膠水下丸子藥餌時服盡膏下膿血一盆而安

灸法屈兩肘正肘頭銳骨是穴灸百壯下膿血而安

王氏餘話有婦人腸中痛不可忍大便自小便出李生診之曰芫脈見於陽部此腸癰也乃出雲母膏作百十九煎黃芪湯吞下利膿血數升而安李曰寸芫積血在胃關芫為腸生癰也李乃楊吉老之壻葉舉業習醫官取醫博士內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰受之七情者臟腑受之宜其發在腔子而向裏非干腸胃盲膜也謂之內者以其視之不見故名焉

右腸癰五方丹溪先生所集也前三方內其要畧一方元本雖云內有癰膿然先生不言之而又連千金三因二方置於篇首者蓋亦腫瘍瀉利例也後二方用膠烱黃芪煎湯吞藥者蓋亦潰瘍補例也

帝曰人病胃脘癰者診當何如岐伯曰診此者當候胃脈其脈當沉細沉細者氣逆甲乙經沉細作沉澁逆者人迎甚盛甚

診

盛則熱人迎者胃脈也逆而盛則熱聚於胃中而不行故胃脘為癰也病能篇

雜方

射干湯治胃脘癰人迎脈逆而盛嗽膿血榮衛不流熱聚胃口成癰

射干去毛

梔仁

赤茯苓去皮

升麻各一兩

赤芍藥一兩半

白朮半兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去查入地黃汁一合蜜半合再煎溫服不計時候

復元通氣散治諸氣澁耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛消腫

青皮

陳皮各四兩

甘草三寸生熟各半

川山甲炮

瓜蒌根各二兩

金銀花一兩

連翹一兩

右為細末熱酒調下

診

大腸癱大腸有熱積死血流注桃仁承氣湯加連翹秦艽
 近肛門破入風者難治用防風之類 大凡破傷風在
 頭面則以白芷為君防風頭佐之蓋去頭面皮膚之風故
 也在身體及四肢則以防風為君隨身稍用下部則以獨
 活佐之 肺癱吐膿後其脈短而濇者自痊浮大者難治
 其面色白而反赤者此火之尅金皆不可治
 金匱方論曰熱在上焦者因欬為肺痿肺痿之病何從得
 之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又
 被快藥下利重亡津液故寸口脈數其人欬口中又有濁
 唾涎沫者為肺痿之病若口中辟辟燥欬即胃中隱隱痛
 脈反滑數此為肺癰欬唾膿血脈數虛者為肺痿數實者
 為肺癰

按此言肺痿屬熱如欬久肺傷聲啞聲嘶咯血此屬陰

虛火熱甚是也本論治肺痿吐涎沫而不欬者其人
 渴必遺尿小便數以上虛不能制下故也此為肺中冷
 必眩多涎唾用灸甘草乾薑此屬寒也肺痿吐涎多心
 中溫液者用灸甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱
 不同是皆宜分治之故肺痿又有寒熱之異也
肺痿勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內盛於肺也則汗出惡
 風咳嗽短氣鼻塞項強胃脇脹滿久久不瘥已成肺痿也
肺癰肺癰者由食啖辛熱炙博或酣飲熱酒燥熱傷肺所致
 治之宜早

破傷風在
 以膚之風故
 用下部則以獨
 風如燥熱鼻塞更甚曾謂翹翹之入不遂子氣翹翹也
 翹翹血氣翹翹而風深乘之內益然翹翹限平出惡
 被不同畏習宜令之姑翹翹交育寒熱多異也及有濁
 中盛亦皆用灸甘草翹翹也衣與翹翹翹火熱
 必翹翹或翹用灸甘草翹翹也翹翹也翹翹也
 翹翹必貴氣小更燻以土翹不指歸不姑也此為翹中令
 翹火熱甚長也本翹翹翹翹也翹翹而不成者其入不

醫學綱目卷之二十

心小腸部

丹標瘰癧 丹毒風丹 瘰癧 疥 癬 紫

白癩風白禿 面瘡 癩頭瘡 口瘡唇瘡 牙

疔瘡 耳內瘡 腎臟風陰瘡 下疳瘡 婦人

陰瘡 膝瘡 腳氣瘡足跟瘡 凍瘡 手足皴

裂 腳縫爛 反花瘡 惡瘡 雜瘡 疔 痣

發斑屬風熱 風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散

中消息當以微汗散之下之非理 防風通聖散方見顛癩門

羅時毒疔瘡漏蘆散治臟腑積熱發為腫毒時疫疔瘡頭

面洪腫咽嗌堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆 升麻 大黃 黃芩 各一兩

藍葉 玄參 各二兩

右為粗末每服二錢水煎腫熱甚加芒硝二錢半

大法微汗散之

實熱下之

消毒丸治時毒疔瘡惡症

大黃

牡蠣燒

白姜各一兩

右為細末煉蜜丸彈子大新水化下一丸無時內加桔梗黍粘子湯尤妙

治丹發疼痛扁竹汁服一升二合立瘥若未瘥再服効

虛者補之降之

內臺秘要○扁竹即扁蓄

內傷班者胃氣極虛一身之火游行於外所致宜補以降之

嘗治一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹標用諸般敷貼丹標藥及用刀於箇箇丹頭出血丹皆不退後以牛陳生姜加補劑治嘔不効遂純用參半兩歸木各錢半濃煎一貼嘔止二三貼丹漸緩熱漸減約五十餘貼熱始除神氣始復

運氣丹標皆屬火經云少陽司天客勝則丹疹外發及為

雜方

丹標是也

治諸腫丹毒伏龍肝不拘多少為末用雞子白和傅之日三次甚妙

治一切丹毒金花散

鬱金

黃芩

甘草

山梔

大黃

黃連

糯米

右七味等分生為末用蜜和水調服

治烟火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩搗和如泥塗之又方治螢火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之

丹毒藍澱傳熱即易子册秘錄

丹者惡毒之瘡五色無常苧根三斤水三斗煮汁每日塗之

世治赤丹用黃瓜種中穰水去子以器貯之用時以水塗患處又方用臘雪貯器中久化為水以水塗赤游妙

丹諸丹毒腫蚯蚓矢水和傳之聖惠方外臺同

千療丹癰疹方酪和鹽煮以摩之手下消

丹治赤游風腫蕎麥苦酒調傳兵部手集

楊治熱赤游丹毒括萋末二大兩醞醋調塗之

外凡丹走皮中浸淫名火丹本方取躡躑傳之先刺破傳之良

保丹者惡毒之瘡五色無常治之煮栗皮有刺者洗之佳

保治金絲瘡一云紅絲瘡其狀如線或如繩巨細不一經

謂丹毒是也但比烟毒不甚廣濶人患此頭上有之下行

至心則死下有之上行者亦然可於瘡頭截經刺之出血

後嚼萍草根塗之自安

無丹毒自腹内生出四肢者則易愈自四肢入腹者則難

針灸

診

治風牛癩菜淋飲坐濕土以杖刮癩或煎酒或煎末

丹人有病面上忽見紅點者多死

一兩入丹毒風丹痛者為丹毒

賈宅小娘風痒黃精丸四寸粒與錢香黃芩錢四錢錢煎於土器之

四丹白米分韭葉枳實分香黃芩錢四錢錢煎於土器之

右分八貼下之食前

遍身風痒癩疹凌雪花細末酒下錢立止

鮑允中年五十歲風丹痒甚腹微疼咽不利面身微腫五

六日不退兩寸脉滑大實右浮大左浮弦小以炒芩炒連

歸芎芍地桔草黍粘紫葳各一錢防風黃芪各半錢凡五

愈而復發為積滯

六貼而安
河間神佑丸治風丹愈而復發或隔一月發或隔半年
一入風丹一年發者神佑丸下之百發百中方見水

血虛熱

雜方

丹一人患風丹遍身痒因酒得者

浮萍兩

防風

黃芪

羌活三錢

當歸二錢

乾葛

麻黃一錢

生甘草半錢

世治冷丹風

防風

甘草

白姜蚕

蟬腿

川芎

白芷

茯苓

荆芥

陳皮

厚朴

蒼耳子

人參

右為末豆淋酒調二錢

世丹痒者用韭葉摻些鹽與香油以手摩熱於丹上搯之

立愈出小兒治風丹川山甲洗去腥於瓦上炒過存性每

一兩入甘草三錢為末米飲調服 治血風疙瘡瘡癩瘡

浮萍取自然汁豆淋酒下四物浸酒下亦得

丹用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗患處未

瘡更入硫黃少許磨塗之聖惠方

瘡

瘡小癩世謂之熱癩是也王註云大如酸棗或如荳色赤而內有膿血也

風濕

海汗出見濕乃生瘰癧為瘡癩也瘡色赤臍內有膿血

勞汗當風寒薄為皴皴乃瘰

旋覆花丸

防風

白芷

甘菊

旋覆花三兩

半夏

石膏

川芎

陳皮

白附子各半兩

蝎梢

姜蚕炒各三錢

右細末姜糊丸桐子大姜湯下三五十九食後

瘡似傷寒暴發暴消世說為瘡子者是也疥似疹而延歲

瘡似傷寒暴發暴消世說為瘡子者是也疥似疹而延歲

月或乾濕痒痛不一經所謂癩疹是也癩亦延歲月乾而不濕痒而不痛是也

癩

癩疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者 疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯四順飲子虛者補中益氣湯皆同傷寒施治也

聖治風癩入腹身軀強舌乾燥用蔓菁子三兩為末每服温酒下一錢七

運氣疹者有二

運氣

一曰熱經云火鬱之發民病瘍痲又云歲木不及燥乃大行復則炎暑流火瘡瘍痲疹又云少陰之復民病痲疹是也

二曰風經云歲水不及濕乃大行復則大風暴發肌肉疹發是也

疥

表

河防風通聖散治風熱瘡疥久不愈方見廣門

丹朱院君三十餘久患癩疹身痺而紫色可與防風通聖散加牛房子為極細末每二錢水盞半入姜汁令辣煎食前熱飲之

麻黃飲治上躄生瘡或痒或痛黃水浸淫結痂推起延蔓於三陽之分根窠小帶紅腫此是濕熱症

麻黃半兩去根留節 防風半兩 羌活 石膏六錢

黃芩錢四 滑石兩 陳皮 紫萍各七錢半

黍粘子七錢 縮砂二錢 蒼耳草三錢 蒼朮兩

生甘草三錢 薄荷葉一錢 荊芥二錢

右咬咀每六錢重水一鐘半猛火煎取六分入好酒四五滴去查熱服須得通身有汗其瘡自安甚者服至百

服之後看汗出到何處若自上而下出過脚腫厥其瘡自愈

消毒散丹溪云消毒散氣表藥也

防風兩一 甘草兩二 荆芥穗兩三 黍粘子兩四

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分去查食後溫服

初虞世治皮膚風熱遍身生癩疹牛旁子浮萍等分以薄荷湯調下二錢日二服

何小官生瘡小便黃用通聖散一錢半煎下黃精丸

挾血虛

楊三哥女生瘡午後發熱日間惡寒形削食少

白朮錢二 連翹錢一 煎下黃精丸三十粒

雜方

垣每風瘡大風病相似好桑葉洗蒸一宿日乾末湯下二錢七經驗方

聖治風遍身癩疹疼痛成瘡用白姜蚕少許焙黃細研為

末酒服立瘥

裡

類臯韓吉卿自髀至足生濕蟲大者如錢小者如

痒則搔破水到則浸淫狀類虫行褥機愈而復生癩痕

四十餘年不瘥戴人晒之曰此濕蟲瘡也由水濕而得故

多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃

應疹入腹亦能殺人用蚕沙濃煎湯洗之

衍有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脛臍腹及近

隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩

水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參為丸如桐子大

食後溫水服二十九次日便愈

子和有樵夫來買苦參欲治疥不識藥性緩急但聞人言

可治濃煎一碗服之須更大吐涎一盆三日疥作痂矣

雜方

丹一上散治諸般疥瘡或痛或痒或喜湯火烘洗者

蛇床子一兩 雄黃一兩 硫黃二錢半 白礬半兩
 黃連兩 黑狗脊兩 寒水石一兩 班毛十四
 吳茱萸三錢 白膠香一兩 石頭上放冷研
 右為細末香油調傅治疥瘡先用蒼耳草或羊不食草
 簾前濃湯洗去瘡痂然後用前藥傅可一次愈
 小兒面瘡通面爛無全膚膿水流滴百藥不効者陳年膿
 猪油不入鹽者傅之神効出附
 又諸般疥瘡加減法 腫多加白芷開鬱 痛多加白芷
 方解石 痒多加枯礬 陰囊瘡加茱萸濕多香油調
 乾痒出血多加大黃黃連猪脂調 虫多加蕪荑錫灰楨
 榔藜蘆班毛 紅色加黃丹 青色加青黛 瘡在上多
 服通聖散 在下多以藏用丸下 脚腫出血加血分濕
 熱藥

濕熱 膿胞瘡治熱為主 黃連 黃芩 寒水石錢二 黃丹分五 白芷各少 木香許痛
 右為細末麻油調塗 又瘡藥膿瘡治熱燥濕為主 虫瘡如癬狀退熱殺虫為
 主 乾疥瘡開鬱為主加吳茱萸
 蕪荑 黑狗脊 雄黃 硫黃 水銀 蛇床子 松香 松皮灰
 黃連 方解石 蛇床子 殺虫 濕多
 羅間茹散治疥經年不瘥 水銀錢 好茶錢 間茹錢 輕粉許
 殺虫 加

右為細末每用不拘多少麻油調塗之

世治疥癬以臘月猪脂不拘多少同生白礬杏仁加輕粉搗爛擦之陳無擇云杏仁輕粉最殺虫甚妙

本治疥不問新久方

白蕪荑兩 檳榔 吳茱萸各半 硫黃二錢

右為末麻油調搽破楷之

世砂瘡殺虫為主

蕪荑二錢 剪草錢 蛇床子錢 白礬一錢

明礬錢 吳茱萸錢 蒼木 厚朴

雄黃各半 寒水石錢 黃栢錢 輕粉錢

世治砂瘡山蟻窠黃荆葉雉雞毛等分燒存性為末香油調傳又方用陳年船底灰搗細篩過桐油調傳立効

又方治砂瘡用水蒿苳燒灰存性香油調傳立愈水多者

乾傳水蒿苳如百合狀生水邊七八片結子又如野蘇狀

世疥癩瘡春大發無疥開僻為土不宜搽必

白礬 吳茱萸錢 樟腦分五 輕粉錢

寒水石二錢 蛇床子錢 黃栢 大黃錢

硫黃錢 檳榔個 右為末猪脂油調搽

治癩疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘡後復發

取半蹄根去皮細切熟蒸以大酢和先洗淨傳上一時再

以冷水洗之日一傳瘡若為末傳尤妙千金 治疥取半

蹄根和猪脂塗上或者鹽少許即焦外臺秘要 治遍身風痒

生瘡疥茵陳煎湯濃洗立安千金

治痛 有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸而止

粘着衣被曉夕不得睡痛不可忍有下俚教以苜蓿三斗

到日乾之春羅為末布席上使病瘡人恣臥其間仍以衣

被覆之既不粘衣被又復得睡不五七日其瘡如失應手

神驗

浸淫瘡痛不可忍者發寒熱刺薊末水調傅瘡上乾則

易之簡要治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分

以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌博

元希聲侍郎治卒發疥秘驗方石灰隨多少和醋藥水

調塗隨手即滅一法用石灰炒紅出火氣香油調傅

又方淋石灰汁洗之孫真人

木香散治多時不斂一切惡瘡此藥能生肌肉止痛

木香 檳榔 黃連各半 白芷三

已上同為細末先洗淨每日一遍乾貼有水出勿怪未

効又貼 又方同上加地骨皮為細末先於瘡口上用

溫漿水洗濕挹乾後上藥治之効不可述暨治下疳瘡

神効

諸瘡癬久年者千年韭根炒存性末之猪油調傅經

手集多年惡瘡不瘥或痛痒生皰爛研馬糞并齒灰

傅上不過三兩遍效武良相在蜀足脛有瘡痛不可忍得

此方便瘥

風瘡久不瘥燒菘蔞末以傅之按本草即野苳白

癩子茨菘葉陰乾為末傅之

患禿瘡以水研山荳根傅瘡上 患麤豆等瘡以水研

山荳根服少許

連痂痒痛搗扁竹封痂落即瘥附後 洗諸瘡疥取冬

瓜藤皮煎湯妙日華 中風犯毒霧櫟木皮煎湯洗妙韋

運氣浸淫皆屬火經云歲火太過甚則身熱膚浸淫是也

雜瘡

運氣

醫學綱目卷之

九

針灸

手疥

勞宮灸

太陵灸

血瘡疥頑癬

絕骨

三里各一寸半

間使

解溪各五分

血瘡三寸

藥

曲池

合谷

三里

絕骨

行間

委中

癬疥陽谿主之

少陰有餘病皮痺癢疹全文見

浸淫瘡從口流向四肢者可治四肢流來入口者不可

治

癬

風熱

丹癬瘡用防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺

又方治癬用

浮萍一兩

蒼耳

蒼朮二兩

苦參一兩

黃芩

半兩

香附

二兩

右為末酒調服或酒糊丸

羅苦參丸治肺毒邪熱生瘡生癬疥並宜服之以苦參一

味為細末粟米飲丸如桐子大每服五十丸空心溫水飲

湯送下

風濕

木烏頭丸治風癬妙方見紫白癩風

羅何首烏散治脾肺風毒攻腫遍身癬變成癩疹搔之成

瘡或肩背拘急肌肉頑痺手足瘦裂風氣上攻頭面生瘡

及治紫癩白癩頑麻等風

荊芥穗

蔓荊子

葳靈仙

何首烏

甘草灸

防風

蚶蚩草

右件各等分搗羅為末每服一錢食後溫酒調下沸湯

亦得

雜方

癬在脛項間後延上至耳成濕癬他治不應以蘆薈一兩研甘草末半兩和勻先用溫漿水洗癬拭上傳之神妙

變劑

癬瘡方槿樹皮不犯銅鐵每二兩又蘆薈三錢白芨三錢細研為末刮癬出血用好醋調傳雖痛卻一傳可愈

一方用蘆薈 大黃 輕粉 雄黃

蛇床子 槿樹皮 檳榔

右先刮破癬用醋調藥末塗之

世頑癬用槿樹皮加巴荳班毛為細末又加生砒少許水調傳

世治牛皮癬用清香油一兩入全蝎七枚巴荳二十枚班毛十枚同熬候色焦者先去之去了入黃蠟一錢候溶收起朝擦暮愈不損皮肉

又方綠籬根不拘多少花椒一兩

江子十五粒

白芨兩半

百部兩半

白欵兩半

信此

防風兩

右各為末和綠籬根搗熱成團將藥於癬上擦之候痛過洗浴

又方一味綠籬根去粗皮取細皮貼肉者搗爛用醋調塗癬上立愈

乾癬積年生疥搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之聖惠方外臺用班毛半兩炒為末蜜調傳上

輕劑

本治癬用藜蘆細搗為末生油和傳之

治癬疥久不瘥羊蹄根搗絞取汁用膩粉少許調如膏塗傳患處三五遍即瘥如乾即用猪脂調和傳之簡要

羅栢脂膏治乾癬

栢油斤

黃蠟斤

杏仁

四十五粒 朴硝抄

右件相和於鐵器內用老生姜葱白三根一順攪五七次煎沸濾過成膏於瘡上搽之

圖取楮皮枝中白汁塗癬甚妙

聖治癬濕痒用楮葉半斤細切搗傳癬上

經治五種瘡癬以韭根炒存性旋搗末以猪脂調傳之三

五度瘡 又方患癬瘡搗山荳根末臘月猪脂調塗之

羅祛濕散治多年濕癬大有神效

蚕沙兩 薄荷兩

右為細末每用不拘多少乾摻於瘡上或用生油調搽

子和一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝發痒

時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流又痛不可忍灸炳薰

漂硫黃蘭茹白姜蚕羊蹄根之藥皆不効其父母求瘡於

戴人戴人曰能從予言則瘡父母諾之以銚針磨尖快當

濕者燥之

其痒時於癬上各刺百餘針其血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不盡以告後人恐為癬藥所誤濕滯於血不可不砭者矣

紫白癩風白禿

海龍蛇散治風虛頑麻遍身紫白癩風癢痒痛者

白花蛇去骨焙 黑梢蛇去骨焙 草薺 天麻

黃芪 金毛狗脊 自然銅 骨碎補

楓香研 地龍 草烏頭搗水浸剉

乳香 沒藥各三錢 麝香二錢

右細末酒糊丸桐子大每服十五丸酒下食後為末酒

調亦得

羅加減何首烏散治紫白癩風筋骨疼痛四肢少力眼斷腫人鼻樑崩塌皮膚疥癬手足皸裂睡臥不安行履艱難

何首烏 蔓荊子 石菖蒲 荊芥穗

苦參 葳靈仙 甘菊花 枸杞子 略一

右為細末每服三錢蜜茶調下不拘時

聖治白癩用馬鞭草不限多少為末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢七

風濕

本治宿患風癬遍身黑色肌體如木皮膚粗澁及四肢麻痺宜服烏頭丸

草烏頭一斤入竹籬內以水浸用瓦片於籬內就水中瀧洗如打菱角法宜候瀧洗去大皮及尖控起令乾用麻油四兩鹽四兩入銚子內炒令深黃色傾出油只留鹽并烏頭再炒令黑色烟出為度取一枚劈破心內如米一點白恰好如白多再炒趁熱取羅為末用醋糊丸如桐子大每服三十九丸空心晚食前溫酒下真州資福

雜方

庸文雅白老有此疾服數年黑點頓除脚力強健視聽不衰有一宗人遍身患紫癩風身如墨服踰年體悅澤予服之一年諸風疥瘡瘍皆瘥性差熱雖云去毒要之五七日作烏頭粥啜之為佳粥法用豫章集中者佳

世紫白癩風貝母為末以胡桃肉蘸洗浴後擦之神效又方以信石好者為上研極細用真香油調如薄粥過一宿取清油傳之愈 又方用金獅草搥碎擦之累效

世又方杜六黃 飛礬 右肥皂為丸擦之 白禿 松香 製 蕪荑 黃丹 光粉 枯礬

胡坯 右末香油入姜汁少許調傳上

針灸 又法直兩乳頭以篋量過當兩臑脈絡上灸之臑絡脈俗呼為蝦蟆穴也

面瘡

藥方

大治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺用盡藥不効者惟有
此藥可治神妙不可言每以少許臨臥時洗面令淨如面
油用之數日間瘡腫處自平赤亦自消如風刺粉刺一夕
見効仍塗藥勿遮眼處

生硫黃 香白芷 瓜蒌仁 膩粉各半

全蝎 蝉蛻 芫菁 洗五枚 洗七枚去

右為細末麻油黃蠟約度如合油法火熬溶取下離
火入諸藥在內每用少許塗面上

面瘡水調平胃散塗之

治臉上熱瘡涎出以蒲黃傳上瘡

東洗面藥方治面有熱點或生瘡及粉刺之類并去皮膚
燥痒垢膩潤澤肌膚

皂角 糯米 芡苳 斤去皮 二合 八合 搗

楮實子 三奈子 縮砂 白芨 兩五 兩半 連皮 兩肥

甘松 升麻 白丁香 兩七 兩半 五錢 收煉淨 臘月

右七味同為細末訖和棗苳糯米粉及皂角末一處攪
勻用之効

面油摩風膏 麻黃 升麻根 羌活 防風 錢分 二錢 去皮 一兩 二錢

歸身 白芨 白檀 錢一 錢一 分五

右以綿裹定前藥於銀石器中用油五兩同熬得所澄
清去查以黃蠟一兩再煎熬為度

瑩肌如玉散 白芷 升麻 白芨 錢七 兩半 兩一

白丁香 香白芷 升麻 白芨 兩一 錢七 兩半 兩一

麻黃 白牽牛 當歸 白附子 錢二 兩一 兩半 二錢

白蒺藜 楮實子 白茯苓 連翹 兩一 錢四 錢三 兩半

安西是周曰表下

白藪兩 小椒兩

右為細末每用半錢多少洗之

塗點點不令生瘡

猪苓 麻黃 桂枝 白蒺藜

白附子 連翹 防風 香白芷

白藪 當歸身 升麻根 白芨

右等分為細末洗面用之臨臥唾調少許塗面上

肘療面多疔點如雀卵色以殺羊膽一枚酒二升煮三沸

塗拭之三日瘡 治面上粉刺搗兔絲子絞汁塗之

竹白附丹治男子婦人面上黑斑點

白附子兩 白芨 白藪 白茯苓

蜜陀僧 白石脂 定粉各等分研

右為細末用洗面藥洗淨臨睡用人乳汁如無用牛乳

或雞子清調和丸如龍眼大嘗乾逐旋用溫漿水磨開傳之

癩頭瘡

風熱

丹防風通聖散為末酒浸焙乾凡三次食後白湯調服日

三服至頭有汗効

世濃煎鹽湯洗三五日一洗用一上散傳之久年不愈神

効方見

用紫霄炭燒通紅入水研之又燒又焯以水熱為度

取所焯之水日日洗之使熱毒宣發而愈外以胡荽子伏

龍肝懸龍尾屋梁塵也黃連白礬為末調傳又服酒炒通聖散

効

一方單用黃連末傳之累効

王四口瘡唇瘡

熱

丹王四叔公口瘡舌強多痰

白米

甘草稍錢

人參

赤芍藥

木通

生地錢

黃連錢

瓜蒌子枚十二

右作一貼煎

羅黃連升麻湯口舌生瘡

升麻一錢

黃連三錢

右為細末綿裹含津嚥

丹治口瘡黃栢灸同細辛各二錢研極細傅之噲少時當

滿口有涎吐之少刻又傅又噲如是五七次立愈此治

鬱氣方也

羅綠袍散治大人小兒口瘡多不効者

黃栢兩

甘草兩

青黛兩

右先取二味為末入青黛同研勻乾貼

黃栢皮蜜炙與青黛各一分同為末入生龍腦一字研

勻治心脾熱舌頰生瘡當搽瘡上有涎即吐之

恒蜜栢散治口瘡久不愈者用黃栢不計多少以蜜炙灰

色為細末乾搽上臨臥忌酒醋醬犯之則瘡難愈

丹好酒煮黃連呷下立愈

木治膈上熱極口舌生瘡

膩粉

杏仁七粒不去皮尖

右二味臨臥時細嚼令涎出則吐之用溫湯嗽口未痊

可又用

治口瘡以薔薇根避風處打去土煮濃汁溫含冷易之

五倍子治口瘡以末搽之便可飲食

治口瘡以膽礬一塊用百沸湯泡開含漱一夕可瘥八

分一方用白礬湯嗽口亦妙九口瘡用西瓜漿水瘡

酸能收

實禁

其者以此徐徐飲之冬月無留皮燒灰糝之
治口瘡以好墨研躑蛄極細傅之立効胡氏躑蛄走小腸
膀胱其効甚捷因力峻氣猛陰虛氣上致瘡者戒勿用惟
體實有熱在上焦者用之如神

子和治一男子病口瘡數年上至口中至咽嗑下至胃脘
背痛不敢食熱物一涌一泄一汗十去其九次服黃連解
毒湯不十餘日皆釋

虛火

丹口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上先用理
中湯甚則加附子

本治滿口生瘡此因虛壅上攻口舌生瘡

草烏个

南星个

生姜塊

右焙乾為細末每服二錢臨臥時用醋調作掩于貼手
足心來日便愈

臍肺

丹口瘡以遠志醋研鵝毛掃患處出涎

本治口鼻生瘡用生姜一塊臨睡時細嚼含睡不得開口
出氣眠着不妨睡覺咽下

保治少陰口瘡半夏散聲絕不出者是寒遏絕陽氣不伸

半夏製一兩桂烏頭各一字同煎一盞分作二服治太

陰口瘡甘馨散以甘草二寸白馨栗子大含化咽津治

赤口瘡乳香散以乳香沒藥各一錢白馨半錢銅綠少許

研為末搽之治白口瘡沒藥散以乳香沒藥雄黃各一

錢輕粉半錢巴豆霜少許為末搽之

運氣口瘡有二

運氣

一曰熱經云少陽司天火氣下臨肺氣上從口瘍是也

二曰寒經云歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至陰厥且
格陽反上行病口瘡是也

雜方

治口瘡猪蹄殼燒為末傅之立止張氏方 治口瘡與走

馬疳茄蒂中木去皮燒存性入少白梅灰與少礬細末傅之立安精要

紅芍藥散

心病口瘡 紫桔紅蒼 三錢四兩 五服安康

右件紫苑桔梗紅芍藥蒼朮各等分為細末羊肝四兩批開摻藥末三錢用麻扎定火內燒令熟空心食之大効白湯送下

聖主小兒口瘡通白者及風疔瘡蝕透者以白姜蚕炒令

黃色拭去蚕上黃肉毛為末用蜜和傅之立効

陳主口內熱瘡以古文錢二十文燒令赤投酒中服之立

瘥

聖口舌生瘡胸膈疼痛用炒豉細末含一宿便瘥

聖治口瘡用縮砂不拘多少火煨為末摻瘡即愈又法用栳榔燒灰存性為末入輕粉傅之

千治口瘡取桑樹汁先以髮拭口即以汁傅之

垣化毒法凡口瘡無問新舊遇夜臥將自己兩丸以手攪

緊左右交手揉三五十遍但遇夜睡覺行之如此三五度

因酒而生者一夜愈久病諸口瘡三二夜愈如鼻流清涕

惡寒者攪二丸向上揉之數夜可愈

世唇瘡以甌上滴下汗傅之累効如神

羅多効散治唇緊瘡及疹

訶子肉 五倍子各等分

右為細末乾貼上効

丹唇黃泡腫烏頭炒灰研香油調傅之胡氏方 唇上生瘡

連年不瘥以八月藍葉一斤搗取汁洗之不過三日瘥千金

唇瘡

方 唇上生瘡用白荷花瓣貼之神効如開裂出血者即

針灸 口瘡 承漿 合谷 人中 長強 海泉 三稜出血 不已用後

穴 金津 玉液 各出血

又方 委中 高後谿 補此二穴乃心火 腎水二經之表

又法 膽俞 小腸俞 各灸七壯 太衝 分五 勞宮

牙疳瘡

熱 恒神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕斷肉將脫 牙落血出不止

黃連 去鬚淨 兩酒洗 縮砂仁 兩半 甘草 三錢

藿香葉 錢一 生地黄 酒浸 三錢 木香 錢一 升麻 錢二

當歸身 錢一 蘭香葉 如無藿香 葉代之

右為細末水浸蒸餅為丸藜荳大每服一百丸加至二

百丸止白湯下食後服兼治血痢及下血不止血下腸 色或紫黑色及腸澼下血空心米飲送下其脈洪大而 緩及治麻木厥氣上衝逆氣上行腰間者 治小兒走馬牙疳 見小兒 疳門

耳內瘡

少陽 恒黍粘子湯治耳內痛生瘡

桔梗 兩半 柴胡 分三 連翹 分二 黃芩 分二

黍粘子 分二 紅花 許少 歸稍 分二 生地黄 分二

蒲黃 分一 甘草 分一 黃連 分二 草龍膽 分一

昆布 分一 黃芪 分三 蘇木 分一 桃仁 錢一

生甘草 分一

右件劉如麻荳大作一服水二大盞煎至一盞去查稍 熱服食後忌寒藥利大便

少陰

治耳內生瘡者為足少陰是腎之經也其氣通於耳其經虛風熱乘之隨脈入於耳與氣相搏故令耳門生瘡也會青散主之

治耳內有惡瘡會青散

雄黃_{錢七}

會青_兩

黃芩_{二錢}

右件搗為細末研勻每用少許納耳中有膿出即以綿杖子拭乾用之

黃連散

黃連_兩

白礬_{枯七錢半}

右搗為細末每用少許綿裹納耳中

腎臟風陰瘡

風濕挾虛

無四生散治癩風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下注陰濕四散搔痒通體生瘡及婦人血風等症

白附子

蒺藜_刺 擦去

黃芪_{蜜炙}

羌活_{等分}

補中有泄

治腎臟風凡指縫白者只一二服効

黃芪_兩

木通

甘草

黑牽牛_{各半兩}

右四味細剉用班毛七枚去翅同藥炒焦黑去班毛餘

為末蒸餅糊為丸如桐子大空心鹽湯下三十丸

本治腎臟風上攻下注生瘡并癬烏頭丸

川烏_兩

草烏_{一兩二味以黑豈半升煮透軟去皮臍切晒乾}

天麻

地龍_去

白附子_{各半兩}

右為末酒糊為丸如桐子大每服二三十丸空心食前

鹽酒鹽湯任下

風熱

有一婦人患臍下腹上連二陰遍滿生濕瘡狀如馬刀他處並無熱痒而痛大小便澁出黃汁食亦減身面浮腫

醫作惡瘡治用鰻鮓魚松脂黃丹之類塗瘡上愈熱痛甚
治不對故也細問之此人嗜酒貪嚼喜魚鱗發風等物急
令用溫水洗拭去膏藥尋馬齒寬四兩研碎入青黛一兩
再研勻塗瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八正散日三服
發散客熱每塗藥一時久即乾又再塗新濕藥如此二日
減三分之一五日減二自此二十日愈既愈乃問曰此瘡
何緣至此曰中下焦畜風熱毒熱氣若不出當作腸癰內
痔仍須禁酒及發風物後不能禁酒果患內痔

寒濕

雜方

丹陰囊瘡蠟面茶末之先以甘草煎水洗後傳上妙鏡心
陰上濕泡瘡硫黃末傳之日三次梅師
千治丈夫陰下濕痒蒲黃末傳之良
丹陰瘡人屎燒灰傳之安秘要
世腎臟風甘草節湯洗極効

秘腎臟風痒不可當者吳茱萸蛇床子等分煎湯洗神効
治腎臟陰汗生瘡用莧菜根莖葉燒灰存性研細搽破傳
之立愈又蒼耳草蛇床子煎湯洗之良

緊治男子婦人陰部濕淹瘡

五倍子細研五分白礬錢一

銅綠少許

輕粉一字

乳香五分

右為極細末洗淨摻之

世治陰瘡痒痛久不止

銅錢百枚

烏梅七枚

鹽二錢

右水一碗半煎至一碗洗之無不効驗

世腎臟風瘡

血邨即百虫窠右膝內廉上膝三十陷中者

集腎臟風瘡

血邨即百虫窠針入寸半灸二十七壯

三陰交

下疳瘡

針灸

燕

有一隣人三十餘性狡而躁素患下疳瘡或作或止夏初患白痢膈上微悶醫與理中湯四貼昏悶若死片時而甦予脈之兩手皆瀉重取畧弦似數予曰此下疳瘡之深重者與當歸龍薈丸去麝四貼而利減與小柴胡去半夏加黃連芍藥川芎生姜煎五六貼而安 一男子近三十歲有下疳瘡雖屢求治以其不能忌口却之忽一日頭痛發熱自汗衆作傷寒陽証治之反劇予診其脈弦甚七至重按則澁予曰此症在厥陰藥與症不相應遂作小柴胡湯加草龍膽黃連胡黃連帶熱服四貼而病脫然 治男子耻瘡或痛在莖之竅或痛在莖之標皆手足大陽不利熱毒下傳入于足厥陰故變紫黑色作蝕瘡毀其莖而死宜以子和泄水丸散導其濕毒無不愈者若已成瘡先泄其根次從標而治外以葱白黑豈汁溲洗拭乾以黃連木

香蜜陀僧乾胭脂之類細末搽之如內潰膿不出以追膿散上之又用子和泄水丸如後竅膿少可用黃連木香胭脂等貼之

子和泄水丸一名大智丸

大戟

芫花

甘遂

海帶洗

海藻洗

郁李仁

續隨子已上各半兩

樟柳根兩

右為細末水煮棗肉為丸如小豆大每服五七十九丸熟水下

治下疳瘡先用張子和泄水去根後用此藥乾上

黃連

滑石各半兩

定粉錢三

輕粉少許

乳香錢一

蜜陀僧錢二

右細末乾上或加乾胭脂或加木香檳榔

下疳瘡

蛤粉

蜜陀僧

臘茶

苦參

青黛

右用臘脂調塗河水洗淨并治臙瘡

又方

青黛

海蛤

蜜陀僧

黃連

右為末傅上

一切熱毒惡瘡及下疳瘡用蜜陀僧黃栢皮末各一分半膩粉一錢麝香少許先洗瘡拭乾傅之甚者三四次

治下疳瘡雄黃黃連等分為末濕者乾摻乾者油調傅先用荆芥射干煎湯洗却傅之妙一方用地骨皮末傅神效

取膿

追膿錠子膿內潰不出以此藥追之

雄黃二錢

巴莖半錢

輕粉一字

嘗治一男子下疳瘡毋恣飲酒則發醫與小柴胡湯加

敷貼

黃連數貼不効又與玉燭散下之反劇予以甘草節小連中各半煎湯服之下咽痛止後以四物湯連中甘草等分與之漸安

丹陰頭瘡蜜煎甘草傅之安外臺又方用頭髮以鹽水洗淨去油再用米泔洗淨又用清湯洗晒乾燒灰傅瘡上

便結壓

世蒼耳葉為末摻之

治下疳瘡黑形兔為末傅上神効一名烏吊土一名孩兒沙

之

治下疳瘡久不愈椽斗子二箇各盛黃丹令滿相合以亂髮纏定燒烟盡為度同研為末先以葱白熱漿水洗瘡膿盡次上藥甚者不過三次如神

瘰癧人陰生瘡膿出成坎取高昌白礬麻仁等分研煉猪脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾即塗膏然後以楸

葉貼其上不過三五度瘡

下疳瘡用五倍子末傅之

婦人陰瘡

雜方

少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕爛者狼牙湯洗

之用狼牙二兩以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯

瀝陰中日三遍

太洗榻散治陰蝕瘡

甘草

乾漆

黃芩

當歸

地黃

芍藥

龜甲

右細切以水七升煮取一半去查以綿帛內湯中用榻

瘡處良久即易日二度每榻湯可作十里許即挹乾捻

取甘濕散薄傅瘡上使徧可經半日又以湯榻榻訖如

前傳藥

有一婢生此疾蝕處作兩瘡深半寸用此洗榻湯并後

甘濕散不經七日平復甚効

甘濕散

蚰蛇膽

青木香

石硫黃

鐵精

麝香

各四分臨時入用綠射辟蛇毒若先以相和蛇胆即無力也

右各等分爲末更研細有患取如三碁子大和井花水

日再服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部訖然後

取藥如碁子安竹管裏內入下部中日再度老少量減

其薰法每日一度不用再

桃枝薰法取東南桃枝五七枝輕打頭使散以綿纏之又

搗石硫黃爲末將此綿纏桃枝撚轉之令末少厚又截一

竹筒先內下部中仍以所撚藥桃枝燒熱薰之

丹女子陰瘡硫黃末傅之後

運氣
神蛇床子散濕陰中主藥用蛇床子仁一味末之以白粉
少許和令相得如棗大綿裹納之自然濕散
運氣陰瘡皆屬寒經云太陽之勝陰中乃瘍隱曲不利治
以苦熱是也

熱
瘰癧

世治瘰癧極妙地骨皮一斤黃柏皮二兩剉為粗末用香
油一斤半煎濾過藥油六七兩入淨松香二十兩黃丹二
兩同煎候黃丹微黑色却入輕粉七角光粉二角煎法
如煎膏法用長條紙拖過掛乾用若此瘡紫黑先用三稜
針去惡血以冷水洗淨隨瘡大小剪膏藥掩上用絹帛緊
緊扎縛俟一周時再換膏藥換時須用冷水洗瘡不過數
換不問新久即愈須忌日氣火氣陽氣倘換膏藥再看如
有黑腫未盡可再出血以紫黑血盡為度

治瘰癧用糯米泔嗽口過洗瘡拭乾却以地骨皮為細末
蜜調傅瘡上又以油紙縛之

丹治瘰癧

白膠香兩 黃柏兩 軟石膏另研青黛兩
龍骨分

右為細末以香油調傅患處

又方羯羊屎二分石膏一分赤石脂半分為細末香油和
之舊黑油傘紙作隔膏縛之除根

羅翠玉膏治瘰癧

瀝青兩 黃蠟 銅綠各五錢 沒藥三錢

右件先將銅綠為細末入香油調勻又將黃蠟瀝青火
上溶開次下油銅綠火上攪勻將沒藥等三味旋旋入
攪勻用河水一碗將藥傾在內用手扯拔勻油紙裹看

瘡大小分大小塊口嚼捻成餅子貼於瘡上紙封三日
易之

丹 賺瘡用砂糖水煮冬青葉三五沸滌起石壓乾將葉貼
在瘡口上一日換二遍 腳痛成瘡水蓼煎湯洗瘡候乾
自安 經驗方

山 賺瘡用韭汁洗淨挹乾剉虎骨傳上

丹 二妙丸治下焦濕瘡 但是下焦有瘡皆可服 潛行散末蒼朮末
各等分煉蜜為丸桐子大

寒濕

海 治兩賺脚膝生瘡局方虛損門服黃芪丸立安
黃芪丸

川烏頭 <small>炮去皮</small>	川練子	地龍 <small>去土</small>	茴香 <small>炒</small>
杜蒺藜 <small>炒去刺</small>	赤小豆	防風 <small>去頭</small>	黃芪 <small>剉各一兩</small>
烏藥 <small>二兩</small>			

右為細末酒煮麪糊為丸如桐子大每服十五丸溫酒
下鹽湯亦得婦人醋湯下並空心服

脚氣瘡足跟瘡

雜方

世 捷應散治脚濕氣成瘡痒不可當爬之流黃水用羯羊
糞晒乾為末安於瓦上手把竹柴火燒作灰又研細先用
葱椒湯洗之次用香油調厚傅上以山茶花葉罨之帛縛
四五日即可

丹 脚上爛瘡久不瘥先以酸漿荳腐水洗三二次尋懸鈎
担葉地暴扭葉搗細入鹽些少盪之地暴扭葉即覆盆子
葉也

海 足跟瘡久不愈毒氣攻注用白朮為細末先以鹽漿水
溫洗乾貼二日一換可以負重涉險

凍瘡

針灸

子和經曰寒瘡流水俗呼為凍瘡或經年不愈者用野中
淨土曬乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡
口大小貼之以艾火加於餅上灸之不計壯數以泥乾為
度去乾餅子再換濕餅子灸不問多少直至瘡痂覺痛痒
是瘡可治也然後口含漿水洗清用雞翎二十莖縛作刷
子於瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也以軟帛拭
乾用木香檳榔散傅之如夏月醫之尤妙

世足跟紅腫凍瘡

足跟左足指面後跟赤白肉際骨下刺入三分彈針出血可灸二十七

足跟凍瘡潰破用椒葱湯洗刮去腐肉用三稜針出血將
馬屁勃入生牛骨髓調和傅之効

雜方

治凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之
取臘月牡鼠死者一枚油一大升煎之使爛絞出查

再煎成膏塗凍瘡及折破瘡

丹治凍瘡用煎熟桐油蜜陀僧傳

山用五倍子煎湯洗

止痛

羅如神散治凍瘡皮爛不可忍用川大黃不拘多少為細
末新水調掃凍破瘡上痛止立効

世治凍瘡痛者橄欖核燒存性為末用香油調塗患處其
痛隨愈

痛隨愈

子如戴人女僮足有凍瘡戴人令服舟車丸瀋川散大下

之遂愈人或疑之戴人云心火降則寒消何疑之有

人火手足皴裂脚縫爛

羅潤肌膏治手足皴澁皮膚裂開疼痛不能見風

珠子瀝青兩四白黃蠟錢八乳香錢二

右三味於鐵器內用文武火熬下瀝青在鐺內隨手便

下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀝青盡溶開微
微熬動放大淨水一盆於其傍以攪藥用匙取一二滴
滴於水中試之如硬再入油如軟硬合宜用新綿摠淨
入水中折疊扯之以白為度油當旋旋入勿令軟了以
磁器內盛之或油紙裹亦得每用不拘多少先於火上
炙裂子口却捻合裂子藥亦火上炙軟塗於裂子上用
紙少許貼之自然合矣

取老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車者皮膚皴
裂甚痛兩手不能執轆足不能履地而車上宿制此藥傳
之即効明日遂行自後屢用屢効故錄於此

世治手足皴裂春夏不愈者
生薑汁 **紅糟** **白鹽** **猪膏**
右研爛炒熱擦入皴內一時雖痛少頃便皮軟皴合再

用即安

丹手足寒皴裂台椒三四合煮浸半食頃須臾再浸又傳
以羊猪髓腦甚妙

世治腳跟皴裂用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候
油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰入每用百
沸湯泡洗皴裂令軟傳其上即安一方加水粉

世脚裂爛蒸藕研成膏傳之
世用五倍子為末同牛骨髓填縫內即好治脚指縫爛瘡
搗鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒存性為末濕則搽之

反花瘡
瘡有努肉凸出者是也

世諸瘡努肉如蛇頭出數寸者碗黃末傳之即縮
聖惠方
瘡有肉凸出烏梅燒灰為末傳之立盡
聖惠方
又以白梅肉杵細入蜜捏成餅如錢大貼之妙
聖惠方

雜方

梅又方治反花瘡馬齒莧一斤燒灰細研猪脂調傅
世瘡凸出寸許根如小豈或大如梅者用花腳蜘蛛絲纏
其根則漸乾而自脫落

惡瘡

羅乳香消毒散專治惡瘡

大黃煨

黃芪

牛蒡子炒

金銀花各五兩

甘草兩

牡礪鹽泥煨

沒藥

懸菴各半兩

右為粗末每服五錢水煎瘡在上食後在下食前

海惡瘡入腹心嘔逆藥食不下

荳粉兩

乾胭脂錢

定粉二錢

右細末新水調下神効

雜方

碧霞挺子治惡瘡神効了不覺疼痛者

銅綠

礪砂各錢

蟾酥錢

右為細末燒飯和作麥蘖挺子每刺不覺痛者須刺出血方繼藥在內以膏藥貼之

蝕惡瘡方非奇異惡瘡不可用

銅綠二錢

礪砂字

石膽礬半錢并細研

右為細末傅之

治惡瘡或有小虫

膽礬錢

龍骨二錢半

輕粉錢

虎骨

白礬二錢半

麝香五分

乳香錢

礪砂二錢

腦子字

土蜂房二錢

露蜂房二錢半

雄黃二錢

右細末刺破鹽水洗看緊慢上藥神効

雜瘡

世治蒲萄瘡瘡頭如蒲萄色四圍腫起先追膿盡次用水

雜方

梅當瘡頭毒之神愈

本江左有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺臍肉脹起或不食之則臂痺有善醫者教其歷試諸藥無苦至具毋其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒磨貝母水灌之數日成痂遂愈不知何疾也

天泡瘡通聖散及蚶蛎泥畧炒蜜調傅妙從肚皮起者裏熱發外速服通聖散

公天行斑瘡須臾遍身皆戴白獎此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉以蒜蘸啖之即止
孫卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傅

手太陽之别名曰支正上腕五寸虛則生疣小者指痂疥

取之所別也全文見針灸虛實

四手足生疣目鹽傅上舌舐之只三次瘥後肘

世疣用雞胃中食措疣上指餘者以石壓之驗

痣

世取痣餅藥

糯米百粒 石灰搗指大 巴荳三粒去殼研

右為末入磁瓶同管三日每以竹簽挑粟許點上自然蝕落

取取壓

風化石灰兩 花碱半兩

右為細末上三次如天色冷濕用

術石灰水調一盞如稠粥揀好糯米全者半置灰中半置灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑壓子及

紋刺者先微微以針頭撥動置少許於其上經半日許膿汁自出剔去藥不用且不得着水二三日愈 又方用水蛭一條雞子一枚開雞子小頭內水蛭以皮兒蓋合封之

直水蛭食盡雞清乾盡自死乃用之

擷撲傷損

金瘡

杖瘡

湯火傷

竹木刺針入肉

箭入肉

漆瘡

法

凡擷傷皮破血出處疼不可忍乃風寒所着宜用葱杵碎入鹽少許炒熱卷上其痛即住冷則再溫之

本崔給事頃在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按毬子其將軍以杖相格乘勢不能止因傷李相姆指并爪甲劈裂遽索金刀藥裹之強坐頻索酒飲至數盃已過量而面色愈青忍痛不止有軍使言取葱新折者入溲灰火煨熱剝皮擘開其間有涕取瘡損傷處仍多煨葱續續取

熱者凡三易之面色却赤斯須云已不痛凡十數度易用

熱葱并涕裹纏遂畢席笑語

海治腦骨破及骨拆葱白爛研和蜜浮封損處立瘥 筋

斷骨折者以法接之

接骨方

世治擷撲筋斷骨折用粟米半升木鱉肉二十箇半夏半兩婦人髮一團葱白鬚一小束同炒烟盡存性爲末熱醋調傅神効 治擷撲筋斷骨折用糯米一升皂角切碎半升銅錢百箇同炒至半焦黑去銅錢爲末用好酒調膏厚紙攤貼患處神効

打撲傷損及一切腫癰未破令內消方

生地

研如泥

木香

細末

右以地黃膏隨腫大小攤於紙上摻木香末一層又再攤地黃膏貼腫上不過三五度即愈昔許元公入京師

赴省試過橋墜馬右臂曰脫路人語其僕曰急與接入
白中若血漬白則難治矣僕用其說許以昏迷不覺痛
遂僦轎昇歸邸或曰非錄事巷田馬騎不能了此疾急
召之至巳日暮因秉燭視其面曰尚可治乃施藥封此
處至中夜方甦達旦痛止去其封損處已白其青瘀乃
移在白上自是日日易之腫直至肩背以藥下之瀉黑
血三升五日復常遂得赴試蓋用此法去

世走馬散治折傷接骨

栢葉生

荷葉生

皂角生

骨碎補去毛

右為末先將折傷處揣定令入元位以姜汁調藥如糊
攤紙上貼骨斷處用杉木片夾定以繩縛之莫令轉動
三五日後開看以溫葱湯洗後再貼藥復夾七日如痛
再加沒藥

本治腕打傷筋損骨疼痛不可忍

生地一斤

藏瓜姜糟一斤

生姜四兩

石都炒令勻熱以布裹罨傷折處冷則易之曾有人傷
折宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢見龜告曰勿相
害吾有奇方可療於夢中授此方神効

本骨碎補罨閃折筋骨折傷取根搗碎煮黃米粥和之罨
傷處良

接骨丹敷貼藥

天南星四兩

木鱉子四兩

沒藥半

官桂一兩

乳香半兩

右為細末姜一斤去皮爛研取自然汁入米醋少許白
麪為糊同調攤紙上貼傷處以帛縛之用篋夾定麻索
子纏

山 擷撲骨肉損醋搗肥皂爛厚罨之以帛縛之閃傷醋糟
平胃散相和罨之

治擷傷骨折及血黯方用益元散七分人參湯調之次
用姜汁好醋二盞用獨子肥皂四箇敲碎接於姜汁醋中
調和以綿濾過去查煎成膏藥貼之遍身亦可

本 又方柑桔葉白酒糟杵細縛痛處或大段痛用火燒地
令紅用醋并米泔撥地上急鋪荐令患人荐上臥蒸出汗
內則服藥外則貼罨易安

勝金 治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用綿裹血立愈
折傷接筋方旋覆花根杵汁滴傷處又將查封瘡上十
五日使斷筋自續矣蘇良仲方即金
沸草根是也 接骨用好無名異

三兩為末丁乳檀沉香五香各半錢重為末先燒鐵銚紅
以五香三之一彈入銚內候烟起則全下無名異待滾退

火定後再上火炒熱又將五香彈三之一彈入銚內候滾
又退火如此者凡三次訖出火毒即用骨碎補去毛約一
斤與生姜等分搗爛以碗覆之候發熱先約取五之一入
小葱九莖連鬚去蒂同入沙盆搗細取其汁調前無名異
末二錢衝老酒服之其查罨患處即愈如年老氣衰者再
作一劑多飲酒力助之為妙

治擦落耳鼻用髮入碓子鹽泥固濟煨過為末乘急以所
擦落耳鼻蘸灰綴定以軟絹縛定效江懷禪師為驢所咬
下鼻一僧用此綴之効

山 負重擔肩破者剪猫兒頭上毛不語唾粘之 遠行脚
打泡用調生麪糊貼過夜即乾不可擦破又法用飯粘貼
過夜以紙蓋之次日平復神効

海 若登高下重物撞打箭鏃刃傷心腹骨中停積鬱血不

傷分三
部用藥

肩穿法
脚破法

散以上中下三焦分之別其部分上部易老犀角地黃湯
中部桃仁承氣湯下部抵當湯之類下之亦有以小便酒
同煎治之更有內加生地黃當歸煎者有大黃者又法
虛人不禁下者以四物湯加川山甲煎服妙亦有花蓋石
散以童子小便煎或酒服之者此藥與前寒藥正分陰陽
不可不辨也若瘀血已去用復元通氣散加當歸煎服亦
可

無裡症
若虛者
但行補
接

接骨神效無比累驗用當三錢一百零八箇錢厚字以連草者以
鐵線穿定用活桑木一根作柴燒錢紅米醋一大碗未煎
者不入鹽將所燒錢焯入醋中如此焯之以醋乾為度取
醋中焯落銅錢末就用醋洗去灰晒乾為極細末再用黑
雄雞一隻清湯煮熟去肉用骨一付以醋炙酥為末入乳
香沒藥各一兩與銅錢末一處和勻每服一字臨服時用

患人髮在頂上者洗去垢燒灰入藥中無灰酒調服不吐
只一服如吐出再服如痛止不可再服必須先夾縛所折
骨端正用楊樹皮刮去肉糊并外粗皮傳之下咽便不痛
五七日便能運動必終身忌葷薺一名地栗義門家傳方
一方用五銖錢醋焯一兩二錢黑雞骨三兩研細勻每服
病在下四錢踈服食前病在上二錢半頓服食後一方有
乳香沒藥

接骨散方用醋焯半兩錢蘇木定粉南鵬砂各一錢為末作一
服當歸酒二三服痛止勿服

沒藥	乳香 <small>各五錢</small>	自然銅 <small>醋焯一兩</small>	滑石 <small>二兩</small>
龍骨 <small>錢</small>	赤石脂 <small>錢</small>	麝香 <small>後入</small>	白石脂 <small>錢</small>

右為細末以好醋浸沒煮多為上候乾就炒燥為度臨

服入麝香少許挑小茶匙在舌上温酒下病分上下食
前後服若骨已接尚痛去龍骨石脂而多服儘好
世 又方接骨

乳香

沒藥

蘇木

降真節

川烏去皮

松明節兩

自然銅米醋煨

龍骨半兩

地龍去土麻油

血竭錢

龍骨生用

水蛭油炒半兩

土狗十个油

右爲細末每服五錢酒調下在上食後在下食前

定痛乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍腹中疼痛

乳香

沒藥

雄黑荳

桑白皮

獨科栗子各一兩

破故紙炒二兩

當歸一兩

水蛭兩半

右爲末每服五錢醋一盞沙石器內煎至六分入麝香

少許温服

定痛接骨紫金丹

麝香

沒藥

紅娘子錢各半

烏藥二錢

地龍去土二錢

草烏炮各一兩

五靈脂去皮半兩

木鱉子去壳半兩

黑牽牛生用五分

骨碎補

歲靈仙

金毛狗脊

防風去

自然銅醋煨七次

各五錢

禹餘糧碎四錢

陳皮

青皮各二錢半

右爲細末醋糊丸如桐子大每服十九至二十九温酒

送下病上食後病下食前服

聖靈丹治一切打撲損傷及傷折疼痛不可忍者並宜服

之

乳香錢五

烏梅去核五個

白米撮

蒿苳子一大盞

取二兩

醫學綱目卷三

聖靈丹

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼熱酒吞下食後一伏時痛不止再服

經治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下一錢食

頃痛更一服痛止便將接骨藥封以物夾定直候至好

初虞世治從高至下墜及打擊內傷神効麝香水蛭各一

兩剉碎炒烟出二件研為細末酒調二錢當下畜血未止

再服其効如神

衍自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去令人打撲損傷研極

細末飛過用當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛

處

海治墜落車馬筋骨疼痛不止用玄胡索一兩搗羅為散

不計時服以荳淋酒調下二錢

本童便治卒血及心被打內有瘀血者煎服之一服一升

山擲撲傷損松節煎酒喫 擲撲重傷用生姜自然汁四

兩香油四兩打勻無灰酒熱調下

右乳香沒藥行汚血調氣例衍義云沒藥通滯血打傷

撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅瘀氣壅瘀則經絡

滿急經絡滿急故痛且腫矣道而行之則痛腫消焉

丹打損磕傷疼痛夜合花末服之酒下二錢七効

治打撲損傷折骨此藥專能接骨

夜合樹 即合歡花去粗皮炒黑色四兩 芥菜子 炒一兩

右為細末酒調二錢澄清臨臥服以粗查罨瘡上扎縛

之

又方用葱白砂糖二味相等分爛研傅之痛立止且無癢

痕 **丹**白蠟屬金金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血

定痛接骨續筋補虛與合歡皮同入長肉膏藥用極神效
但未曾試可為藥餌否若合歡皮常試之灸服之大有妙
理且有速効不可不知也

本治打傷接骨方

接骨木 半兩本草
名蒺藜

乳香 兩

赤芍藥

當歸

川芎

自然銅 各一兩

右為細末同黃蠟四兩溶入前藥末攪令勻候溫軟衆
手丸如龍眼大如打傷筋骨及閃拗着疼痛不可忍者
用此藥一丸無灰熱酒一盞浸藥候藥潰開乘熱呷了
痛便止若大段傷損碎拆須先整骨用川烏草烏為末
等分生姜汁調貼之又將帛縛定然後服此藥表裏
兩治無不効者此二方是一副不可分開
治打撲內損筋骨疼痛

沒藥

乳香

芍藥

川椒 去子
閉目者

川芎

當歸 各半兩

自然銅 三錢
火煉

右為細末用黃蠟四兩溶開入藥末不住手攪勻濕丸
如彈子大每服一丸用好酒煎開消盡乘熱一服吃盡
看那處痛向痛處臥霎時服三五丸立効

濟治破傷見血酒一碗煎服

半兩當歸蠟二錢

合來搥碎酒同煎

直須軟冷連查吃

一切傷瘡保萬全

右夜合黃白蠟例接續筋骨補虛也

固破血消痛湯治乘馬損傷跌破脊骨惡血流下脇下甚
痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活 錢一

防風 錢一

蘇木 半錢

柴胡

連翹 錢二

當歸 稍錢二

官桂 錢一

麝香 少許
另研

水蛭三錢炒去烟

右為粗末只一服酒一大盞水一盞水蛭麝香另研如泥餘藥煎至一大盞去火稍熱調二味服之兩服立愈

中風有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不行下積於脇下則傷肝又中風及有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾又頭痛不可取于諭者有所擊墮惡血在內若肉傷痛未已可側刺不可遠取之也邪氣臟腑及厥病篇

夫從高墜下惡血流於內不分十二經絡醫人俱作中風肝經留於脇下以中風瘵之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有自汗但人人有汗出皆屬風証諸風皆屬於肝木况敗血凝泣逆其所屬入於肝也從高墜下逆其上行之血氣非肝而何非傷寒無汗既曰汗必自風化之也故以破

血行經藥治之

有裡症裡實者攻裡

脇下痛者血在肝

復元羌活湯治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不可忍者經云有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不行下損於脇則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸活血脈又急者痛也以甘草緩其急亦能生新血陽生陰長故也為臣川山甲括萋根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以蕩滌敗血為之使氣味相合各有所歸痛自去矣

柴胡錢五

當歸錢三

甘草錢二

川山甲錢三

大黃酒浸一兩

桃仁去皮尖紅

花錢二

瓜萋根錢三

右件桃仁研爛餘藥剉如麻荳大每服一兩水二鍾酒半盞煎至七分去查大溫服食前以利為度得利後痛或不盡服乳香神應散乳香神應散見前無裏証條

昏冒者
血冲心

巴戟湯治從高墜下及打撲內損昏冒嗜臥不能飲食
此謂血閉臟腑不通

巴戟去心半兩 當歸 地黄 芍藥

川芎各一兩 大黃兩半

右為末水煎以利為度

恒當歸導滯散治打撲損傷落馬墜車瘀血大便不通紅
腫青黯疼痛昏悶畜血內壅欲死

大黃兩 當歸分 麝香少許

右三味除麝香別研外為極細末入麝香令勻每服三
錢熱酒一盞調下如前內瘀血去或骨節傷折疼痛不
可忍以定痛接骨紫金丹治之

大小便
之不利

奪命散治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積
心腹疼痛大小便不通

水蛭用石灰拌煨火炒令乾黃色半兩

黑牽牛二兩

右為末每服二錢用熱酒調下約行四五里再用熱酒
調黑牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡為度

無雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積
氣絕欲死煩躁頭痛叫呼不得並以此藥利去瘀血治折

傷神妙

大黃一兩 桃仁二七粒

右研細酒一碗煎至六分去查雞鳴時服次日取下瘀
血即愈若便覺氣絕不能言取藥不及急擊口開用熱

小便灌之即愈

羅氏花蓋石散治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損猶狗咬
傷或至死血瘀傷處以藥摻之其血化為黃水再摻藥便
活更不疼痛如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許調

一大盞服之立効若牛舐腸出不損者急內腸入用細系
或桑白皮爲線縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無桑白
皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以
津液潤之然後摻藥婦人產後敗血不盡血迷血暈惡血
奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭覺暖急以童子
小便調一盞取下惡物如肝片終身不患血風血氣証若
膈上有血化爲黃水卽時吐出或隨大便出

石硫黃兩 花蕊石兩

右二味相拌合勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦礮子一箇
內可容藥候泥乾入藥在內再用泥封口候乾安在四
方磚上上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自己午
時從下着火漸漸上徹直至經宿火冷炭盡又放經宿
礮冷取出細研以絹羅子羅極細磁盒盛之依法使用

本治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛水仙散

未展荷葉陰乾一味爲末食前以童子熱小便一小盞
調下三錢以利下惡物爲度

聖治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以大乾荷葉五片燒
令烟盡細研食前以童子熱小便一小盞調三錢七日三

服

塞上方治墜傷損撲瘀血在內煩悶者用蒲黃末炒熱
酒調下三錢瘥

本宣和中有一國醫忽承快行宣押就一佛刹醫內人醫
診視之已昏死矣問其從人皆不知病之由惶恐無地良
久有二三老內人至下轎環而泣之方得其實云因蹴鞦
韆自空而下墜死醫者云打撲傷損自屬外科欲申明又
恐後時參差不測再視之微覺有氣忽憶藥篋中有蘇合

香丸急取半兩於火上焙去腦麝用酒半升研化灌之至
三更方呻吟五更下惡血數升調理數日方瘥

神治馬墜及一切筋骨損傷

大黃一兩切湯浸或半兩

緋帛

亂髮如雞子大燒灰

敗蒲席三

久用炊單布一尺燒灰

桃仁四十九個去皮

尖

甘草如中指節灸到

右七味以童子小便量多少煎湯或內酒一大盞次下

大黃去查分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯浴以衣被

覆斯須通利數行通後立瘥利後浴水赤勿怪即瘀血

也

復損愈後青腫

聖治搯撲損肌膚青腫用茄子種通黃極大者切作片如
一指厚新瓦上焙乾為末欲臥酒調二錢七一夜消盡無

痕

本療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蠶虫二十一
枚煨過同搗篩每用溫酒和散方寸七服血當化為水下

丹治被打瘀血在骨節下出者生鐵一斤酒五升煎取一
升飲之後肘

升飲之後肘

本治從高墮下墜損惡血在骨節間疼痛芸臺散

荆芥

藕節各二兩陰乾

芸臺子

川芎

馬齒莧各一兩陰乾

藕節各二兩陰乾

芸臺子

川芎

右為細末用蘇木半兩酒一大盞煎至七分調下二錢

服之不拘時服

聖盛官人因上山惡血瘀入內損傷食少脈弦此須用活

血和氣

川芎三錢

青皮二錢

芍藥

滑石各一錢

牡丹皮五錢

炙甘草一錢

桃仁七枚研

右作一貼服之

禁忌
針灸

凡傷切不可飲冷水血見寒則凝但一系血入心即死
人有所墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥
此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之
前血脈出血刺足跗上動脈不

則已左刺右右刺左善悲驚不絕
身有所傷血出多及中風寒若有所墜墮四肢懈墮不
收名曰體惰取小腹臍下三結交者陽明太陰也臍下三

寸關元也寒熱篇○三結交者即關元穴是也

脈從高撲損內有血腹脹滿其脈堅強者生小弱者死

診

金瘡

治金瘡止血除疼痛辟風續筋骨生肌肉地黃散

地黃苗 地崧 青蒿 蒼耳苗

雜方

生艾汁合

赤芍藥各五兩入水煎取汁

右五月五七月七日午時修合以前藥汁拌石灰陰乾
入黃丹三兩更杵為細末凡有金瘡傷折出血用藥包
封不可動十日瘥不腫不膿

世治金瘡風化石灰菲葉嫩者同搗入鵝血調和成餅乘

風陰乾為末無鵝血亦得傳上治金瘡血不止用半夏石灰

鬱金三物為末傷處即住

療金鎗刀斧傷破血以石灰一升石榴花半斤搗取末

少許捺少時血斷便瘥

末藥散刀箭藥止血住痛

定粉

風化灰各一兩

枯礬三錢另研

乳香五分另研

沒藥一字另研

右件各研為細末同和勻再研摻之

刀斧傷石灰包之痛止血住

精勝金方治刀斧傷止血生肌蚕蛾散晚蚕蛾為末摻勻

絹帛裹隨手瘡合血止一切金瘡亦治 一法用生晚蚕

蛾石灰二味同搗成餅陰乾為末傅之

本治金瘡止痛劉寄奴散

劉寄奴一味為末散摻金瘡口裏昔宋高祖劉裕微時
伐荻見大蛇長數丈射之傷明日復至聞有杵臼聲往
覘之見青衣童子數人於臼中搗藥問其故答曰我正
為劉寄奴所射合藥傅之帝曰神何不殺之答曰寄奴
王者不死不可殺帝叱之皆散收藥而去每遇金瘡傅
之効寄奴高祖小字也此藥非止治金瘡治湯火瘡大
妙經驗方云劉寄奴為末先以糯米漿雞翎掃着傷處
後摻藥末在上並不痛亦無痕大凡湯火傷急用鹽水

洗之護肉不壞

世治金瘡打撲損傷用菴黃草研細入鹽少許罨之愈

金瘡血出不止按小薊葉封之 金瘡止血杵覆盆花苗

傅瘡立止

治金瘡血不止兼痛用血竭末傅立止

治惡瘡金瘡刀斧傷見血方以好降真香為末貼之入

水並無傷痕絕妙

檳榔 木香 胡地黃

右為末傅瘡口血立止又可接骨

金瘡方王不留行散主之

王不留行 蒴藋細葉

桑根 甘草

川椒 乾姜 芍藥

瘡大者服藥

厚朴各二分

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令過各別研杵篩合治為散服方寸匕小瘡即粉之夫瘡但服之產後亦可服如風寒桑東南根勿取之前三物皆陰乾百日用

廣金瘡血不止痛白芍藥一兩整令黃杵細為散酒後米飲下二錢並得初三服漸知

鬼治金瘡出血肉癢蝙蝠二枚燒烟盡以水調服方寸匕令一日服盡當下如水血消 金瘡腸出欲入之磁石滑

石各三兩為細末白米飲送下方寸匕日再用鬼遺方

仲景問曰寸口脈微而瀋法當亡血若汗出設不汗者云何答曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也

脈金瘡血出太多其脈虛細者生數實者死 金瘡在陰

處出血不絕陰脈不能至陽者死接陽而復出者生 金瘡出血脈沉小者生浮大者死 斫瘡出血一二石脈來大者二十日死 斫刺俱有病多少血出不自止斷者其脈止脈來大者七日死滑細者生

河鬼代丹治打着不痛 杖瘡

無名異研 沒藥研 乳香研 地龍去土

自然銅醋炒 木鱉子去殼

右為末煉密丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

精乳香散治杖瘡神効

自然銅半兩醋炒七次 乳香三錢 沒藥三錢

茴香四錢 當歸半兩

右為細末每服五錢溫酒調下

藥汚血服

敷貼

雞鳴散下杖痛腹中惡血甚好方見擲撲傷損
五黃散治杖疼定痛

黃丹 黃連 黃芩 黃柏

大黃 乳香已上各等分

右為細末新水調成膏用緋絹帛上攤貼

沒藥散治杖瘡止痛令瘡不移

蜜陀僧 沒藥 乳香各一兩 乾胭脂半兩

膩粉兩半

右細末次入龍腦少許若多更妙燒葱與羊骨髓生用同研如泥攤在緋帛上貼之

丹杖瘡痛用黃栢生地黃紫荊皮敷此皆要藥也只是血熱作痛用涼藥去瘀血為先須下雞鳴散之類雞鳴散方損條本草紫荊破宿血

又方用生地黄黃栢童便調傅或加葑汁 不破者以

菜葱頭杵貼冷即易之膏藥用紫荊皮乳香沒藥地黃

大黃黃栢之類 又方用木耳盛於木杓內用沸湯浸爛

攪水令乾於砂盆內搗細傅瘡上 又方用大黃黃栢為

末生地黄汁調傅如乾再傅 又方用野苧根嫩者不拘

多少洗淨同鹽併搗傅在瘡上神妙傷重多用鹽

世杖瘡丹用劉寄奴末六錢馬鞭草末四錢蜜調傅如濕

者乾摻馬鞭草即鉄筴帶此方甚妙

湯火瘡

世凡湯火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛慎勿以

冷物塌之及井底泥傅之使熱氣不出爛入肌肉

世火燒以好酒洗之又以鹽傅其上如皮塌者以酒熬牛

皮膠傅之 如湯傷以淋過第二次灰查傅立安 熱酒

初反治

傷糯米粉炒黑末酒調傅之 治湯火灼未成瘡者用艾
白根燒灰雞子黃和傅之如成瘡用白蜜封之以竹中膜
貼上日三

世治湯火瘡麩皮炒黑灰為末傅上神妙此方有補性始
終皆可用 治湯火瘡取舊烹銀爐中燒過焦黃土研細
如粉以生姜調於帛上貼之痛止一方用溶銀鍋子細末
油調傅佳

治火瘡未起梔子仁燒灰麻油和封之厚乃佳已成瘡
燒白糖灰粉傅之燥即瘥 用白糖
葛氏方

保生救苦散治火燒熱油所損或至肌肉亦脫一切犬
噬損傷并刀斧所傷用生寒水石不計多少為極細末調
塗之或乾上然不如油調其痛立止並不作膿無分毫厘
苦楚日近完復永無破傷風症

中正治

精水霜散治火燒皮爛大痛

寒水石 生 牡蠣 燒 朴硝 各等 青黛

右為細末新水或小油調塗立止

治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂 寒水石 大黃 各等

右為末以新汲水調塗傷處

治火燒 桐油 水銀 各等

右二件以柳條不住手攪成膏再入大黃末石膏末和
以牛皮膠入少水溶開外用貓兒肚底毛細剪摻上貼
之
羅綠白散治湯熨火燒疼痛用苦參不拘多少為細末每
用以小油調搽

凡被湯熱油痛不可忍取厠下黑淤泥量傷大小斟酌多少次以老姜汁麻油十分之一共研令勻搽傷處立愈

世以青黛傳之妙

宋補

世治湯火瘡爛者以黃蜀葵花者淨器收之入水些少待爛成水傳上神妙熱油澆外痛以密傳之立安

本治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和塗之

經治湯火瘡至妙用劉寄奴為末先以糯米漿雞翎掃傷處後搽藥末在上並不痛亦無痕大凡湯傷先用鹽末搽之護肉不壞然後傳藥又方以榆白皮末猪脂油塗瘡

愈

世治火湯瘡先以酒洗次以楊梅樹皮為末香油調傳

治湯火瘡用髮一束香油煎以髮盡為度放冷搽患處驗

精治中熱油及火燒除外痛以丹參八兩細剉以水微調

取羊脂二斤煎三上三下以傳瘡上愈梅師方同治湯火至聖膏用雞子黃十箇入銀石器內熬自然油調好粉傳之愈

竹木刺針入肉

雜方敷

精凡諸竹木刺入肉中不出以躑躅研傳立出又方用白茅根搗傳之立出又方嚼牛膝根罨之即出

簡治竹木刺扎入深不得出用烏羊糞搗爛水和罨於傷處厚傳之曾有庄僕腳心中刺不得出苦痛欲死以此藥黃昏傳之至四更其刺出遂安

山蘆葦刺入肉者細嚼栗子查盒傷處木竹刺已出痛者躑躅罨之妙

簡治針入肉不出用躑躅腦子同硫黃研細調傳以紙花貼定如覺癢時其針自出

羅神聖膏取針俛入皮膚用車脂不拘多少成膏攤紙上如錢許二日一換三五次其針自出 又取針俛入皮膚用烏鴉翎三五枚火炙焦黃色碾為細末好醋調成膏子塗在瘡上紙蓋一二時針出効

治針入肉不出用雙仁杏仁搗爛以車脂調勻貼在瘡上其針自出

世治秀針刺足已出痛者用黃泥卷之

簡主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出者水煑白梅肉研爛調象牙末厚傅骨刺處自軟

圖生象牙主諸物刺入肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立出如咽中刺用水調飲之舊象梳屑尤佳

益魚骨在肉中不出者嚼吳茱萸封之骨當爛出

丹破傷風血凝心針入肉游走三症如神方用烏鴉翎燒

內服方

雜方

灰存性研細調一錢服
精治箭鏃入骨不可拔者
東南巴苳去壳微熬 螻螂
并研勻塗所傷處須更痛定又微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃拔之立出方同

緊出箭頭方
馬全不拘多少 麝香
右為極細末撥動箭頭摻藥瘡口內

羅踴鐵膏取箭頭一切針刺入肉盡皆治之
鼯鼠頭一個或兩個 巴苳
主消虫个 馬肉內蛆 磁石

醬蛆乾 夏枯草 硃砂

黃丹

地骨皮

蘇木

螻蛄各一兩

石腦油三兩

蒿柴灰汁三升

右將石腦油蒿柴灰汁文武火熬成膏次下地骨皮等末令勻磁器內收臨時用量瘡勢大小點藥良久箭頭自湧出

萬全神應丹出箭頭魚骨針麥芒等遠近皆治之

葭蓉科

即天仙苗也

於端午日前一日持不語戒遍尋上項科見即取酌中一科根枝葉實全者口道先生爾卻在這裏道罷用柴灰自東南為頭圍了用木篋子擲起周迴土次日端午日日未出時依前持不語用木槩只一槩取出水洗淨不令婦人雞犬見淨室中石臼內搗為泥丸如彈子大以黃丹為衣以紙袋封懸在高處陰乾若有着箭不能出者以緋絹袋

盛此藥一九放臍中用綿裹肚繫定先用象牙末貼瘡上後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之隨出陝西行省出軍曾用有效

精孫真人治箭鏃在咽喉胸膈及針刺不出方以螻蛄搗

取汁滴上三五度箭頭自出

本療鏃不出搗瓜蔓根傳瘡日三易自出

世李渤治箭鏃不出及惡刺以齒塗和鶴虱傳之

外毒箭有二種交廣夷俚用焦銅作箭此一種纔傷皮便悶膿沸爛而死若中之用飲屎汁并以傳之亦可惟此最妙又有一種用射筒以塗箭鏃入中之亦困若着寬處不死近腹亦宜急治今葛氏方治射筒者是葛氏方用藍汁大豈猪羊血解之

漆瘡方

雜方

一療漆瘡方用湯浸芒硝冷洗之又礬石亦可

二漆瘡通身面目腫者亦治苦菜五月五日採曝乾食療云生食亦可漢椒湯洗之妙 生姜真汁傳亦可芙蓉音煥本草有

三治漆瘡用生紫蘇摩擦之累効 又方用人乳汁傳之妙

再即瘥 再即瘥 再即瘥 再即瘥 再即瘥 再即瘥 再即瘥 再即瘥 再即瘥 再即瘥

山漆瘡無名異水調傳

通治諸般惡虫蛇咬 毒蛇咬 蜈蚣咬 蠅咬

蝎咬蜂螫 斑蜘蛛咬 刺毛虻蜋蝥蝥咬

羅聖惠治蛇咬蝎螫蚕咬妙

表裏初吹用藥敷貼

雄黃錢

信錢

皂角子

巴荳各四十粒

耳塞

麝香各少許

右五月五日不開雞犬婦人處不語搗為細末在杏子

核內封之針挑出上痛處大有神効

世治一切蛇虫傷具丹末酒調服効詳見蛇咬

聖治惡虫咬以酥和鹽傳之瘥

山諸般惡虫咬以油浸紫草塗之

丹治蛇咬蚕咬惡虫咬猪膏搗汁傳陳藏器治狗咬

海治蝎蜘蛛蛇毒雞卵輕敲一小孔合咬處即瘥

毒入腹

勝治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹

內成塊逡巡不救用蒼耳嫩葉一握研取汁温酒和灌之將滓厚罨所傷處

圖治毒蛇射工沙虱等物傷着人眼黑口噤手足強直毒

氣入腹

白礬

甘草等分

右為細末每服二錢冷水調下

毒蛇咬

初傷解毒法

世治毒蛇傷急以小便洗出血次取口中唾塗之又以牙

塗封傷處傳而護之甚妙且不痛腫山君云用大葉傳患處亦佳

世路行卒被蛇咬當急扯裏腳帶扎縛傷處上下寸許使

毒氣不能快信體又急用白礬安刀頭火上溶汁沸滴

於傷處待冷以長篦子速挑去腐則毒血隨出點腫尚未

退更滴之以退為度村君山僻及途中夜行卒被蛇傷

咬難求白礬處速作艾炷灸五壯以唾調鹽塗之如點腫

尚未消釋當更灸更搽毒涎自然流出且不透裏傷人宜灸

世治一切毒蛇咬用透明雄黃研細末以醇酒濃調厚搽

傷處水流出如涎痛腫即消一方以蒿苳汁和雄黃末作

餅子候乾為末每用少許貼瘡口立効

世有人被毒蛇所傷已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之

遂甦及以藥滓塗患處良久復灌二錢其苦皆去問之乃

五靈脂一兩雄黃半兩同為末止此耳後有中毒者用之

無不効驗

世治毒蛇所傷

細辛錢五 香白芷錢五 雄黃錢二

右為末加麝香少許每服二錢温酒調服効

世治一切蛇咬用香白芷嚼碎傳患處又用温酒調服効

世治一切蛇虫所傷用貝母為末酒調令病人盡量飲之

頃久酒自傷處為水流出候水盡却以藥滓傳瘡上即愈

治蛇咬腫毒悶欲死者用重臺六分續隨子六顆去皮同

為細末以酒服方寸匕又以唾調少許傳患處立安崔氏

雄黃白芷為蛇傷要藥

雜方

方 又方用白礬二錢服之防毒氣攻心 又方金線重樓以水磨少許傳咬處又為細末酒服之 又方用柏樹葉魚腥草地松節皺面草草决明共一處研細傳傷處極佳

海 治蛇虺咬人以獨頭蒜酸漿草搗汁傳咬處佳

海 治蛇咬男子陰毛口含二十莖嚥其津毒不入腹

世 治諸般蛇咬此傳之於擒蛇者藥味不全亦可

大青 小青 青木香 烏柏葉

火炊草 山蕨菴 過山龍 地蜈蚣

天門冬 白芍藥 香薷

右細末用白木香研細生白酒調服查罨咬處累効

聖 治蛇咬毒食菜菓一兩為細末冷水調分為三服立瘥

丹 治蛇毒吃菰蔣草根灰取以封之其草即野茭白是也

廣濟 蛇咬作瘡暖酒浸日三次 廣利 蛇入人口并七

孔中者割猪母尾頭瀝血着口中并孔口上即出

聖 治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出者用刀破蛇尾內

生椒二三粒裹着即出

世 治卒為蛇繞不解以熱湯淋之無湯令人尿之 蛇咬

忌食酸物梅子犯之大痛

蜈蚣咬

世 治蜈蚣咬生雞血傳上立愈累効一男子為蜈蚣入咽

喉中咬之垂死之際一醫令殺生雞血乘熱灌喉中蜈蚣

即出而愈實良方也 又方用雞糞塗之 又方治蜈蚣

諸毒虫傷麻油點燈於瘡口上對口薰之登時愈 又法

大油紙燃燒燈吹滅以餘烟焯之 治蜈蚣咬竹葉清研

汁傳之立愈 又方用南星磨汁傳之累効

雜方

禁忌

梅治蜈蚣咬痛不止獨頭蒜磨螫處立愈

聖治蜈蚣咬方用蝸牛擣取汁滴入咬處

孫蜈蚣咬取蜘蛛一枚安咬處當自飲毒如蜘蛛死而痛未止更易生者

梅蜈蚣咬嚼鹽傳其傷處次以鹽湯洗之梅師方 蜈蚣咬

頭垢塞之不痛則痒 治蜈蚣咬及諸虫咬毒先用鞋底

上擦之用大蒜小蒜桑葉罨傷處如無用油鼓盪傷處或

藍靛塗罨之亦効 治蜈蚣毒虫咬用桑枝汁同鹽擦痛

處或溶黃蠟滴患處肉黑為度 又方用皂角於咬處上

用艾灸熱去之効

蜈蚣咬

雜方

丹治蜈蚣尿成瘡初如粟漸大如荳如火燒泡大痛者速以草茶細末生油調傳瘡上立止甚妙又方猪膏搽搥汁傳之草茶即茶茗

也 治雨點蜈蚣瘡用百合搗爛入鹽少許傳之効

千治蜈蚣尿人影着便令人病瘡如粟粒累累痛似刺虫

所螫惡寒壯熱用犀角磨汁塗之則愈

世蜈蚣虫又名八脚虫隱壁間以尿射人遍身生瘡如湯

火傷用烏雞翎毛燒灰雞子白塗之 治小兒蜈蚣咬遠

腹匝即死用梨葉研爛傳之

食蜈蚣尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上

蝎咬蜂螫

雜方

羅雄黃消毒膏治蝎螫不可忍

雄黃

信各半兩

巴豆三錢

白礬生一兩

右為細末黃蠟半兩溶開入藥攪勻為錠子如棗子大用時將錠子簽於燈焰上炙開滴於螫着處其痛立止

梁一上散治蝎螫痛

半夏一字生用 雄黃一字 巴荳一个去皮
右三味同研和勻上之 治蝎毒用溶化白礬乘熱滴
傷處痛止毒出

廣治蝎螫人研蜘蛛汁傳之瘥

山蝎螫苦蕒汁塗之

世治蝎螫地磨生姜塗之 又方南星米醋調擦之

外治蜂螫薄荷貼之瘥 又方蜂蝎螫人用人參嚼以封

之

聖治蜂螫人以酥傳之愈

班蜘蛛咬

雜方

張薦昔在劍南爲張延賞判官忽被班蜘蛛咬項上一宿
咬處有二道赤色細如筋繞項上從曾前至心經二宿頭
面腫疼如數升益大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出

家財五百千并薦家財五百千募能療者忽一人應召云
可治張相初不甚信欲驗其方遂令目前合藥其人云不
惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甕碗取蜘蛛投入藍
汁良久方出甚困不能動又別搗藍汁復加麝香雄黃和
之更取一蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異之遂
令點於咬處兩日內悉愈但咬處作小瘡痂落如舊

一蜘蛛咬遍身成瘡用青葱葉一莖小頭作一孔盛蚯蚓

一條捏兩頭不令透氣搖動化爲水點咬處瘥

山蜘蛛咬處嚼韭白傳之

山蜘蛛等諸般虫咬用葛粉生薑汁調傳

山蜘蛛咬唾和山荳根末塗之狗咬蜘蛛瘡蛇咬並水研
山荳根傳之 又方蜘蛛咬一身生絲牟
乳一件飲之

沈存中秦皮一味治天蛇毒此瘡似癩而非癩也天蛇卽草間黃花蜘蛛人被其螫仍爲露所濡乃成此疾以秦皮煮汁一斗飲之瘥

刺毛虫蝨刺蝨蝨咬

春夏月樹下墻壁間有一等雜色毛虫極毒凡人觸着者則放毛入人手足上自皮至肉自肉至骨其初皮肉微痒以漸至痛經數日痒在外而痛在內用手抓搔或痒或痛必致骨肉皆爛有性命之憂此名中射工毒諸藥不効用好荳豉約一碗清油半盞拌豉搗爛厚傅痛痒處經一時久豉氣透骨則引出虫毛紛紛可見取下荳豉埋在土中煎香白芷湯洗痛處如肉已爛用海螵蛸卽烏賊魚骨爲末傅之愈 一方取蒲公英根莖白汁傅之立瘥又方用鍋底黃土爲末以酸醋捏成團於痒痛處搓轉其

毛皆出在土上痛痒立止神効無比黃土卽伏龍肝也 治蝨

吹用老茶葉細末調傅

丹治蝨刺咬如大風狀眉鬚皆落夜則蝨刺鳴於身上膿

作鹽湯浸數次安博信方

愈 昔有病腹大夜聞蝨刺鳴於身有人教用鹽水浸之而

聖治蝨蝨咬用柵葉燒灰細研以泔水浸柵葉取洗瘡拭之納少許灰於瘡中 又方治蝨蝨咬人用石灰醋和塗

之 凡蚕咬人用麝香研蜜調傅廣濟方

山居蚕咬用芋汁塗之

馬虎能咬人 犬咬 癩犬咬 驢馱馬汗瘡 附猪馬畜瘡

雜方

馬咬細嚼栗子傳傷處

聖治馬咬毒入心馬齒煎湯食之瘥

世治虎咬用野生菜搗爛塞所傷孔中滿不必換自然新肉長出而愈曾有人被咬已死用此方治之

丹熊虎傷毒痛煮生鐵令有味以洗之後虎傷人瘡取

青布緊捲燒一頭內竹筒中射瘡口令烟薰入瘡口中佳

方

世虎傷人瘡用莠子葉杵細塗之按本草莠子葉即猪膏莠能治虎犬咬傷

世熊傷人燒青布薰瘡中毒出仍煮葛根濃汁以洗之日

十次并搗葛根為散煮葛根汁方寸七日五服瘥

世鼠咬用貓兒毛燒灰傳之立愈

丹鼠咬用麝香傳包之經

山人咬傷用龜板或鼈甲燒為灰末以香油調傳

雜方

犬咬

丹犬咬人尿傳之更犬咬人以頭垢傳傷處又用熱牛糞

塗於外後

術犬傷入用杏仁量所傷大小嚼爛沃破處以帛繫定立

瘥

世治犬咬用杏仁去皮尖同馬蘭根研細先以葱湯洗後

以此藥塗傷處効治犬咬傷用草麻子五十粒去殼以

井水研成膏先以鹽水洗咬處次以此膏敷貼一方用虎

骨屑傳之不治犬咬人不要洗用紅炭火以物擊細待冷

取塗咬處即愈治犬咬用黃荊葉搗卷瘡上即安又

方灸生姜乘熱擦之尤妙

丹狗咬用紫蘇葉口嚼碎塗之犬咬破傷風腫以人參

於桑柴火上燒成灰末傳之安

羅 蟬花散治夏月犬傷及諸般損傷蛆虫極盛臭惡不可近者

蛇退皮一兩火燒存性

蟬殼兩

青黛兩

細辛五分

右為細末每服三錢酒調下如六畜損傷成瘡用酒灌下如犬咬傷用酵子和喫蛆皆化為水蠅子不敢再落又以寒水石末乾摻上

癩犬咬

表裡治法

羅 定風散治風犬咬先口噙漿水洗淨用綿拭乾貼藥更不再發大有神効

天南星生

防風各等分

右為細末乾上更不再發無膿効不可具述

丹 治犬咬梔子皮燒灰石硫黃等分研細傅瘡梅師方

世 治風狗咬用桃核殼半箇將野人乾糞填滿以榆皮蓋定罨於傷處又用艾於桃核上灸十四壯即愈永不復發

或用野犬糞如前法灸之

世 風狗咬即用犬糞塗仍拔去頭上紅髮隨風吹

世 癩狗咬方用斑貓七枚去頭足翅以糯米少許於新瓦上同炒以米黃香為度去米不用以斑貓研碎好酒調下

能飲入再進酒一盃傷在上食後服在下空腹服當日必有毒物從小便出如小犬狀如未下次日再進亦不下又

進以毒物出為度若進至七服雖不下毒亦不妨矣服藥後腹中必不安小便莖中刺痛者不必慮此毒受攻將下

耳痛甚者以蕪青一匙煎甘草湯送下即止如無蕪青青黛亦可疾愈後急以香白芷多雄黃少許為末搗韭根自然汁湯酒調下去斑貓毒以水爭嗽口嚼生葱白罨傷處

留小竅子出毒氣不可用他草藥養忌犬猪羊及發風毒
物小兒量歲數加減班貓食癩狗肉致病者治同即愈或
過二三年再發治如前治癩狗所傷用班貓二十一箇
去頭翅并足用糯米一勻先將七箇入米內微火炒不令
米赤去此班貓別用七箇再於前米內炒令班貓色變復
去之又別用七箇如前法炒以米出青烟爲度去班貓不
用以米研爲粉用冷水入清油少許空心調服頃又再進
一服以小便利下惡物爲度如不利再進一服利後腹肚
疼痛急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或煎黃
連水亦可不宜便食熱物或以益元散水調服尤妙
世風狗咬取小兒胎髮炒香傳野菊花研細酒調服盡醉
止效世治癩犬所傷或經久復發無藥可療者用之極驗

雄黃色極明者五錢

麝香五分

右研勻用酒調二錢服如不肯服者則燃其鼻而灌之
服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒候利下惡物再
進前藥則見效矣

丹癩犬咬人搗地黃汁飲之并塗瘡口愈又方煮地榆
汁飲之兼細末傳瘡上服方寸七日三忌酒若瘡癢者搗
生非汁飲一二升梅師用後同風犬咬後毒發如狗叫聲於
化人壇拾頭頂骨燒末傳之風狗咬毒發如狗叫者百
方不治以人骨燒末之水下方寸七雖煩亂者亦治梅師

驢涎馬汗瘡

雜方
丹驢涎馬汗入瘡腫漸甚可急治之遲則毒深不治以生
烏頭末傳瘡口上良久黃水出立安

世治驢涎馬汗入瘡用遠志去心爲末酒調塗又方用

冬瓜青皮陰乾為末貼瘡上 又方馬汗入肉毒氣引入
 如紅線者急用烏梅肉嚼爛塗瘡上 一方用烏梅和核
 爛研用好醋和成膏先將瘡口針破 出盡紫紅血拭乾傳
 上以帛縛定 王氏治驢涎馬汗毒 所傷白礬飛過黃丹
 炒令紫色各等分相裹合以貼患處
 馬齒莧又主馬毒瘡以水煎令服 一升一半塗瘡上
 濕癬白禿以馬齒膏和灰塗効

雜方

丹治猪畜瘡猪痒方

附猪馬畜瘡

蛇床子 剪草 白礬 苦參
 巴荳末

加羯羊糞桐油和傳之陶

垣馬老鼠瘡二方其瘡未詳

黃芪半一兩 甘草七錢 黃芩酒炒半兩 黃連生用一兩

黃栢酒七錢 連翹七錢 蒼朮 當歸稍

升麻各一兩 麻黃根八錢 防風二錢 澤瀉七錢

羌活 藁本各三錢

右為細末水二大碗煎至一碗冷灌之神効

馬老鼠出足陽明太陰經分野大渴小便多草墁

升麻二錢 葛根一錢 連翹二錢 當歸身一錢

甘草炙一錢 蒼朮半錢 黃栢半錢 黃芩一錢

紅花許少 黃連五分 杏仁五個 黃芪二錢

生地一錢 琥珀三分 麻黃冬月加五分 猪苓

柴胡半錢 白茯苓半錢 澤瀉

右為細末每服半兩水二碗煎至一碗冷灌之

