

瘧

瘧ハ素問ニ瘧論アリ殊外委ク記シテアレバ念ヲ入テ能見テ今ノ日用ニ立ガタキナリ茲ニテハ愈ヌガ咒ニテ愈ルコトヒアリ医者ノ手取道具ナリト呉嵩ガ方考ニ書シ通リナリワレデ是デタレカニヨキト自慢ハナラヌ然レバ先ツ療治ノ大法ヲ知ラネバナラヌ

參河島巣道人謙齋著
平安男　加藤玄順　校補
越前門人　尾崎元麟　校正

瘧
諸汗三十　咳嗽五十　内傷十六　虚労二十三　諸血十九
厥五十　瘕七十　積仕　水腫九十　脈満六十
産九十一　小便秘五十　痰十百

○一日ブルヒハ毎日フルフナリ一日ハザメニブルヒ或二日三日ヲ隔テニフルフアリ古人ノ論ニ日ブルヒハ輕ク一日オキハ重ク二日三日隔ハ尚重シトアレモ今病ヘヲ見ルニ鬼角日ブルヒガ重キナリ一日隔ハ仕ヨキコトナリ二日三日ハコレケタルナリ是ハ長引モノナリ發レ𤲿大方ガ一日隔ニテ日ブルヒヤ二日隔ハスクナキナリ

○日ブルヒニモセヨ一日ハザメニモセヨ寒ト熱ヲ能見分ヨソレニハイロく功者ナル見ヤウアレモ指當リテ寒ケ少ク熱多ケレバ熱證ナリ寒ケ多ク熱少ケレハ寒證ナリ一向ニ寒ケバカリニテ熱ナキアリ熱バカリニテ寒ケナキアリ是ハ大熱證大寒證ナリ俞嘉言ガ醫門法律ニ柴胡姜桂湯ト云葉ヲ出ス小柴胡湯ニ表人參加乾姜肉桂モノナリ寒證ナラバ肉桂乾姜ヲ多ク加ベシ熱證ナラバ肉桂乾姜ヲ減シテ柴胡黄芩ヲ多ク加ベシ是ガアリベカリノ主方ートースベシ加減ハ渇キ強クベカラバ花粉大古ツカヘガアルモノナリ痞バ枳實香附ヲ加ベキナリ嘔アラバ半夏ヲ倍シ薤ホニテモツカヘヲ推ス葉ヲ可加ナリ癪ノ嘔ハ大方ツカヘアルユヘナリ或熱ノ強キユヘニモ嘔ヲナス熱強キト見バイヨく黄芩ヲ倍スベシ是デ必オツルモノニテモナケレ𤲿此療治ニテハ過ナシイカニモ虚證ナルモノ草臥見ヘバ人參ヲモ加ベシ金匱ニ柴胡姜桂湯アリ同名異方ナリ其方柴胡四兩桂枝一兩五銭乾姜一兩括蔞根二兩黄芩一兩五銭牡蛎

一分 甘草 一分 右七味水以四盃煎二盃去滓煎一盃ヨレ瘧寒多ク微レク熱アリ
五厘
或但寒ノ不熱ニ用ルカナリ予試用ルニ寒瘧ニ限ラズ最初ヨリ截菜ノニヲ
用テ發汗セズ一旦ヲヂルト云ヘ𤼵振ヒ復シくノ胸腹痞ヘ勞瘧ノマヽニナリ
レモノ此方即効アリ牡蠣ハ生ニテ歩砕キ用ヘシ或分量倍シテ柴胡ハ分
ノ人ハ量ニスレバ一貼二ヶ五分ナリ葉汁コキヲ嫌フモノハ一ヶ二分五厘トスベシ水
量ハ貼ノ多少ニヨラズ同前ナリ初瘧ナド長引モノ此湯ニテ大方ヨレ
医門法律ノ古モ此方ヲ擯トノ組タルカ古ト見ヘタリ又最初ヨリ截菜ナド
禁ジテ柴桂湯ヲ用レバ自然ト截ルモノナリ證ニヨルベシ
○寒クナレニ熱バカリアル大熱ノ證ハ九味清脾湯或暑月ナラズ白虎湯
或白虎加桂枝湯或柴白湯ヲ用ベシ熱瘧ヲ治スルニ大柴胡湯ヲ用ヒ微利シテ
後餘邪未盡ノハ白芷湯上云カヲ用ベシ白芷知母各二分 石膏八分右水煎ノ用
ルナリ
○熱ナレニ寒ケバカリアル大寒證ニ六十味ノ不換金散甚キ時ハ蓽撥湯
附子理中湯ヲ用ベシ
○全体カロキタル瘧アルモノナリ食積上云七味清脾湯ヲ用ベシ
○瘧ハ眼ヲ能見ヨ真中ヘサレ込ミ水落ノ通リヘ凝タルウチハ何トシテモ
截ヌモノナリソレヲ無理ニ截スハアシキナリソレガ菜ヲ用テ真中ガ少
シ左右ヘ開カバソロく截ルト意得ベシイカフ長引ナラバ截菜ヲモ用

ベレ外邪ツヨクハ風數ノカタナラバ敗毒散二三貼用ルコトモアルベレ或藿香正氣散ヲ用ルコトモアルベレ時ノ見合ナリ虚證ナルモノ食滯痞モ少シアリフブラ〳〵ト振ヒ忽ニ截スコトモ仕ニクキ時ハ人參養胃湯ヲソロ〳〵用テ置ベレ又古方家ダチノ療治ニ隔日一發先寒後熱寒少熱多キ二柱枝石膏湯ト云ヲ用ルナリ桂枝五分 石膏知母各一 黄芩一 右四味水煎ノ用ルナリ又寒熱數次發者ハ前後ニ掏ラズ桂枝芍藥湯ト云ヲ用ルナリ桂枝 二分 黄芩知母各五分 右五味水煎若シ前藥ヲ服シ寒熱轉大者ハ太陽陽明少陽ノ合病ナリ桂枝黄芩湯ニテ和スベレ生甘草四分 五厘 石膏知母各五分 桂枝二分 柴胡一五分 黄芩四分 五厘 人參四分 半夏一分 右生姜水煎ノ用ナリ初瘧ナドハ最初ヨリ此等ノ劑ヲ用レバ長引ヌナリ

○家傳ノ截リ藥ハ柴胡大棋掬中草藥小 水煎一宿露シテ用ル也能截ルナリ若シ截又ハ草藥ヲヤメテ唐牛膝二代ベレ此外仕モノレ長引トキハイロ〳〵ノ療治モアレド豫メ事多ケレバ記サズイロ〳〵ト長引鬼角何テモ截又時ハ灸ニテ能截ルモノナリ先ツ大推ヘ灸スレバ能截ルナリ然レモイカフ六ケ數ハ是ニテモ截又モノナリ至極ノツヾリノ灸ハ足ノ裏湧泉ノ穴三壯ホドモ灸スベレ十二七ツハ截ルナリ是日ブルヒ一日隔ノ療治ナリ或瘧ノ後イロ〳〵ノコトアルモノナリソレハ盡クハ記シ難シ諸方書ヲ考ベレ後世家ノ醫書ニテ偏ナク初心ノ見安キ医方ノ書多シト

常山二大 甘草小 一合半 一合 一椀露 早天服 再發発 昊前一時 温服

人参ノ中
白朮大
貝母大
干姜小
生姜
八片
毎朝温服

イヘル手近ク重寶ナル医方ハ奈須玄竹翁ノ医方聚要十二巻ナリ
近代ハアニリ人モ知ラズ医方入門上云シガ不捌ナルカ医方聚要ト改
ム大抵ノコトハ近ク考ルニ便ナル書ナリ蘚已十六種だト未タ和刻ニナラザル以
前ノ書ニハ補遺ニ偏ナク今日療治本ニハ利ロナル書ナリ
○夏月悪寒強ク後発出テ頭痛咽渇ノ多クハ瘧ナリ先ツ發散ノ葉
ヲ用ベレタトヒ瘧ニアラザレバ害ナフレテ宜キナリ初瘧ナドハ初發ニ
汗ヲトルガヨレ柴胡桂枝湯ノ類四五日用テ汗出テ大概邪気裏ル時
分五發クラヒニテ截スベレ又寒瘧ト見タラバ丹水翁ノ驅邪湯ヲ三五
日モ用テ實證ニ非ハ蕾香正氣散常山合半ヲカテ截ルベレ前晩ニ

煎ジ置キ一宵露レテ翌早朝温メテ用ルナリ又截某ノ吐某ニ常山ヲ
黄甘草ノ三味ヲ前夜ニ煎ジ早朝ニ少レ温メテ用ルベシ吐スルナリ是ニテ
截ルナリ然レドモ老人虚人ニハ用ベカラス虚弱ナル者ノ截某ハ唐白朮一匁炮
姜一匁ノ二味ヲ煎ジ前日發リタル時分一時アニリ前ニ右ノ煎湯内
一生姜汁多入レテ一番煎ジ残ラズ用ルナリ二番モ煎ジヲキ又半時
バカリ前ニ生姜汁ヲ入レテ用ル必截ルナリ
○陰瘧ハ晝ヘ出ザレハ截ヌモノナリ方書ニ柴胡芩皷湯ヲ用ヲ
アレドモハリ柴桂湯ヲ立カケ用ルト晝ヘナルナリ晝ヘ出テ後截ナリ
又或傳ニ夜發ノ者ヲ治スルニ麻黄黄芩湯上云方ヲ用ルナリ麻黄二分炙

白虎加桂枝湯　本方加桂枝
二方合方

柴白湯

九味清脾湯

七味清脾湯

人參養胃湯　右三方衆方規矩大成瘧門出

十味不換金散　治寒瘧寒疫及發惡寒

人參養胃湯加附子

驅耶湯　丹水菊自制　治寒瘧

桂枝二錢　乾薑一錢　蒼朮一錢　半夏一錢

甘草六分　桃仁二十分　黄芩桂枝各三分　右五味水煎ノ用ルナリ古方家ニハ夜發ノモノニ桃仁承氣湯ヲ用ルコトヒアルナリ

○又瘧ニテ腹ヘ積サシ込ムモノモ柴桂湯ニテ治スルナリ　積ノ加減ニ不及ナリ　儲小兒ナドハ小蔬胡合不換金加青皮草菓用テヨシ或九味清脾湯モヨシ惣ジテ小兒ノ瘧アリテ瘧ノ如ク指引スル證アリ是多久蟲積ナリコノ清脾湯ヲ用テ効アリ又夏月少シ惡寒アッテドヲヤラ瘧ラシクシテ輕キ證ニハ參養胃湯ヨク効アリ世醫夏月寒戰アル證ヲ類瘧ト云是ナキコトナリ瘧ハ瘧風邪ハ風邪ト分ツベシ

柴桂湯　見傷寒

附子七合　柴胡一錢　甘草少

右姜煎○加減見二醫方問餘

○偖瘧後ノ調理ハ益氣桑湯加減ヨレ是モ人ノ勢證令證ニ因テ温凉ノ加減ハ時ノ見計ナリ或久瘧ニナリテハ氣血調補ノ葉又ハ滋補モ用ルナリ子久瘧或折々再發ノ勞瘧ニナル草臥モアル證ニ前條ニ云ヘル金匱柴胡桂枝乾姜湯ニ去乾姜加人參生姜大棗ユルノ〳〵用テ効ヲ得ルヿ多シ此時ハ水常ノ如クニ盃ヲ一盃ニ煎スルナリ其餘ノ調理或ハ餘證ヲ兼ルモノ諸方書ヲ考レハ自發ニ治方明ナリ

傷食

食傷上云モノハ平生澤山ナモノニテ大抵ノ食傷ハ病人ノ方カラ食傷ナリト云モノ腹痛スルカ腹脹スルカ吐瀉スルカ強キニハ目ニヒモアルモノ噫ナド出テ氣色ガアレキモノナリ是大抵ノ食傷ナリ偖重キ食傷ト輕キ食傷ガ知ヌモノナリ輕キ食傷ハ胸サキツカヘテ氣色アレク頭痛ナドモ少レスルモノ感冒ヤラ精ノツキヤラ矢ヌモノナリ偖重キ食傷ハ俄ニ氣色アレク其人ヌボヘモナキヤウニナリ或卒中風ノヤウニ倒テ無性ニナル大抵ノ食傷ハ脉ニ不及食傷ト見ル輕キ食傷ハ却テ脉デナケレバ知レ又右ノ關脉ガ緊盛ナルモノナリ或伏スルコトモアリ偖何ヲ喰タルト

食物ヲ吟味スベシ重キ食傷ノ上ニ倒ルヽカ覚ノナイヤウニナルハ脈ガ伏スルカ濇スルモノナリ此亦何ヲ喰タルト食物ヲ吟味スルガ肝要ナリ右ノ通リヲ意得テフレニテ療治ヲスベシ

○大抵ノ食傷ニハ消導ノ劑ヲ用ヨ消導ト食ヲ消シテ大小便ヘ導クト云コトナリ

平胃散　消導之劑

蒼朮八分　陳皮厚朴各五分　甘草三分

右姜煎○飯餅ノ類ニ傷レバ加神麹麥芽○麪類ニハ加蘿蔔子神麹○魚鳥ニハ加山楂撰撥草菓○菓物ニハ加青皮乾姜○右ノ

通リナレド食傷上云モノガ一色バカリハ不良モノ一色ニ傷ルレバ外ノ物ニ滞リテアルホドニ神麹麥芽山楂青皮乾姜木香ノ六味ヲ加ヘ用ベシ諸大抵皆腹痛スルモノナリ木香ハ腹痛ノ基ナリ○吐ニハ加半夏藿香○瀉ニハ加縮砂○大便秘結或澁ニハ加枳殻

○重キ食傷ハ吐スルカ瀉スルカサスベシ食ニ傷レテ閙モナク食上脘中脘ニアルハ吐サスルガヨイ閙ガアリテ食中脘ヨリ下脘ニアルハ瀉下レタガヨイ吐サスニハ枇杷葉湯ヲ用ベシ瀉下スルニハ保和丸十粒備急丸五粒上ツニ一ツニ一ツニテ十五粒用ベシ

枇杷葉湯　此藥吐スル功モ瀉スル功モアルナリ

右糊丸或蜜丸此円心腹卒ニ痛ムヿ云ビ肝愛ノ日當ナリ金匱
古方ニヲ千金方ノ紫円ナド巴豆民緒石赤石脂杏仁ノ四味ヲ地
トシタル方モ此方ヨリ來ルナリ本邦ニハ紫元子ト名ヲ都鄙ニ
虫下シノ丸薬ニ賣薬ニアリ大實ノ證ニ用ヒナリ近來吉家
ノ中ニモ分テ嚴シキ流ハ萬病皆一毒ト云ヘル見識ニテ諸病皆三黄
丸三黄散ニテ瀉下スヿ快利セザルモノハ紫圓ヲ以テ瀉下
ス此流小文才アル医生早速療治ノ出來ルヿヲ説ヒ辺鄙ノ貧医
生等京学ハ久シクハナラズ博医方ニ渉ルコハナラズ古代ヨリアリフ
レタル医書ハ尽ク打チ破リ此流ニ傾クモノ多シ一見識ヲ立テル器

藿香 本草ニ藥或軸 木香 昊蘂莧 各中
肉桂 枇杷葉 各大 甘草少
右浸沸湯用之欲為吐可加ヒルモ草
保和丸 凡有傷食者皆主之但傷冷物者可斟酌
山楂二両 神麹 半夏 萩苓 各一両
蘿蔔子 陳皮 連翹 各五銭
右糊丸
備急圓 傷食之下劑也一切屬實ニ暴病ニ主之
大黄古渡重実者 直筈完ヲ 巴豆去皮心油 各等分

量ノ先達ノ人トハ違ヒ聞取法問ノ輩辺鄙ニテ附子ヤラ大黄ヤラ知ラヌ俗人ニ與テ入ラ誤ルコト多シ虚實ト云コト一向ニ云分ル流ユヘ諸病ノ病因ニ不拘妄リニ用之殊ニ近比新渡ノ大黄ハ性輕浮ニテ何程テモ三黄湯ナドニ功ナレ故ニイラツテ紫円ヲ用テ瀉下メ害アルコト多シ古渡重實ノ大黄新渡ニテモ重実ノモノハ能瀉下スルナリ遠国ナドハ和產ヲ用ルモアレモ快利セザルナリフレユヘ近比ハ紫圓ヲ以テ下スナリ同シ瀉下スルト云ヘドモ大黄ノ性寒ト巴豆ノ大熱ト一ツロニハ云ハレヌナリ此訣近比新刻ノ方医門ニ精シク辨アリテ云ニヌ及トイヘドモ素入ハ裡會セズ故ニ此議ヲ述ルモノナリ

又和產大黄ヲ炒リ大イニ近世流行藥ノ俵屋擺レニ用ト云ヘドモ瀉下セズ新渡ノ輕浮ナル大黄ハ和產ト大抵同レキ物ニテ効ナレニテ自ラ明ニテ試ルニ少レモ瀉下ノ功ナレ吟味スベキコトナリ又此流ニ補ト云コトナレ菜ハ皆毒菜ニレテ毒ヲ以テ毒ヲ責ムト是レ病ニヨリ又菜ニモヨルナリ古人毒菜ト云ヘルハ穀肉果菜ニ對ヲ云ヘリ人參白朮ト甘遂大黄豈一ツロニイハレンヤ穀肉果菜ハ人ヲ補養スルモノイ云ヘドモ今大虚脫絶食ノ病人ニ穀肉果菜ガ擬ルニモノカ人參白朮ノ類ニテ補フニアラザレハ奈何ドモレガタレ又暴瀉金瘡脫血勞役虚損ノ證ノ外内虚ヨリ起諸病挙テ數ヘ難レ是皆尽ク毒ニ屬ストセンヤ辨ヲ不待コトナリ

是程ノ訣理會ナキ先達ノ人ニハ非ズト云ヘル他題言ニモ云ヘル如ク一見識ヲ立ル人ハ流弊アリ知ナガラ丹溪ノ陽有餘陰有餘コレ皆時ノ弊ヲ救フノ言ナリ中頃薛已ノ流都鄙ニ行レ大実大熱ノ證ニモ蹈込攻撃寒涼ヲ以テ効ヲ得ルコト多シ爰ニ於テ寒涼攻撃ヲ以テ効ヲ得ルコト多シ慎ムベシ〳〵兎角諸流トモニ自見ヲ以テ初心ノ医生ヲ誤ルコト多シ慎ムベシ〳〵

テ病ニヨリテ用捨アルベキコトリ其用捨ハ博ク医籍ニ渉ルベシ今近代ノ医流ヲ亞声ニ云ヲ、ナレバ郷ニ非業選テ醫断ノ言ナカリせバ軒岐ノ澤モ仲景ノ術モ塗炭ニナラン唐ニモ四大家ノ論又

富貴貧賤病ヲ異ニストモアリ薛已ノ天子ノ御側医者ト張子和ノ北方ノ夷狄ニ近キ山家医者トハ療法モ差フハヅナリ一見識ヲ立テ云ガリニナリテハ貧惜ニモアルベキモノナリ

○重キ食傷ニ卒中風ノヤウニナルヲ食厥ト云卒中風ト卒中厥トノ見分ハ脉ガ伏スルモノ卒中風ハ脉ガ勁急ニノ強クヒツハルモノ食物ノ穿鑿ヲシテ食厥ニキハニラバ塩湯ヲヌルクシテ多ク用ヒ鳥ノ羽ヲ喉ヘイレテコメグルヤウニスルト必吐スルモノナリ又抵烏葉湯デモヨシ其上ニテ虚實ヲ見計ヒテ菜ヲ用ヒ實ナラバ麝香山氣散ニ加南星木香虚ナラバ理中湯附子理中湯カ青皮縮砂若シガツヨク渇クナラバ其上ニ加葛根コレ

乾霍乱ノ療治モ同前ナリ

○輕キ食傷ナラバ香砂二陳湯カヨシ梨柿蜜柑瓜ノ類ナドニアテラレルカ或ハ膾ノ類ニテアテラルヽカル平胃散ノ加減モヨシ

香砂二陳湯

陳皮　香附　各一銭半
神麹　甘草　各六分
茯苓　一銭半　半夏　縮砂

右姜棗○或加山楂杏仁

○大鳥肉或ハ麪麪或葱ノ類一切ノ麪物ニ傷レタルニハ輕キハ保和丸ヲ用ベシ重キニハ枳實導滯丸ヲ用ベシ

枳實導滯丸　傷濕麪物不消化痞滿矢氣者主之

茯苓　白朮
大黄　一兩　枳實
黄芩　黄連　各三銭　澤瀉二銭
神麹　各五銭　右糊丸

○一切ノ寒冷ノ物ニ傷タルニハ前ニアル平胃散ノ加減ヲ用ベシ重キニハ紅丸子ヲ用ベシ

紅丸子　傷寒冷物腹痛成積者主之

莪朮　三稜
胡椒　各二銭　右以醋糊爲丸ス　巴豆霜爲衣

○食傷ニテ腹痛甚シク前炭湯ヲ用テモ當分不止腹痛難堪麪物ニ

傷レタルニハ木香導滞丸寒冷ノ物ニ傷ラレタルニハ紅丸子
木香導滞丸　即枳實導滞丸加木香拱卿
○食傷ノ次手ニ持病ノ疝氣或積ナド指出テ甚腹痛スルコトアリ是モヤハリ寒熱ヲ見分テ紅丸子木香導滞丸ノ二方ヲ用ヨ
○大食傷ニテ卒ニ腹痛忽悶絶シテ死セントスルニハ備急丸五粒バカリ可用ナリ齒ヲ噛結口ガ不開ハ湯ニテ和カニシテ齒ヲコジアケテ用ヨ忽吐瀉シテヨシ若シ効ナクバ又五粒ホド用ベシソウシテ後見合ニ煎葉ヲ用ヨカヤウナ急證ハ卒病門ト考テヨシ
○食傷吐逆スルハヨキコトナレドモ吐逆イツマデモ不止ハ枇杷葉湯ヲ用ベシ枇杷葉湯ハ吐逆ヲ止ルニヨイ吐逆ヲ止ントスルトキハヒルモ草ヲガタハアレド如味ナレニ用ベシヒルモ草ハ吐葉ナリ
○食傷テ泻スルハヨキコトナレドモイツマデモ泻ノ不止ハ理中湯加肉豆蔻縮砂ナリ實證ノ人ニハ人參ヲ去テヨシ
○食傷デ頭痛スルコトアリヤハリ食傷ノ療治ヲシテヨシ頭痛ニカニヲコトハナシ
右ハ大抵実證ナ者ノ療治ナリ下地イカウ虚證ナ者ヤ病中病後ノ療治ハ意得アリ左ニ記ス
○大抵ノ食傷平胃散ノ加減ヲ用ベキ證ナレドモ其人イカフ虚證ナカ

或病中カ病後ナラハ六君子湯加香附縮砂ナリ大便カ不瀉ハ加香附縮砂青皮テモヨシ素虚證ナ人ハアニリ飽食モセヌモノナレハ大食傷ハセヌモノナリ大形ハ六君子湯ノ加減デヨイモノ早速ハ葉カキカスモノ病人ニモ其理會サセテソロく療治セヨ若シ病甚シク脉モ沉微ニナリ手足モ冷ルヤウニアラバ附子理中湯加青皮コレ虚人ノ療治ナリ病中病後ニハムサトシタルモノハ不食ニヘツヨキ食傷ハナイモノイツデモ六君子ノ加味カヨイ枇杷葉湯ハ虚證ナモノデモ用テクルシカラズ甚シキ食傷ニテ吐サセタクバ用テヨシ

○虚人病中病後ノ食傷ニハ六君子湯ト保和丸ト兼用ルコトアリ

コレモヨイソノ若シ脉カ沉微ニテ手足モ冷ヘ虚寒ト見タラハ保和丸ハアレ用ベカラス理中湯或附子理中湯加青皮

右ハ虚證ノ人ノ療治ナリ

○大酒シテ酒ニアテラレタルニハ先ツ不換金加葛根大縮砂茯苓澤瀉ナリ當分ノコーナレハ此葉テヨシ若シ四五日モ長引トカノ酒ニアタリタハヨリ發ル病ナラバ葛花解醒湯ヲ用ヨ酒毒ヲ解スル葉ナレバ酒カラ發ル病ナラヌ新病大病ーモニ此葉ガヨシ

葛花解醒湯

白豆蔻　縮砂

葛花各五分　茯苓　陳皮

猪苓　人參　各一錢半　白朮
乾生姜　各二錢　青皮三錢　木香五分

右水煎服得微汗則酒病去

○一切ノ菌ニ傷ラレ大食傷ニナツテ大抵ノ療治デ効ナキニ塩鯵ノガシリヲ平胃散ニ加ヘテ用ヨ吐スルカ大ニ瀉スルカシテ愈ユ無上ノ方ナリ少シノアタリニテモ菌ノ食傷ニハ此ヲ用ルガヨシ大抵ハ平胃散増甘草加黄連ヨシ

○河豚及ビ一切ノ魚毒ニハ葦吾ノ黄ノ塩ヲ絞テ汁ヲ呑デヨシヌ葦吾ノ塩ヲ陰乾ニシテ刻ミ平胃散ノ中ヘ多ク加ヘテヨシ又葦吾ノ陰干

ヲ一味煎ジテ用テヨシ又河豚ノ毒ニアタリ無性ニナリ危キニ至ルモノニハ臘月糞壺ノ中ヘ竹筒ヲ薄ク刮リ両方節ヲノコシ漬オクバ寒々三十日ノ間ニ糞汁筒中ニ溜ル綿ニシメシ畜ヘ置キ口中ヘ絞リコメバ忽チ盡ク吐出シテ正氣ツク甚妙經驗ノ方ナリ狡レビ此ヲ頼ニシテ妄リニ河豚ヲ喰ベカラズ河豚ニ歯一枚歯ナルモノナリ窕メテ毒アリ近来東海ノ邊ニテモ若シ一枚歯ノ物ヲ見レバ深ク埋ミテ雞犬ニモ投セズト云ヘリ

○蟹ノ食傷ニハ紫蘇一味ヲ煎ジ用テヨシ

○蒼耳麥切ニテ大食傷シタルニハ枇杷葉湯ニ久年毋ノ皮ヲ茶一貼ノカサ

ホドカヘテ用ベシ

内傷

内傷ノ病ニ虚實ノ二ツアリ實ト云ハ食ニ傷ラレタルコトナリ大要食傷門ニ詳ナリ虚ト云ハ氣ヲ勞シ形ヲ疲シ精カノ草臥カラ起ル病ナリ先ツ感冒ニ似タルモノ頭痛悪寒アリ感冒トノ違ハ惣体草臥ガツヨイ頭痛モ指引アツテ仕タリ止タリ何ゾ精カヲツカフト頭痛發熱悪寒ナドアツテ氣色アシク休息スレバ少シ能ヤウニアル脉ガ大フリニウツテオレテ見レバ根ニカガナイ脉ガ肝要ノ見分ナリ内傷勞倦ト外邪感冒トノ見分ハサニくノ目ツケアツテ妻ノタキモノナリ詳ニハ東垣

ノ脾胃論辨惑論ニアリ其外何レノ医書ニモアルホドニ熟覽スベシ内傷ト外邪ト交ルコトアリソレガ勞役ノ感冒ト云感冒門ニ詳ナリ

補中益氣湯　治内傷内傷ノ病證ハ東垣ノ書ニ詳ニシテ諸書ニ委シクノ云テアルニ熟覽スベシ此ニハ大概ヲ云先ツ食飲飢飽トハ食モノ飲ノカ過タリ不足ナリタリシテ惣シテ食物ニカラ食アリテ食事ニ愼シミガナケレバ當坐ニ食傷スルデモナケレモ胃ノ府ガ自然ニ草臥ルト其證ハ息疾クナリ或氣勢ガケロリトナツタヤウナ氣ガシテクナリ或大熱ヲ生シ面ノ内ガ強ク熱スル偖又形ヲツカヒ體ヲ苦ムレバ脾ノ臟ヲ傷ル其證ハトカク臥シ寵タガリ手足ガダル

ク起テ居ト云モナヒマウニアツテ大便モ泻スルモノソレガ胃カ傷ルレハ
脾モ傷ル、脾カ病ムユヘニ右ノ證カイツレモアルモノ
此證アラバ脉ニ弱ニカアラハル、何脉ニモセヨ按テ見テカノナヒガ
虚脉ト知ベシ其ウチ浮洪ニシテカガナノ惣体弊ガアルモノサ
レヒ脉ノ浮洪ナト弊ノアルト云ニカキリハセヌ外ノ脉ニモアルモノ
弊ノナイコトモアルモノ兎角草臥テ寢タガルモノナリ委シクハ
筆ニ記サレズ諸書ヲ見テ自然ニ理會セ子バナラヌ○偖此薬
ハ元氣ヲ補フ藥ナレバ虚損門ニモ入レテアル偖虚損門ニカギラズ
一切ノ病ニ不用病ハ一病モナケレハ病門コーニ入テアルナレバ其病

ニ用方ヲ記レテアル加減モサニ〳〵アル手廷キモノハ衆方規矩補
医古口訣頭書ヲ見ベシ加減モ古ノ書ニ精クアルナリ○偖此方
ノ立古ノ本旨ハ東垣先生其ノ師潔古老人ニ秘蜜ノ方ヲ傳受ス即
調中益氣湯是ナリ調中益氣湯ニ加減シテ此方ヲ建立アリ調
中益氣湯ノ大意ハ人飲飽勞役ニ因テ元氣ヲ損傷シ脾胃不調
種々ノ病證ヲ見ス故ニ其病ヲ治スル藥ヲ調中益氣湯ト云此薬
ハ補中焦以テ主トス故ニ補中益氣湯ト云調中ト補中トノ文字
ノ意ヲ以テ考ベシ夫調中益氣湯ハ奇妙ノ秘方ニノ東垣此ヲ
重寶トス然ルニ金ノ天興五年壬辰ノ春元ヨリ金ノ都ヲ圍

ム金敵ノ圍ヲ受テ絶食半月ソノ間野菜粗食ヲ喰ヒ其上ヘ敵ヲ畏レ脾胃ノ氣虛スルヿ甚シク圍解テ後驟ニ飽食シ脾胃ヲ傷リ傷寒流行死者無日千人餘ニ及ベリ其死者百万ニ及ブトアリ此病モト傷寒ニアラズ内傷労倦ニ因テ傷寒ニ類スル時疫ナリ其時ノ医者不知之皆傷寒ト心メ傷寒ノ藥ヲ用ル程ニ數百万ノ人死スルナリ東垣先生調中益氣湯ニ加減シテ補中益氣湯ヲ製シ悉救之或問此方ハ東垣先生ヽヘカタヨリ製シオカレタルヤ又此度ノ時疫ニ依テ始テ加減シラレタルヤ否荅云辨惑論ヲ按スルニ遠ク眞祐興定之間東平大原鳳翔ヲ

地又如此ト云ヘリ東平大原鳳翔ハ金ノ地ニノ圍ヲ受タル所ナリ天興五年ヨリハ十四五年モ前ナリ其時モ又アトニ如此ノ時疫流行ス此モ敵ノ圍ヲ受テ食ニ乏ク脾胃虛ヨリ生シタル傷寒ト意得テ師傳ノ調中益氣湯ヲ加減シテ此方ヲ製シラレタリ發レバ兼テ試ラレタルモノナリ東垣ハ敦厚ノ明医某カヲ製スルニ一旦ノ思ヒ付ニテハアルヘキナリ偖カ意ヲ案ズルニ調中益氣湯ハ補劑ノ中ニ蒼朮黃蘗ノ降下ノ藥ヲ兼テ調中益氣ヲ以テ主トス此湯ハ右ノ二味ヲ去リ加白朮當皈純和ノ藥ト ナシ專ラ補中益氣ヲ以テ黃耆爲君益皮毛閉腠理不令自汗

予云皮毛ト云ハ輕キヤウナレ𪜈皮毛ハ衛ナリ衛ハ七神ノ別名周身ヲ讀ス皮毛ノ間ニアリソレデ臟腑ヨリ大事ノ防ニノ内ニアッテハ肺ノ合ナリ病從是生スト云ハ内經ノ旨ニノ即仲景黄芩建中湯ヲ製スル根本ナリ素古老人又此旨ヲ得テ東垣先生制此方以黄耆爲君ハ聖賢傳受ノ妙旨ナリ人參甘草次之爲佐補元陽瀉邪火肺ノ本ハ脾胃ナリ飢飽勞役ニヨッテ脾胃ノ氣虚スレバ肺ノ本絶ス白朮ノ苦甘温ヲ以テ人參黄耆甘草ト同ク補脾胃升麻柴胡苦微寒甘薄而引清氣升上參耆甘草ノ輩ヲ引テ衛氣ノ補散解蕪デ傷寒ノ藥ヲ解ス陳皮胸中ノ氣

ヲ利シ當歸和血此方ノ方名タル處ヲ按ズルニ脾胃ノ勞倦ヲ補ノ藥ト云ヘ𪜈其見證ハ傷寒ノ藥ナリ皆人一概ニ意得テ補藥ト計意得テ居ル補藥ハ成程補藥ニ紛レ無レモ其主治ハ傷寒ノ藥ー意得ベレ此東垣立古ノ本意ナリソレカラノ後人此藥ヲ百病ニ用テ驗ヲ得ル脾胃一虚而百病生ス此藥ノツヾリハ補脾ノ藥ナレバ百病ニ用テ功アルト勿論ナリサレモ此藥ノ主治ハ傷寒ノ藥ト意得ルガ第一ノ目當ナリソレカラノ無斈證ニモ加減ニ因テ用ルト云ヘ𪜈ソレハ後人ノ使ヒ覺ナリ去程ニ東垣モ初病斈中ノ藥トレ来傳寒中ニ

ナリテハ理中湯ヲ主方トス此方ハ先ヅ指當テ鞭ツヘキ
目當ナリ然ルニモ傷寒ノ時疫其外虚勞實熱色々紛レアル
程ニソコヲ隨分ニギレヌマウニスベシ○陳麗京ガ説ニ脾胃勞倦内
傷ノ證ニハ參ヲ以テ君薬トシ表虚自汗潰瘍ニハ黄耆ヲ以テ
君薬トスト云ハ左ナマウナコトニテ此レ東垣立方ノ本旨ニ暗ク後
世此方ヲ用ル活法ニヨッテ云タルモノナリ活法ニ因ルトキハ何ヲ
君薬トセヂヤラ始ヨリ極リハナシト若シ立方ノ本旨ニ依ルトキ
ハ以黄耆君薬トスルニ疑ナシ此方ノ分量薛已重子テ改メテ
ハ參白朮當歸ノ分量ヲ過メ升麻柴胡ハ本ノ分量ノ如シ

此ハ薛已ノ他病ニ用ル活法ニノ東垣ノ旨デハナシ丹溪薛已ヲ始メ
益氣湯ノ本旨ハ知ヌナリ東垣ノ門人羅天益ヲ始メ此旨ガ
云テナイガ此ハ知ヌデハアルニイコトリラ云ニ及ハズ辨惑論ノ
字面カスクニ類傷寒ノ薬トアレバ重子テ云ニ及ハザルナリ
カヘスク此薬ハ類傷寒ノ薬ト意得ルガ全揔第一ノ意得
ナリ○虚人飲食所傷及外感暴病新愈之後皆當六君子
用理胃爲主内傷勞倦及久病之後用此湯理脾則百病
不生不理脾則諸病續起久之仍入於胃也予云此ハ饑飽
傷胃ト勞役傷脾ト之異ヲ辨ズ當用六君子理胃ト云ハ饑

飲傷胃ヲ為シ主六君子ハ微ク消導ノ意アリ内傷労倦ハ元氣ノ衰微ナリ理脾ヲ為シ主再按ニ傷胃レハ自ラ食ヲ廃シ精神ケロリトノ大熱シ或時アリテ面艶ス傷脾レハ惣体ガ臥テ手足ダルノ大便泄瀉スルモノナリ○偖仲景ノ時ニアツテハ労役ノ傷寒ニ停食ヲ兼ニハ桂枝人参湯ヲ以テ中ヲ理ス外邪重キハ黄耆建中湯ヲ用レハ補中益氣湯ガ無クテモ桂枝人参湯ト黄耆建中湯ニ加減スレハ事ハカケスナリ其上内傷ノ初起熱中ノトキハ補中益氣湯ヲ可用末僵寒中ニナレハ温補テナクレハナラス理中湯ノ加減ヲ可用

○頭痛大作氣高而喘身熱而煩上氣鼻息不調四肢困倦不收無氣以動無氣必言或煩燥悶乱心煩不安或渇或不渇心火上炎刺肺経則渇血脈中有濕則不渇或表虚不任風寒目不欲開口不知味氣口脉大於人迎兩三倍但急大而時見一代此内顯脾気不續之脉也此證若有宿食則右関獨沉而滑枳朮丸主之ヲ云此條全ク労倦ノ見證ヲ云後枳朮丸ヲ出スハ内傷飲食ナリ

黄耆一銭　人参　白朮　當皈各七分
陳皮五分　柴胡　升麻各三分
甘草
右姜棗煎○此古辨惑論脾胃論ノ二書ニ出ス俱ニ東垣ノ書ニ其

書ノ前後ヲ考レバ辨惑論先ニノ脾胃論ハ後ナリ両書ヲ參考スベシ分量モ又原方ノ本書ヲ見ベシ

調中益氣湯　此方ハ補中益氣湯ヲ用ベキ證ニ濕ヲ兼テ瘡泄シ腹ノ脹リフクレルニ用ル藥ナリ羅天益ノ方ニハ無木香有黄芩コレデハ濕熱ヲ兼ルニ用ルト意得ベシ○以蒼朮代白朮去當皈加木香

八解散　此藥元來傷寒ノ藥ナリ今内傷ニ用ルハ意食ノ泥ニモアリ労倦ト草臥アルニ用ル食ノ泥ト云ハ食滯ト云程ハナケレド食ガモタレテ脾胃ノ不運コトナリ其上ニ草臥モアルニ用ルハ傷寒ノ藥ナレバ感冒ヲ兼タルニモ勿論ヨイハヅナリソレデ衆方規矩ニ益氣湯ノ輕キ證ニ用ルトアルヲメツタナ云ヤウ笑ヘル衆方規矩ノ意ハ右ノ意テ云タモノ意ニアヤマリハナケレド云ヤウガ麁相ナルユヘニ胡乱ニキコヘルソ（加減方衆方規矩大成參考スベシ）

香砂六君子湯　此方ハ脾胃虚シテ食ノ味ガナイ食ハ喰ヘドモ其食ガ胸ニモタレテコナレヌニ用ル藥ナリ

香附　白朮　茯苓　半夏　陳皮
厚朴各一錢　縮砂　人參　木香　益智
甘草各五分

右姜棗煎正傳方木方加香附縮砂藿香

香砂養胃湯　此ノ薬ハ脾胃不健ニテ食ノ食レヌニ用ルナリ脾胃ヲ運ラせ補ヒテ食ヲ進ルナリ即チ前方ノ香砂六君子湯去半夏蓋智加白豆蔻蒼朮

虚労

先輩ノ療治ヲ案ズルニ虚労ト稱スルモノハ多クハ陰虚火動労瘵ノ病ナリ脾虚氣虚陽気不足ノ病ハ別ニ補益門ヲ立ルナリ仲景ノ金匱要畧ヲ案ズルニ虚労ト云モノハ陰陽倶ニ不足氣血両虚ノ證ナリ故ニ黄耆建中湯小建中湯ヲ用テ氣血陰陽ノ不足ヲ補フ是治虚労ノ大綱領ナリ後世ノ諸建中湯ハ物湯大補湯ノ類ノ根本ナリ其間陽気偏虚脾胃虚寒ノ者アリ理中湯主之後世コレニ依テ脾胃虚無寒有微熱者四君子湯ヲ以テ補脾ノ聖劑トスルナリ四君子湯ノ類方ハ理中湯ヲ根本トスルナリ又房欲淫事ニ依テ陰虚火動腎火盛ノ證アリ金匱八味腎氣丸主之以生乾地黄瀉腎火コト尤急ナリ後世ノ六味丸諸ノ滋陰降火ノ劑皆以八味腎氣丸相ヒスルナリ後世八味丸無根ノ火元ニ用之陰虚火動ノ薬ヲテハナレ右件ノ治法ヲ熟讀スレハ治虚労ノ大綱領ニ明ナリ諸ノ方書ニ所載ノ治法此ニ外ナラス此病上ヨリ下ルアリ下ヨリ上ルアリテ難經所謂一損損皮毛云云大抵心肺脾腎肝ノ虚ヨリ来ルアリ病後産後ヨリ此證ニナルアリ或ハ誤薬ニヨツテナルモアリ或ハ證ヨリ変ズルアリ病因多シ

トイヘドモ右件ノ意得ニテ諸方書ノ方ヲ以テコレヲ療ズベシ脉ス[illegible]ニナツテハ矛治ナリ療ズヘカラズ況ヤ泄瀉ニ及テハ死ニ近キナリ

○此證婦人血虛男子腎虛又ハ氣鬱或初メ感冒發散ノトキ挂麻ノ菜ニテ發散スベキ寒邪ヲ參蘇飲ノ類ノ凉解ノ劑ヲ用ヒテ咳嗽連綿トシテ不止ツイニ發熱出テ勞咳トナル者多シ大抵勞證發熱咳嗽盜汗脉虛數或咳血ナドアリ藥甚シカラズ食味ナク瘦セノニハ人參養營湯ヲ用テヨシ是モ餘程藥アルニナリテハ却テ藥ヲ增スナリ先ツ逍遙散加熟地黃麥門陳皮知母男子ノ陰虛ノ虛勞初發ニ用ルナリ是モ日久シク床ニツクノモノニ効ナシ或救陰理勞湯ニ酒炒ノ黃藥ヲ少シ加ヘ用ル

コトモアルナリ諸方書ニ利口ニ組シ方數多アリ初發ノ中ハ効アリ何レナリ任考ヘ用ベシ古家ニテハ寒熱強キハ小柴胡湯加石膏用ルナリ咳強ク痰乾キ或痰血アルモノ金匱麥門冬湯加石膏或血證多キニハ砂生ノ生地黃黃連ナドヲモカルナリ咳モ水ノ如ク多ク痰出ルニ小青龍湯加石膏用ルナリシカレ此等ノ劑ニテ効アルハ脾氣未虛大便結シ渴氣味モアルニ暫用テ効アラバ出入加減スベシ未タ床ニフカザル前ノ治方ナルベシ

○婦人女子鬱結ヨリ發熱咳嗽不止モノハ滋陰至寶湯ヲ用ルナリ惣ジテ婦人產後產後一切ノ勞ニ逍遙散ヲ主トス發熱強キニハ加牡丹皮山梔

名加味逍遥散或加麥門冬或見合二皈脾湯ヲ用ルコトモアリ是ハ陰虚血虚労熱強キニハアレ、又滋陰降火湯モ初發咳アリ足心熱出テ陰虚火動ノ幾ト見ユル時ニ早ク用テヨシレ日久シクナリテハ知母黄蘗ハ大キニアレ、又労嗽ニ瓊玉膏ヲ何レノセナリ兼用スベシ至極ノ萎ナレ𠮟面倒ナル薬ニテ用ルモノニ非ズ苓補心湯ヲ用テヨシ此ハ氣道ノ○婦人虚労咳嗽或咳血無汗モノニ非ズ苓補心湯ヲ用テヨシ此ハ氣道ノメグリアレクシテソレヨリ心血ノ損タルモノニ用ルナリ故ニ補心湯ト名ヅク宮娥ニ多ク此證アリ養営湯皈脾湯ノ心脾ノ血虚ヲ補フモノトハ大イニ異ナリ

○虚労泄瀉ノ者ハ多クハ死ス炙ノ苓白朮散或異功散加炮姜芍薬山薬用ルナリ或參朮膏ヲ用レバ十ニ二人モ泄瀉ノ止コトアリ瓊玉膏參朮膏ノ二方李仲梓カ願生微論ニ出タリ

○此證四華ノ灸ヲ早クシテ治スルコトアリ又却テ大キニ障リソヨリ艾強クナリテ床ニ着クアリ壘試ルニ積氣ヲ兼テ艾ナキ労證ニヤハリ唐ノ崔氏カ四華穏ニシテ毎日壮數ヲ倍セス灸シテ効アルモノ多シ類經ノ四華ハ骨蒸ノ艾傳アカハリニ用テヨシ血分乾ト咳アルヒノニハ障ルコト多シ或傳ニ四華患門ハ髎ノ穴ナト大補湯ハ味丸ナドノ相應ナル虚労ハ灸シテ効アリ温補不相應ニシテ平補ノ劑六味丸

ナト相應ナル虚労ハ灸治却テ障ルト云ヘリ是ヲ試ルニ又方相違ナレ
又積塊アッテ気ヲ塞キ労ニ似タルモノ後藤流ノ二行通リノ灸法ヲ
數千壯シテ藥治ノ効ナキ者ヲ全快セシコト其數多シ此乾キモ熱ノ
徃來モ各別ナレ又十四五歳ニテノ内ニ痃労ト云モノ多クハ小兒ノ時ニ
五痃又ハ癖疾ノ殘リヨリ労ニ紛ルヽ説ニ行通リノ灸隨分餘計シ
テ効アリ或ハ咳ナドモ少々アルモノナリ但シ男子ノ陰虚ナルノ血虚或ハ多
産ノ婦人血液燥キ火ノ亢ルモノニ行通ノ灸シテ障ルコト多シ此血液
燥テ灸火ニ不堪シテ却テ障ルナリ然レドモ人ノ稟病ノ傳変モサヽ
ルアレバ一概ニ究メラレハセヌナリ尚後ノ發明ヲ待モノナリ

○十全大補湯　氣血両虚ヲ補ヒ産後金瘡脫血ノ後自汗アル者又ハ用
ルナリ無斆虚労ニ用テヨシ○六味丸　陰虚シテ水カラキ目カスミ或熱出
ナドスルニ水ヲ滋ス寒涼ノ方ナリ宋ノ錢仲陽小兒ノ歯堅ク歩行スルノ遅
ク是皆先天ノ元氣弱キ故ナリ此方ヲ以テ補フナリ○此方ニ加五味子
名ヲ七味丸ト名ハ都燕丸ト云モ云陰虚労嗽ニ究メテ効アリ○崔氏八味丸
ハ是仲景ノ原方ニシテ虚労腰痛少腹拘急小便不利者ニ用テ陰虚
動ノ劑ナリ乾地黄ヲ用テ後世ノ八味丸ト甚功名別違ナリ此辨別
記アリ○後世ノ八味丸ハ足ノ三陰陽氣虚敗シテ悪寒發熱手足倶冷
吐痰不食ニ便滑數等ノ證ヲ治スル是ハ乾地黄ニテ主治大異ナリ又此

人參　白朮
茯苓　遠志各一兩
黃耆　歛地黃　五味子
右姜棗煎○咳嗽加阿膠○此方諸ノ虛勞ニ證脉ヲ不論可用ノ說アリテ究メテ良方ナリ

救陰理勞湯　治陰虛火動皮寒骨熱食少痰多咳嗽短氣倦怠焦煩
生地黃姜汁酒炒透二錢　當皈
芍藥七分　人參六分
右棗一枚徐々服○傳ニ加酒炒黃柏知母滋陰降火湯ノ證ニ用ル十リ加減方彙ナドニアリ救陽理勞湯ト對ノ李仲梓ガ新定ノ方ニ

乾ニ加車前牛膝陰分不足ノ水腫小腹無力下焦ニ腫多ク無熱小便不利者ニ用ルナリ此嚴用和ガ濟生腎氣丸ナリ丸此後世八味丸八種々ノ證ニ多ク用テ効アリ諸ノ方書ヲ見ベシ

○儲虛勞嗽ト勞咳ハ治方大ニ異ナリ虛勞嗽ハ藥相應シテ厚ク養性スレバ快氣スル者多シ風邪後ノ咳長引テ勞咳ニナリシハ藥餌灸治湯藥ノ及ブ所ニアラズ捨鞭ウツテ麻黃附子細辛湯ヲ用ベシ十人ニ人ハ助ルコトモアルベシ

人參養營湯　治ニ男婦諸虛不足止汗補心除血虛潮熱
芍藥三兩　當皈　肉桂　甘草　橘皮

救陽理勞湯ハ補中益氣湯去升柴加肉桂五味子治勞傷氣耗倦怠懶言動作喘急表熱自汗心煩偏身作痛コレ勞役氣耗ノ感冒ナトニ用テ効アリ後世ハ味丸ナド兼用ルコトモアルナリ

滋陰至寶湯　治婦人經水不調因鬱生勞潮熱咳嗽有盜汗者

當歸　白朮　芍藥　茯苓　陳皮　貝母　知母　香附　地骨　麥門各八分　柴胡　甘草各二分

右生姜薄荷水煎或諸菜等分

逍遙散　方見諸書　加牡丹山梔名加味逍遙散前證羸強者主之○本古去白朮甘草加陳皮青皮香附和阿先医傳名平肝湯

濕痰加半夏燥痰加貝母有火加山梔婦人專用ノ劑トス逍遙散ニ重悸積氣惱ヲ兼ルモノ多シモト平肝流氣飲ニ黃連梔子半夏ヲ等厚朴吳茱萸甘草ヲ去シ方ナリ白朮ハ動悸積氣ニ障ルヲ忌ミ逍遙散ニ去シモノナリ常ニ婦人ノアシラヒニ用アヨシ又婦人ノ積痛肝火ヲ兼ルモノ多シ本方平肝流氣飲ヲ用ルナリ或傳ニ婦人血痛或赤白帶下淋病ナド血中ノ氣ヲ順スルニ烏荅通氣散ヲ專用ヒ肝火積氣ニ平肝流氣飲ヲ專用此二方ヲ以テ婦人ノ常用ノ劑トス此老医ノ傳ナリ一概ニ拘ヒ、カラズト云ヘドモカヤウナ療法モ時ニヨリ用タキコアルモノナリ　方并ニ加減無方規矩大成労數門ニ見ユ

人參　白朮　名八　薏苡仁　四兩
茯苓　二兩　神麯　一兩　澤瀉　蓮肉　三兩　黃耆　二兩
右水二斗煮一斗去滓再煎○此レ煎ジツメ膏ト(カウ)ナスユヘ(其ノ功速ナリ)參苓白朮散異功散加味ヲ効ナキニモ早ク用テヨシ或傳ニ此膏効アリト云ヘ(尤容易(ヨウイ)ニ製(セイ)シ難シ)右九味細末メ水ニテ煮熟(ニヤス)レ膏ノ如クニシテ用ベシ早ク用レバ効アリ大便少々ニテモ和カナ幾(キ)レアラバ油(ユ)斷(タ)セズ用ベシ

諸血

凡(ソモ)血ノ外ヘ溢(アフ)ルハ皆(ミナ)熱(ネツ)ニ屬(ゾク)ス脉洪大ナルヲ忌(イム)ム沉小ナルヲ吉トス吐血(トケツ)衄血(ジクケツ)ニ犀角地黃湯ヲ主(シユ)ス若(モシ)トスベシ此(コノ)場ヲ古方家ニテハ三黃瀉心湯ニ生地黃(シヤウヂワウ)

歸脾湯　思慮(シリヨ)過制(スギ)勞傷(ラウシヤウ)心脾健忘(ケンバウ)怔忡(セイチウ)嚴氏原古

白朮　茯神　黃耆　龍眼肉　酸棗　各一兩
人參　木香　各半兩　甘草　二錢
右姜棗煎○加當歸遠志常用此ニ辟氏重訂之方也血虛發熱者加牡丹山梔名加味歸脾湯

滋陰降火湯　治陰虛發熱(ハツネツ)咳嗽(カイソウ)痰喘(タンゼン)急盜汗(タウカン)口乾(コウカン)脾胃未虛者

方并ニ加減衆方規矩大成勞嗽門ニ見ユ

麥門冬湯　見咳嗽　小青龍湯　見傷寒　參苓白朮散　見痢疾

參朮膏　治虛弱之人脾胃(ヒイ)虧損(キソン)或腹(ハラ)瀉(クダ)

三又或五又十又加ヘ用テ大ニ効アリ然レ𪜈是皆實ナルモノナリ又吐血
衄血甚ノ欲絶モノ獨參湯ヲ用ルナリ是血脫ニ補ヒ氣ヲ古聖人之法也ト
シテ先賢ノ拾言ナリ古方家ニ熊參湯ヲ用テ專ラ逆氣ヲ下シ熊
五分水煎ジテ用ルナリ此人參吉野人參ヲ用テ
膽ト亜用テ逆上ノ血勢ヲ開キ推シ下ルノ功ニシテ血脫シテ氣モ絶セントス
ルトキ韓參ノ獨參湯ヲ用ルトハ其意逈カニ異ナリ動モスレバ茶方ニヨ
リ韓參ト吉野人參トノ違ニテ同名異方ノ茶アリ此議遠國ノ医俗ト
モニ意得アルベキコトナリ京攝ナトニテハ大抵素人ニデモ理會シテ居
ルナレバムサトレタ間違ハナシ

○吐血モ酒呑ノ吐血ハ治レヤスシ是ハ酒ニヘ熱逆上シテ吐血スルユヘ右ノ三黄
ノ類ニテ治スルナリ下戸ノ吐血ハ心血ノ傷レ多シ故ニ難治ノ虛弱ノ人氣
不足ノ吐血ニ歸脾湯加麥門阿膠大キニ効アリ古方家ニテハヤハリ黄
瀉心湯ヲ用ルナリ此段同レ病ニシテ藥ノ雲泥ノ違アルコト不審
○咳血ニ古方家麥門冬湯生地黄ヲ五又以上ヲ加ヘ用ルナリ下血モ
先ツ三黄瀉心ニ生地黄ノ如味ナリ是古來ヨリ生地四物湯ニ黄連解
毒湯ヲ合方シテ用ル場ヘ三黄生地黄ナリ單方ニシテ生ノ地黄ナ
ルユヘ何程餘計用テモ野菜ノ煮汁ノ如ク薄ヘテ呑ヤスク血熱ヲ解
スルコト甚タ速ナリ此等ハ實ニ近來古方家ノ使ヒ覺ニシテ中古ノ医

ノ未開處ナリ然レ共邊鄙ニテハ生ノ地黄得安カラズ志アラバ自ラ園ニ造リテ用意スベシ山城大和ノ産ホドニハナレト云ヘ共培養ヲ精シクスレバ細キ地黄ハ何レノ土地ニテモ生ゼズト云コトナシ此事ハ戸田子ノ非薬選ニモ云ヘリ

○下血久シク不止モノ古方家ニテハ苦飯膠艾湯ヲ用テ此ヲ生ノ地黄五錢ヨリ十錢ニテヲ加フ阿膠ハ生ニテ煎シ上ケアトヨリ入レテトラカシ用ルナリ然レ共下血久シクス止顏色青ク短氣ニシテ歩行モ成リガタキニハ益氣湯ハ物湯大補湯ニテ効ヲ得ルモノ多シ諸ノ方書ヲ考ベシ

○唾血咯血ハ陰虛火動腎虛ノ證ナリ古方家ニハ麥門冬湯ニ生地黄ノ加味ナリ古來ヨリ知母黄蘗ヲ用テ陰火ヲシレメス四物湯加知母黄蘗ナリ或ハ黄ノ泥ム證ニ陳皮貝母茯苓白朮桔梗知母黄柏甘草ノ八味ヲ用テ輕クアシラフコトモアルナリ

○風ノ腸胃ニ入テ泄瀉シ便血ヲ下ス其色ズバ黒キ氣味アルナリ胃風湯ヲ用ベシ泄瀉門ニアリ

○痔ニテ下血スルニ大抵加味逍遙散加槐花生地黄ナリ日文シキモノハ加阿膠古方家ニハ三黄湯加生地黄當歸ナリ

○溺血ニハ古方家傷寒論ノ猪苓湯ヲ用ルナリ又甚々實熱ノ者ニハ

大承気湯加當帰コレラハ農夫ナド二間二アルコトナリ大抵溺血ノ劑ハ清腸湯ヲ用ルナリ其外日久キニ至テハ加味逍遙散益氣湯四物湯六味丸加牛膝等ノ古ニテ効ナキニ古方家猪苓湯カ又ハ大承氣湯ニテ即功アルコトアリ虚實ヲ考ヘ用ベシ

○吐血咯血　諸方書ニ補瀉上下ノミニ精シク擧テアリ考ベシ陽虚ノ吐血ニハ歸脾湯陰虚ノ吐血ニハ犀角地黄湯ナリ此二方ノ意ヲ以テ古來ヨリ用ヒ來レル劑又近來古方家ノ用方ヲ考合テ施治スベシ

○又吐血ニ脾胃虚弱ニシテ氣促氣乏シク精神短少血吐血スルモノアリ人參飲子ヲ用ベシ又當帰補血湯又保元湯小建中黄耆建中湯

ナド證ニ隨ヒ用ルコトモアリ○又理中湯加木香胃虚不能食化其氣逆上シテ吐血血ヌルコアリ如斯ノ氣劑ヲ用テ治スルコトアリ○又四君子湯加葛根川芎山梔傷酒吐血ノモノニ用ルコトアリ○又六君子湯加香附子縮砂葛根飲酒過多ニノ胃ヲ傷リ吐血スルモノニヨシ其外六味丸生脈散ナドノ治法多シ博ク方書ヲ考ベシサレド博ク方書ニ渉ルトイヘド取シリナフシテハ却テ見ヌモヨリモ劣レリ大部小部ノ書ニ限ラマ眼ノツク処アルベキコトナリ證治準繩ナドヲ枕トシテ居ル医師ニ存ノ外働ザル療治アリ衆方規矩一巻ニテモ手ニ入リ呑込ヨケレバ功者ナル醫師アリ大部ナ医書ハ唯道具立テ同前ニナリテアマリ近來ハ費用

右水煎數多者加黄芩

三黄瀉心湯　心火盛而吐血衄血者

黄連　黄芩　大黄可撰重或大黄二兩黄芩黄連各一兩實者

右各等分以麻沸湯擺之用或以冰一盞二三分煎一盞

芎歸膠艾湯

川芎唐或豐後　阿膠　甘草各二兩

芍藥四兩　生地黄或乾地黄五兩　艾葉三兩　當歸三兩

右水煎

猪苓湯

廿ス正宗ノ名劔モ無手ニテハ用ニ立難シ近來古方ノ流行スルモ手取早ニシテ傷寒金匱ノ両書ニテ一切ノ治法相濟ス故ナリ千金外臺ノ方モ取扱ヘモノレハ餘程吟味アリシ上ノコトナリ其外ハ動スレバ三黄瀉心湯ヲ會ニ數モナク投ズ辺ニ鄙ナド此流義アリテハ医俗トモニ不案内ノ輩多ケレバサテ〳〵アブナモノナリ能々意得ベシ

犀角地黄湯　上膈壅鬱數血攅胸中吐出紫黑塊血脈洪大弦長按之有力精神不倦者或食熱物或傷温酒毒血上迫面赤身數譜語○此方用衄血者則有瘀熱於經中而暴衄者主之

犀角如無以升麻代之　芍藥

生地黄

牡丹皮

猪苓　茯苓

右水煎

清腸湯　溺血者小便出血心移鬱於小腸也

當帰　生地黄　山梔　黄連　芍薬

黄柏　瞿麥　赤茯苓　木通　蘇畜

知母　麥門冬各一　甘草減半　烏梅

右燈心水煎

麥門冬湯　見咳嗽

皈脾湯　見虚労

阿膠　滑石　澤瀉各一

自汗ハ陽虚盗汗ハ陰虚ナリ自汗ニハ益氣湯或黄蓍建中湯盗汗ニハ逍遥散加地骨皮或當皈地黄湯ヲ用ルナリ又盗汗ハ半表半裏ニ邪ノ多ク出ルモノ多シ柴桂湯ヲ用ベシ或熱強ク小柴胡湯尤ヨシ又自汗モ内ニ熱甚シテ蒸レテ出ルコト多シ白虎湯竹葉石膏湯ノ類ニテ熱サムレバ止ムモノ多シ全ク陽氣不足ノ證ハ自汗出テ脉虚ニシテ力ナシ是ハ黄蓍建中湯ヲ用ベシ又盗汗モ麥門冬湯加石膏用ルコトアリ是ハ虚労ノ類咳アツテ盗汗出ル二用ルナリ或汗證ニ小蒜胡湯加石膏用ルコトアリ又温熱病時疫汗吐下ノ後盗汗者小蒜胡湯去人參半夏加擣皮或濕熱ニヨリテ陰嚢ヲダン汗ヅクモノ

陰汗ト名ク此湯去人參加茯苓龍胆黃栢

○陽虛氣弱ク虛汗大出止ズ肢躰倦怠スルニハ附子黃耆等分姜棗煎

コレヲ者附湯ト名ク又陽虛自汗風寒ニ不堪モノハ四君子湯ニ茯苓ヲ

減シ黃耆桂枝或附子ヲ加ヘ用ベシ又一切大病ノ後食減シ盜汗スルニハ參苓

白朮散加黃耆當飯用ベシ又盜汗ニ當飯六黃湯ニテ効ナキニハ參養胃

湯ヲ用テ効アルコトアリ是ハ顏色蒼々トシテ食減シ脉緩弱ナルヲ目當

トスベシ

○汗ハ産後ノ大禁トス急ニ人參ヲ不用トキハ其朝夕ヲ保チ難シ保元

湯合四君子湯加芍藥五味子用ベシ

○金匱云男子平人脉虛弱微細者善盜汗出ト云ヘリ此證ニハ當

歸補血湯ニ炒酸棗仁半兩ヲ加ヘ用ベシ數服ノ後七味地黃丸ヲ兩ヲ調

補スベシ此外自汗盜汗ノ治法多シ此ニ大概ヲ擧ゲ諸方書ヲ考ベシ

當歸地黃湯　治盜汗屬氣血兩虛者

當歸　熟地黃　黃耆　白朮　茯苓

芍藥　生地黃　各一兩　人參　五分　陳皮　八分　甘草　三分

黃柏　知母　各八分

右水煎浮麥水煎温服

桂枝加龍骨牡蠣湯　治男子失精女人夢交自汗盜汗者

桂枝　芍藥　龍骨　牡蠣各三兩　甘草炙二兩

右大棗水煎

竹葉石膏湯

竹葉一把　石膏二兩　半夏半升　人參二兩　甘草一兩　麥門冬一升

右青竹葉生姜粳米水煎○極熟發狂倍知母○熟嘔加生姜汁

當歸六黃湯

當歸　黃耆各二兩　黃柏　黃芩　黃連　生地　熟地各七分

右水煎

人參養胃湯　見二痛門

人參二錢　黃耆三錢　甘草一錢　右生姜水煎

當歸補血湯　治氣血虛損或妄服峻劑致氣血鹽虛如熟大渴引飲目赤面紅脈洪大而虛重按全無此病多得於強飽勞役者

黃耆蜜炙一兩　當歸二錢　右水煎

七味地黃丸　陰虛盜汗咳嗽堪用

六味丸加五味子二兩　一名都氣丸

痰飲

古云痰生百病上至巔根本乎腎議スレバ痰ヨリ生スルモノデハ

ナレ何ナリ𪜈病ガアツテ痰ヲ生ズルカラレテ変ジテ百病ヲ生ズイツチノ根本ハ痰デハナイ痰ニナツテカラ又百病ヲ生スルナリ先ツ痰ヲ本トシテ療治スベレナヲモ其本ヲ吟味スレバ痰ヲ生ズル本ガアル程ニソコニ意ヲツケテ療治スベシ偖痰ノ療治ニナツテハ痰ト飲トヲ分別スルガ肝要ナリ不調粘ヲ飲トレ調粘ナルヲ痰トス飲ハ寒ニ属レ痰ニハ濕ニ属スルト火ニ属スルトノ違アリ先ツ飲ハ水ナリ仲景ノ水気ト云モノ是レナリ外ヨリ飲物内ヨリハ肺ノ液コレ水氣ナリツレガ何ゾ訣ガアツテ飲トナル飲ニナツテハ五ツノ品アルニヨツテ五飲ト云テ別アリ其ノ水ニテ一身ノ中ニアツテ事ヲスル間ニハ手ハリタルガアレバカタ

ツタバカリニテ粘リケントコロテンヲ見ルヤウナハカタニツテモ飲ナリ此治痰飲

寒ニサテ濕痰ト痰火ノ別アリ濕痰ハ脾胃不健レテ水飲ヲ不行ニ滞テ痰トナル半夏南星ノ燥劑ヲ用ルナリ其中デモ脾濕バカリナレバ濕痰ト云半夏ガヨイ肝カ手傳ヘバ風痰ト云テ南星ヲ用ユ痰ノ色青キモノナリサレバ如青キモノデモナシ又濕痰デハアリナガラ火モ手傳フコトアリ二陳湯ヲ主トレテ貝母瓜蔞仁黄芩ト濕火相兼テ療ズルコトモアリ痰火ト云ニナツテハ一向ニ燥劑ヲ用ルコトヲ忌ナリ潤劑寒劑ヲ用テ半夏南星ノ燥劑ヲ忌ムナリ是ニツイテ五臓ノ司ドル処カライヘバ色々名アレバ大抵如此意得ルトキハ大要ガスムナリクレカラ諸方各ヲ見テ考ル

トキハ大ナル差ナカルベシ飲ノ脈ハ弦ナルモノ濕痰ノ脈ハ洪ナルモノナリ痰火ノ脈モ洪ナルモノヲ是ニ兼ルトコロノ脈ガ各アリ此ヲ能考テ療治スベシ中風ナドノ痰涎壅盛ト云トキハアトリ細カニ哮味セズニ只急ニ痰ヲ開クマデニスベシ

○儲金圓三四ツノ飲アリ痰飲懸飲溢飲支飲ナリ甚詳ニ拳テアリ精ク攷覧スベシ今古家專ラ飲家ノ病ヲ瀉下ノ丸散ヲ投シテ久シキ留飲ナト即効アルコト此ニ近來ノ使ヒ覚テ手際ナルコトナリ懸飲ノ内痛ハ金圓三錢ルコトク飲後水流在脇下數唾引痛謂之懸飲ナリ一武官富貴奉養ノ人稀古ニ近シ平端厚味ニシテ下戸ナリ菓子餅ノ類ノ甘味ヲ嗜ミ持薬ニハ益氣湯八味丸ナリ且ツ持病ニ頭痛脱肛アリ魚鳥ノ類過食ノ後ハ究メテ頭痛或脱肛發ルイツニテモ頭痛ハ香砂六君子湯或消導ノ劑ヲ用テ黄水ヲ吐シ或痰水ヲ吐シテ即チ愈ユ一日風ト一声ノ噯出ヅ脇下ニ引痛ミ身動シ歩行スルコトナラズ二便共ニ両人扶テ甚タ苦メリ然レドモ飲食氣力平日ノ如ク脈弦ナリ三四医更ク治スレドモ効ナシ既ニ七十餘日ニ及ベリ此レ懸飲ノ内痛ナリ古方家ヲ招キ治セントスレドモ衆評一ニチクニシテ唯恐畏シテ決セズヲ強テ進之遂ニ古方家先達ナルモノヲ招キ治セシム即チ十棗湯ヲ以テ粉菜五分ヲ翌朝用ヒ輒シテ粥ヲ與フ忽チ腹鳴動シテ大便ニ行ク便器ヲ以テ是ヲ見レバ米泔汁ノ如キ留飲一

升餘ヲ下ス赤豬シテ七八合ヲ下ス午前鮎ノ炙物ニテ飯二椀ヲ食ス味常ニ異ナラズ申ノ刻ニテ三四行米泔汁ノ如キモノヲ下シテ申中刻七十余日アリニテ始テ自ラ起チ七八歩ス此ノ即効衆拳驚ク後五七日シテ出勤平日ノ如シ實ニ是古方家ノ近來行ハレ奇特ナリ其外控涎丹ノ類留飲ニ用テ即効アリ金匱甘遂半夏湯ナドハ呑ニクキ煎湯ニヘ大抵ハ控涎丹ヲ用ルナリ其外溢飲支飲ノ治法金匱要畧ニ詳ナリトイヘ共未熟ノ輩妄リニ虚實ヲ辨ヘズ投ズベキ劑ニアラズ即効アレハ亦即害アリ審ニ詮察スベシ痰飲ハ胸脇支滿目眩スル者ニ挂苓木甘湯ナドハ平和ノ劑飲證ニカキラス近世流行蔡ナリ隨分水氣ナドニ効アリ用ベシ短氣有微

飲ニ小便ヨリ可去之トアリ挂苓木甘湯主之ハ味厚氣乏ト云ヘリ且定等ノ方ハ未熟ノ者取扱ヤスキ方ナリタトヒ的中セサレヒ害ナシ又外臺ノ茯苓飲ハ醫方紀原ニ六君子湯ノ原方ナリト甲賀子イヘリ心胸ノ中ノ停飲宿水ニ用テ即効アリ小青龍湯ナドモ溢飲ノ某ナリ溢飲ノ病ハ飲水流行シテ四肢ニ皈シ汗出ベシシテ汗不出身体疼テ重キモノヲ溢飲ト云ナリ大青龍小青龍ノ二方ヲ選用ルナリ欬逆倚息短氣不得臥其形如腫モノヲ支飲ト云瞬間ノ支飲ハ木防已湯ノ支飲ハ其人苦シミ冒眩スルハ澤瀉白朮湯支飲胸滿者ハ厚朴大黄湯支飲不得息者ハ葶藶大黄瀉肺湯主之嘔家ノ心下ニ有支飲ニ小半夏湯ヲ用ルナリ

以上ノ諸方金匱要畧ニ詳ナリ披覧スベシ○五飲湯ト云アリ王海蔵カ製ナリ五飲通シテ用ル先輩コレヲ笑ヘリ軽證ニハ用ヘシ旋覆花ノ功甘遂芫花ノ代リナリ水飲ヲ逐フノ能アリ飲家ニ用テ効アリタトヒ不的トイヘドモ害ラナサス或傳ニ旋覆花一味別ニ細末ノ五飲湯ヲ呑汁ニテ一度ニ二分三分用テ飲證ニ効アリ何分甘遂芫花ノ代ニ用テ書ナシ旋覆花デ即効ハナケレドモシテント飲水カヌケレハニタ用ヤスキ方ナリ

○火實ノ積痰アヤシキ證候アルハ滾痰丸ヲ用ベシ火ニ属スル痰百般ノ患ヲナス證ニ奇効アリ精シキ主治ハ諸方書ニアリ考ヘ用ベシ滾痰丸ハ火ノ痰ニ用ルナリ控涎丹ハ水ノ痰ニ用ルナリ是即飲ナリ二方ヒニ人ノ虚実ヲハカリ精シク考ヘ用テ誤ルベカラヲ

○悸痰ニ用ル諸方畢竟シテ何レノ方書ニモ出ラアリ見ルベシ大抵二陳湯ノ方後ノ加減ニ委クアリ近来動スレハ昨今ノ鍼医半分ノ新医師カ葉ヲ調合スルニモ留飲ト云ノ流行テ古古家ノ言ヲ真似フコトオカシ既ニ飲トイヘハ痛キ去ル治法ナリ胡乱ニ指ノシ、武者ヲスルトバカリ云スト又薛氏ノ治痰ノ法モアラン理會スベシ六君子湯加木香脾虚痰滞氣逆ノモノヲ治ス補中益氣湯合二陳湯脾気虚弱不能消湿シテ痰ヲ生スルモノニ治ス人参理中湯胃氣虚弱寒痰凝滞ノモノヲ治ス六味地黄丸腎虚水泛テ生痰モノ腎經血燥ニ因テ生痰モノ腎虚陰火上炎ノ生痰モノヲ并治ス八味丸腎氣虚寒痰上湧モノヲ治ス

右八虚人又八中人以上腎氣治ニ入ルコトナリ精シク考ベキモノナリ

桂苓朮甘湯　心下有痰飲胸脇支滿目眩

茯苓四兩　桂枝三兩　白朮三兩　甘草一兩

右水煎

小青龍湯　大青龍湯　見傷寒

小半夏湯

半夏一升　生姜半斤

右以水七升煮取一升半ヲ千金ニ半夏加茯苓湯　加茯苓三兩

一法四兩　卒嘔吐心下痞膈有水絶食者此方主之

外臺茯苓飲　治心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓　人參　白朮各二兩　枳實二兩　橘皮二兩半　生姜四兩

右水六升煮取一升八合分溫三服

十棗湯

芫花　甘遂　大戟各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取九合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢平旦溫服之不下者明日更加半錢得快下後糜粥自養○十棗丸諸藥各末分以棗肉煮熟去皮

按攝爛爲丸梧桐子大每服四十丸清漿以飲湯下之治水氣浮腫上氣喘急大小便不通者

十棗湯變方　陳養晦傷寒五法　治裏有水氣其證乾嘔脇痛心下滿咳引脇下痛身涼不發熱

芫花　大戟各二分　甘遂二分

乾姜五分　大棗十枚

右水盞半煎八分先服四分停半日又進若下後病不除者明日又進以脇中和快爲度後進藥粥此方平和也汲古方十棗湯者先以此方試之可也

控涎丹　留飲之下劑

大戟　甘遂　白芥子各等

右爲細末姜汁打麪糊丸梧桐子大每服七丸或二十丸以津液下

滾痰丸　諸實熱積痰異證孕婦勿服

青礞石色青者良三兩同焰硝三合入瓷瓶磁內赤石脂封罐口煅過水飛淨二兩　沉香一兩

大黃八兩　黃芩二兩

右爲丸食遠服

五飲湯　五飲通用

人參　白朮　茯苓　甘草　枳實　厚朴各

陳皮　半夏　猪苓　澤瀉　前胡　肉桂
苓葉　旋覆花各ホ分
右姜煎温服　○因酒成歉加葛根葛花縮砂
甘遂半夏湯　木防已湯　木防已加茯苓芒硝湯
澤瀉白朮湯　厚朴大黄湯　葶藶大棗瀉肺湯
以上六方見金匱要畧
右ノ外痰飲ノ諸方ハ局方以来諸古書ニ載シアリ考ベシ

咳嗽

噎嗽ノ病因甚多シ一例ヲ挙ンカ為ニ方書ニモ六気ノ咳嗽ヲ載セソレヨリくレテ虚実寒熱種々ノ咳嗽ヲ此記ス此外ニ内経ニ五蔵六腑ノ咳ヲ説ク治方證治準縄張氏醫通等ニ評ナリサレモアレガサイくアルコトニテモナシサレ𪜈間ニハアルコトナル程ニ考テ用ベシ大抵感冒ノ咳嗽ニテ一旦咳ニテツテハ早速ハ不愈モノナリサレバ此ハ外邪ガ解スレバ自愈ルモノ感冒ガアラマシ愈タラバ服薬ハ止ムベシ感冒ノ咳嗽サヘコレナレバ外ノ咳嗽ハ難止モノト兼テ意得ベシ唯心ノユルサレズ氣遣ナルハ労咳ニハナルマイカト油断スベカラズ偖外邪ノモノハ發散スレバ咳オノヅカラ止ル小青龍湯コレ又ハ軽キ咳ニテ外邪強キモノハ仲景ノ葛根湯加杏仁桑白皮イヨくヨシ此ハ婦人ナトノ八ツ場ニ参蘇飲ヲ用ルナリ加杏仁桑白皮イヨくヨシ此ハ婦人ナトノ

気鬱ヲ兼タル二用ヒテヨシ若シ初メ風寒ニ傷ラレ咳スルモノニカマウノ参蘇飲ノ涼解ノ劑ヲ用レハ風寒ヲ去ラズ却テ氣連綿トシテツイニ咳不止シテ労咳トナルモノ往々アレ誤ルベカラス凡咳ト云モノハ無形ノ氣ニテ難止モノナリ労咳ノ咳ハ不治ナリ咳ハ常ノ咳ニテモ止ガスル二殊ニ脉細數ニシテ咳出ルモノハ労ニテ治シ難キモノナリ又小兒ノ咳モ多ク中焦ノ食ノ停滞ニテソレニ今食トコロノ食又次足シテ中焦ニヒタシ捕ムユヘ治シレニクシスベシ不換金二杏仁桑白皮ナトヲ加ヘレ故ニ小兒ハ中焦ヲスカスヤウニスベシ不止疲乾キ胸中ニ粘リツキテ出ガタキモノハ金匱麥門冬湯ヲ用ヒ下シテヨシ後世ニテハ清肺湯ヲ用ルナリ又感冒ノ後咳不止甚ダ咳入リ顔赤ク上氣シ疲ル事出モノハ柱苓五味甘草湯ヲ用テヨシ後世ニテハ杏仁五味子湯ト云方アリ此ヲ用ルナリ○慾シテ何レノ證ニテモ咳アツテ涕ノ如ク痰水ヲ吐クハ此ヲ水氣或留飲ト云労咳水腫ノ咳ニモ小青龍湯ヨシ石膏ヲ多ク加ヘテ用ルナリ此ハ下地熱アル證ユヘニ小青龍湯ハ温劑ユヘ石膏ナケレハ大キニ上ルユヘナリ發汗ノ時感冒ノ最初亦熱ナキ咳ニハ石膏ハ無用ナリ貝母ハ痰ヲ開シヌグウラ取ヤウナモノナリ故ニ虚労ノ咳ナド陰虚ノ咳ニ半夏ノ燥ク剤用ヒ難シ故ニ貝母ヲ用ルナリ貝母ハ鬱ヲ解スルモノナリ秦白皮ハ肺熱ノ咳ニ黄芩ト同用テ肺火ヲ瀉スル風寒ノ邪ニテ咳スル者ニハ忌ム杏

仁ハ氣ヲ下シ胸膈ヲ通利シテ少シク發散ノ意アリ故ニ表邪アル證ニ用ルナリ五味子ハコレモ咳ニ用ル是ハ滲散ノ氣ヲ收メ潤シテ咳ヲ止ムル故ニ又咳ニ用テ能スナリ故ニ外邪ノ者ニハ忌ムサレド小青龍ノ五味子ヲハ麻黄杏枝ニツレテ内ニレメル意ナクレテ咳ヲ止ルナリ半夏ハ脾胃ニ聚ル濕痰食痰ヲ驅モノナリ具母ハ胸膈ニ聚ル燥痰ヲ潤シ流スナリ

小青龍湯　見傷寒　此古ハ風寒ヲ發散シテ水氣ヲ去ル方ナリ此ニ咳嗽アリノ如ク痰出ルモノニ用テヨシ又ハ水腫ノ咳嗽ニ用テヨシ又咳嗽アツテ面目浮腫シ或ハ小便不利ニモ用ルナリ枳風寒ニ感スルトキ涼解ノ劑ヲ不用此方ヲ用ルハ風寒去テ咳止ミ労ト ナルコトナレ又久咳嗽アリ或労咳ノ類又ハ水腫ニテモ咳嗽ニ用ル時ニ石膏ヲ加ヘサレバ藥某ニヘ升リテ却テアシレ石膏ヲ入テ鬱熱ヲ和スルコトヨシレ即金匱ニ肺脹欬而上氣煩燥而喘脉浮者心下有氷小青龍加石膏湯主之トイヘリ

麥門冬湯　大逆上氣

麥門冬　二合　半夏　八分　人參　二分　甘草　一分　粳米　八合　大棗　大十枚

右水二盞煎一盞○隨證加石膏三錢○此方ハ虚火ヲ下ヘ導キ又逆上氣ヲ治スルモアリ又ハ火逆上氣ヲ治スルモアリ兎角潤シテ気ヲ下ヘ

行サスルト見ヘタリ麦門冬ヲ多クシテ半夏三ツ割一合入テ麦門ノ重キヲ半夏ニテ用ルナリ又時疫ノ大抵愈サメテ後餘熱アッテ耳聞ヘヌ或ハうくスルト云ニスヘテ用テ調理スルナリせ上ノ大補陽ナトノ場合ニ古方家專ヲ用ルナリ此時ハ韓参ナルヘシ此茶免角滋シテ津液ヲ生スルモノナリ又ハ上氣シテ少シ耳ナトモ鳴リ煩ニ動アルモノニ用ルナリ又狂癇ニテサシ上ルモノニ麦門加黄連湯ヲ用ルナリ甚シキモノハ石膏ヲ加フ此時ハ三黄丸ヲ兼用ルナリ泄瀉アルモノニハ麦門冬湯ハ不用ナリ

桂苓五味甘草湯

桂枝各四両　甘草二両　五味子和産半升

右四味以水八升煮三升去滓分三温服

清肺湯　治肺熱咳嗽脈數脾胃不虚者

黄芩一錢半　桔梗

桑白皮各一錢　當帰

麥門各七分　五味七粒

右姜棗煎食後服○痰嗽有三因二痰火者加薑杜蜜湯因治濕痰二陳湯因肺熱者此湯主之○或痰咳久不止向因脾胃未虚者此一方主之天花粉當歸唐厚朴茯苓半夏甘草知母各等分甘草

古芎前次有血去知母加阿膠或白芨

杏仁五味子湯 諸嗽通用

杏仁 枇杷葉各一枚 橘皮七分 五味子 桔梗 甘草炙各五分

右ノ煎温服ス○春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏黄芩知母麥門○夏多火熱炎上宜清金降火加柴白皮黄芩知母石膏麦門○秋多濕熱傷肺宜清熱滲濕加蒼朮柴白皮防風山梔黄芩○冬多風寒外感宜解表行痰加麻黄桂枝半夏防風乾姜

右ノ外数數ノ葉諸方書ニ多ク見ルヘシ

世俗喘息ト云ハ哮證ト云モノナリ此ハ多ク下地疾熱アル人風寒ニ感シテ發スルニ極暑極寒ニ發ラス春ノ暖氣ニナリテ秋ノ冷氣ニナリテニ必發ルモノナリ黄芩麻黄ヲ主薬トス黄芩ニテ熱ヲサマシ麻黄ニテ邪ヲ散スル赤水玄珠ノ黄芩半夏湯ト云薬毎々効アリ○産後ノ喘嗽後ノ喘久病ノ喘コレ何レモ死證ナリ獨參湯參蘇湯參附湯ヲ用ヒ届ノモノアリ不届モノアリ病ノ淺深虚實アルヒハ人參ノ善悪多少ニモヨルナリ古方家ニハ熊參湯ヲ用ルナリ

○持病ノ喘急ニ蘇沈丸宝湯モ宜シ古方ニハ麻黄杏仁甘草石膏湯

喘嗽通用

二陳湯
陳苓各二錢
半夏二錢半
甘草五分
右姜棗

大キニ効アリ哮喘久シク不止風寒去テ痰火ノコリ久シク喘不止モノアリ或咳喘甚シク胸痛大ニ苦シム此ニハ瓜蔞枳実湯充宜シ竹瀝姜汁ヲ入サレバ功ウスシ或又何ノ事ニアヅカリ氣ヲツカヒ俄ニ喘スルモノアリ此ハ蘇子降氣湯ヲ用ベシ哮證ハタヘクハ夜強クイテ明方ニユルクナルモノ

黄芩半夏湯
薑芩　生姜各三錢　芍薬
甘草各二錢　大棗二枚　半夏半合
右吸咀水煎服

稀涎丸寛湯　治人素有喘急通寒瞳不常發則不止啫吼夜不得睡者
紫蘇　陳皮　薄荷
麻黄　杏仁　桑白皮

大腹皮　肉桂　甘草
古水煎

瓜蔞枳實湯　治痰結咯吐不出胸膈作痛不能俯或痰結胸膈
瓜蔞仁　枳實　桔梗
薑芩　山梔各一錢　當歸二分　縮砂各五分　甘草三分
右姜煎入竹瀝姜汁〇胃火痰結加石膏知母甚動

蘇子降氣湯　治因憂悲意而氣困不得升降一旦氣逆發痰喘咳嗽
蘇子降氣湯　前胡各二両　陳皮　肉桂各三両
當歸　甘草　厚朴

蘇子　半夏　各五両

右挙末ス一匙ヲ足ヶ以テ之ヲ嚥メテ効アリ

右ノ外小青龍湯諸ノ涎白散或ハ君子湯ナド氣虚シテ火肺ニ入ルモノハ生脈散又ハ陰虚シテ火金ニ乗シテ不得臥モノハ六味丸ヲ用ルナリ喘急腎虚火源ニ不歸モノハ八味丸ナド用ルコトアリ諸方書ヲ考ベシ此證平日淡味ヲ食ベシ厚味胃火ヲ動スルトキハ甚發ルコト劇シ

短氣　少氣　逆氣

諸方書ニ記スコトクニツトモ二條ニ各息遠シキ事ナリ此ニ爽カアレハ喘息ナリ疼ハ無ケ息遠シキヲ穪氣トモ氣トモ云ナリ諸病ニツイテ息遠シキヲ云證ナリ短氣ハ虚寒ナリ少氣ハ一向ニ虚證ナリ○水心下ニ滯リ短氣小便難キハ五苓散○短氣ハ微飲アリ小便ヨリコレヲ去ルベシ桂苓朮甘湯主之朮金匱腎氣丸主之ト云ヘリ甚ウチニ呼氣ノ短キハ桂苓朮甘湯ナリ吸氣ノ短キハ腎氣丸ナリ又虚證ノ短氣小便利者ハ四君子湯云茯苓加黄耆若シ腹中氣不轉者ハ倍甘草肺氣短促或息スルニ足ラズ或胷虚發熱唾痰者生脈散加當歸黄耆生地黄九病後虚後一切瘡瘍潰後氣虚不能接續及年高病久正氣耗散之人雖有痰火不可治有餘誤用耗氣藥大劑生脈散

高若少佐陳皮○少氣ハ氣少ク言コトナラズ獨參湯生脈散保元湯異功散類選用ベシ

○逆氣ハ氣上逆シテ息ヅカヒアラク音アルヲ云此ニ痰声ガアレバ喘ナレ共痰声無シテ息ヅカヒアラキモノナリソレナラバ自ト息遠シキ氣味ハアリ短氣ハ息遠シキバカリ逆気ハ息ヅカヒツヨクアラク息ニ音アルナリ

二息遠シキナリ治法ハ蘇子降氣湯杏子湯小青龍湯越婢湯ナド皆肺絡ノ氣逆ヲ治スルナリ

四君子湯 営衛氣虚藏府怯弱心腹脹滿全ク不思食腸鳴泄瀉嘔噦吐逆

右水煎○脾氣虚弱加芍藥倍甘草○脾胃不和倍白朮加姜棗○脾胃虚弱加肉桂當歸黄耆○小水利者去茯苓加黄耆○常服調氣加山茶和氣加生姜○加橘皮名五味異功散姜棗水煎治肺胃虚寒稀痰喘嗽○加橘皮半夏名六君子湯姜棗水煎治脾胃虚有痰者無痰者亦治也夫脾胃虚即氣虚也氣虚即脾胃虚也或此湯少有消導之意也又脾胃補之外以和順爲主故先輩諸病加味之用法最多矣

生脈散 滋生精気培養眞元補心潤肺

麥門冬　人參各三錢　五味子韓十五粒

右水煎

獨蒜湯　治陰虛陽暴絕眩仆上下失血者

人參 薤白二兩或上半須透明者次之

右以水一升煎半升

參附湯　眞陽虛之上氣喘急自汗盜汗短氣頭旋眼花人蔘一兩　附子半兩炮

右細切分作三服加生薑水煎溫服○此湯治眞陽虛之厥冷者世人所知也虛陽浮散裸欲入井及見發候者是眞寒假熱也以

此湯主之

保元湯　治營衛氣血不足

黃耆三錢　人參二錢　甘草一錢

右水煎或入薑

杏子湯　治喘急迫或自汗或不汗或咳嗽煩渴者恐是麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四兩　杏仁五十個　甘草二兩　石膏半斤

右四味水煎

越婢湯

麻黃六兩　石膏半斤　生薑三兩　大棗十枚　甘草二兩

右水煎ス○悪風著加附子一枚風水加朮四両虚者去朮

脚氣

此證乾脚氣濕脚氣ト云アリ乾脚氣ハ脚ノ腫レテ痛ム此證多クハ気滞ニ属ス後世檳榔散ハスナハチ香蘇散加枳殻朮瓜ナリ古方家ニテ大抵椒湯此證ニヨレ又濕脚氣ハ脚ヨリ腫ルヽナリ折ニ脚痛ミダルク或レビレナドスルモノナリ是皆濕邪下焦ニ流ル、賤シキ者ハ地ヲ穿デ濕ニ受テ外ヨリ感ズルモノ多シ貴人ハ酒食水飲ノ濕下ニ流レテ腫ル先ヅ越婢湯ヲ用ベシ尤蒼朮ヲ加ベシ悪風アルモノ或日久シク腫タル処冷ル様ナルモノハ附子ヲ加ヘテ与フベシナリ多クハ脚氣ノ證胸

息ダワシクナル此ヲ脚氣衝心ト云氣急ニナレバ多クハ死ス腫ル時ハ小建柳湯加薏苡仁茯苓用ルナリ氣急甚シキ時ハ十棗九加大黄蚕牛ナド一服ニ七八分用テオリ〳〵干スナリ九病家ヘ此證至テ大切ナルコヲ能喩シテ葉ヲ用ベシ○或傳ニ脚気上テ衝心ノ急證ニ豫メ其衝キ上ス端ニ灸之若急則艾ヲ以テ爵燼シ温湯ヲ以テ送下之コレ急卒ニ備ルノ法ナリ又杉木湯木葉散ノ諸方選用ベシ

小檳榔湯　腫滿氣急衝心下上部腫多者用之就中此湯以疾喘可為目的

生姜一銭　半夏八分　肉桂六分　檳榔四分別末

右水煎

大棘揷湯　小棘揷湯證而氣急甚脈有熱難用前湯者投之此湯無該喘唯心下氣急者主之

　　瓜蔞皮　紫蘇　木瓜各一兩　吳茱萸各一錢　梔揷三錢　生薑二錢

右水煎

腎氣丸　金匱　腳氣腫滿ユレラ推レテ見ルニ腫ヤワラカニシテ勢ナレ小腹ヘカケテ麻痺スル氣味アッテ小腹ニ無力小便不利ニ用ユ熱多キ者ニ難用或煎湯トナレ專用

薤子湯　心下ニ傷コトナク氣上ル腫

尤宜シ　即薤子降氣湯見喘門

木葉散　治腳氣衝心悶亂不識人手足欵冬

　　吳茱萸半兩　木瓜一兩　梔揷二兩

右爲末溫湯送下或生姜五片水煎

杉木湯

杉木節水煮浸搾腳大驗　足踝ニテ洗ベシ上ヲ洗コトヲ忘ル

礬石湯　治腳氣沖心ニ

　　礬石唐二十銖

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸腳良○漿水ノ代ニ醋五升

二水一斗ヲ交ゼテ煮テ爛石二十目ヲ細末シテ入ルベシ○或傳ニ爛石五錢芍藥甘草各五分水煎シテ布ニ浸シテ洗フトリ御氣ニ限ラズ痛風手足ノ痛ヲ洗ヒ蒸スベシ寇メテ効アリ又醋ヲ造ルニ二番醋或四番醋ト云モノ涂物屋ニ用ルナリ右ノ醋四五斗ニ唐明礬一斤入レテ居風呂トシ一廻リ或ニ廻リ程入湯スベシ御氣ニ限ラス一切ノ諸痛骨節痛ヲナス二効アリ濕毒後骨痛ニモ屢効有コヲ試タリ尤面ヲ洗フベカラズ居風呂ノ中ニテ常ノ湯ニテ別ニ面ヲバ洗フテヨシ其内脚氣ノ痛ハ醫ヨリ下ベカリラ洗ベシ

水陳湯　一切腫滿出入加減通用

陳皮　半夏　茯苓　香附　縮砂
葛根　澤瀉　猪苓
薏苡仁各等分

右姜煎○去葛根加吳茱萸揩抹抑木瓜是治御氣腫滿加減也

右近來脚氣ノ說醫皆ト云ニ噴レ發レ尻虛分ノ短氣又ハ病後浮腫或產後血分ノ衰ヨリ足脛痛モノ大防風湯大補湯ナトノ證ニ足痛スバ脚氣ト名ケ揩抹湯ノ類ヲ用テ氣血イヨ〳〵虛損レ大便滑利シテ足脛ナト浮氣出ルコトアリ此レ脾胃ニ及ンテ難治ノ證トナルニ ト多レ足脛痛ミ浮腫アルコト婦人產後調理ヲ失テ成モノタタレ一撫ニ脚氣腫滿ト名クベカラズ男子ノ脾腎虛損ノ浮腫コレ亦多

ン或病後調理アシク浮腫スルモノモアリ此等ハ壮原湯濟生腎氣丸
料ノ加減ナドニテ治スルヿ多シ人ノ知ル処ナリ又虚分ナキモノハ浮腫
ニ滴蹙大蒜ノ煮汁ニテ赤小豆一合ヲ煮テ一日ニ食尽シ其間一日ニ粥一合
ヅヽヨリ外ニ食セズ塩断シテ小便大イニ通シ満腫一廻リカ二廻リノ中ニ
ヌケルナリ原本草赤小豆附方ニ出タリ製シ玉ル塩断セズ食モ多ケレバ効
ナシ畢竟腹ヲ干ス意持ニテ塩ヲ断テ小水ヲ利スル治法ナリ或大坂
林生カ貴藥ニテ麥飯バカリ食シ一切嚴シク毒忌シテ即效アリ此等
ハ脚氣家ノ浮腫ヒアナガチ見ヘヌナリタトヒ水腫ニモセヨ腹満ニモセヨ
脚氣ニモセヨ脾腎虚シ其上心氣三鬱結アリテ出タル浮腫多ク久ハ難治ナリ

今日世上ヲ見當ルニアヽリ相違ナシ嚮ジメ心カリテ養性セバ種滅ノ患ハ
逃ルベキ乎

嘔

嘔諺ニ種々ノ名アリ内經ニ詳ナリ或説ニ今ノ脚氣衝心ト云モノハ嘔論
ニ所謂寒ノ歯干腸上衝胸中ノコトニシテ今ノ脚氣衝心ト云モノニテ胃ノ精気
漏下ノ因ナリ皆質上多漏ノ人ナリ老衰幼弱ニナセヽハ腎虚ノ説ノ如ルコト
決セリ但シ虚ニ二途アリ久虚ノ者ハ労證ノ類ニ屬シ暴虚ノ者ハ頻逆
ニ屬ス便ナ脚氣ナリ何ヲ以コレヲ云ヘバ久虚ノ者ハ治スル法徐ニ緩シ邪
ナケレバナリ暴虚ノ者ハ死生ヒニ急速ニシテ邪アルナリ何ヲ邪ト云ヤ

是腎水心火ヲ尅スルモノニシテ其實ハ腎氣奔上心ヲ衝ノモノナリ本邦百有餘年曾平豐饑饉罹其内狂茶腐其外逸者放肆無固筋骸之事也加之以瘟疫之氣乘間之令然者也乎是酒漉腎憊後厥逆究令脚氣衝心者皆是厥證也厥為病暴卒竭尽之謂而於人身之患尤急忘矣云云是東武松村庵カ脚氣論說ナリ

○儲大抵寒厥カ熱厥カト云ヲ分別スベシ寒厥陽厥ハ足ノ指ノ裏ヨリ發熱厥陽厥ハ足ノ指ノ表ヨリ發ル何トモ卒倒不省人事ノモノニテ惡病ナリ輕キモノハ甦生重キモノハ死スルナリスレバ卒中風ニ類スルモノナリサレド氣厥モアリ食厥ノ類モ急ニ暴厥スルモノハ厥證ナリ中風門ト考合スベシ

平生澤山ニアル病ヂハナイ此ニアラク治例ヲ擧ルナリ精シキコトハ諸方書ヲ考ベシ

○厥證足ノ指ノ裏ヨリ發リ冷ル者ハ陰厥ナリ四逆湯主之

○夏月勞役ニヨリ陽虛煩擾シテ目皆耳閉コレヲ内經ニ煎厥ト云四君子湯加遠志防風芍藥麥門陳皮

○勞役ニ因テ飲水多クシテ驚ニ遇テ發厥者六君子湯加薑連黃芩竹瀝薑汁

○怒氣逆甚ノ嘔血鼻衄發厥者四物湯去地黃加柴胡人參桔梗陳皮麥門椒椒

○熱厥ハ諸厥氣湯ヲ用ベシ是熱極テ寒ニ似タリ眞熱假寒ノ證ナリ

外邪ヲ兼ル者ハ防風通聖散ヲ用ベシ

痞滿

痞滿ニ三ツアリ傷寒ノ痞滿ハ無形ノ心下痞スルナリ雜病ノ痞滿ハ有形ニ心下痞スルナリ此事難知ニ出ス有形ト云ヘハ積聚ノヤウナレ共食アリ疼アリ気アリ是俗ニ云ツカヘト云モノナリ方書ニ諸方ハ大抵雜病ノ痞ヲ云歟中養胃湯ノ一方雜病ノ痞滿ト合点セシニ痞滿門ニ從テ考レバ傷寒ノ痞滿ト雜病ノ痞滿ト混メアルソレク明白ニ辨別スルハ此事難知ナリ

○傷寒痞滿ハ食鬱疼濕熱心下ニアツテリニナス大抵心下痞滿不食或大便泻スルモアリ半夏瀉心湯ヲ用ベシ又心下痞滿シテ上氣シ便秘スルモノニ甘遂湯ニテイスベシ是古方ノ治方ナリ後世ニテハ二陳湯加黄連枳實ニ心下痞滿ヲ治ス或香砂養胃湯ナドヲ用ユ半夏カ心下ノ痞ヲ泻スルナリ枳實ハ心下ノ硬キヲ推シ開ク黄連ハ寒ニシテ心下ノ痞ヲ開ク枳實心下ノ食積疼積アルニヒクナリ

養胃湯　治胸膜痞滿九痞者心下痞滿而不能食也傷寒論曰滿而不痛爲痞滿而痛爲結

香附　縮砂　木香　枳實　厚朴　白豆蔻

藿香各七分　白朮　茯苓
右姜棗水煎〇癉人心下痞滿加黃連去半夏〇血虛中滿加當
歸芍藥去半夏〇食積中滿加神麯山楂麥芽去白朮半夏〇肥
人心下痞悶加蒼朮〇氣虛中滿加人參去半夏〇痰膈中滿加
以薑仁昆布桔梗竹瀝薑汁少許去白朮半夏〇脾泄中滿加蒼
朮芍藥姑去半夏〇此方痞滿養胃湯ト称シテ上代ヨリ本邦
老醫ノ用ヒ来ルコト尚シ

半夏瀉心湯

半夏大半升　乾薑　黃芩各一分　黃連一分　甘草二分

人參一分　若虛弱者用韓參唐參
右以水三盞煎一盞半去滓再煎二盞〇加生姜四分名生姜瀉心
湯〇半夏瀉心湯再加甘草一分人參半分名甘草瀉心湯甘草瀉心
湯ハ緩キカタナリ韓參唐參ヲ用ル時ハ緩キカタナレモ直
根ニテハ同シコトナリ韓參唐參ノ比ニテ三瀉心湯ハヤハリ傷寒ノ藥
トキハ人參甘草ノ指引ニヨッテ用ル半夏瀉心湯ハヤハリ吉野人
其外嘔噦痞氣腹痛ナド二用ル參ヲ用ヒベシ　諸此方ハ中氣不健シテ邪熱心下ニアッテリ痞滯スルモノニ用ルナリ故ニ此方ハ熱ヲ瀉シ痞ヲ散ズル此方ノ目當ハ心下痞ス
ルト云ヲ的トスベシ心下痞シテ腹鳴リ或嘔シ或下利スルモノハ正面
ノ場ナリサナクテモ心下ノ前後ニテ腹痛シ或サシコミ熱少シ有モ

ノニ用テ先ツ上ヲヒラカス又不食スルモノハ多ク心下ニ痞スルニヘタリ此湯ヲ用ベシ是モ脉弱ノ腹ヤワラカニテ不食スルモノニハ不用ナリ大抵ノ腹痛積聚脉ニ少シ數アルモノニ用テヨシ痢疾裏急後重去テ後調理ニモ用ルナリ嘔多キモノハ生姜瀉心湯ヲ用ベシ此方後世ノ順氣和中湯ヲ用ル場ヘ即効アリ

三黄湯　方見血證

此方三味等分ニ或大黄ヲ倍シテ水三盞ヲ以テ一盞ニ煎スル是金匱ノ瀉心湯ナリ然レ共今世專ヲ用ルハ麻沸湯ニテサワ〳〵ト煎ジ用ルナリヤハリ擺茶同前ナリ病人用ルニ気味輕ク呑ヤスシ又

大黄ヲユルく〳〵ト煎スレバ其効モ連ナラサレバナリ又黄芩ヲ倍ニ或一戔黄連五分ヲ麻沸湯ニテ煎ス即チ傷寒論大黄黄連瀉心湯ナリ傷寒誤下ノ為ニ痞スルモノニ用ルナリ三黄湯ト云トキハ三味等分麻沸湯ニテ煎スルナリ元來此方伊尹三黄湯倉公火齊湯ヨリ出タル方ナリ然レ共其書ナケレバ確如斯ノ言傳ヘナリ岡白駒子ノ史記纂二三黄沸ノコトアリ何サマ古方中ノ古方ナルモノニシテ故ニ即効五ツ人ノ能知レル處ナリ古來ヨリ降火第一ノ方ナリ故ニ千金外臺ノ紫雪ノ條下ニモ紫雪ノ効ヲイハントテ三黄湯十劑ニ勝ルトイヘリ偖此藥ノ主治和劑局方三黄圓ノ主治ニテ考合セ用ベシ上中下ノ

三焦ノ積塾ヲ下スト云ガ目當ナリ三味等分ニノ蜜丸ナリ湯ニ比スレバ其効和緩ナリ今ハ大方糊ニテ丸シ大黄モ倍シテ局方ノ圓ヨリモ其効速ナリ然レモ局方蜜丸ハ梧桐子大サ三十圓トアリ今ノ糊丸大黄ヲ倍スト雖ドモ一度ニ三分五分ホドヅヽ用ルユヘ大抵功用同シカルベシ或近來散葉トシ黄鍾ト名ケ古方家專ラ用ル其効甚タ速ナリ然レモ大黄性アレケレバ瀉下ノ功ナレ

○和劑局方主治云三焦積塾上焦有塾攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁不欲飲食下焦有塾小便赤渋大便秘結五臓俱熱即生諸癆瘧及治五般痔疾薫蒸瞤腫痛或

千鮮血ニコノ局方ノ主治甚精シ此意ヲ以テ積塾ヲ下スト云カ此某ノ目當ナリ辛塾厚味ヲ過食シ足脛痛モノ此湯此丸ヲ用テ効アリ濕毒家ニモ兼用ユルコトアリ審察シテ用ベシ

積聚

積聚ノ治法寒積塾積血積ヲ能辨別シテ療治スベシ偖病人ノ虚實ヲ見合スルカ肝要ナリ虚人ノ積ハ攻撃ナリガタシ實人ノ積トイヘ共根治ハナリ難シ或積サシ發テハ苦シミヲ受ケ又ハ藥食トモニ受入ヌモノナリサレバ時アツテソロ〳〵食ヲ受レバムサト死スルモノデナシ此證灸治ヲ專ニスベシ痞滿積聚ノ二病治法灸炳ヲ以テ主トスベシ後藤子ノ點法ナド別シテ大功

アリ○此モ心下ヘサレコムニハ半夏瀉心湯ヨシ痛甚シク嘔アルモノニハ三黄瀉心湯ヲ用ベシ又左ヘサレコムハ肝積ナリ小柴胡湯加青皮芍茉ナリ嘔輕シテ積モ甚シクナリ左ニ動悸アルモノ柴桂湯ヨシ右ノ方ヘサレコムハ治シガタキモノナリ是ハ多ク食積ナリ枳實厚朴入ル藥ヲ用ベシ大便秘スルモノハ厚朴七物湯或瀉脾湯ヲ用ベシ又腹脹リ或左右ニ積アリテ全体腹ノ弱キモノニハ寛中湯ヨシ建中湯加枳實厚朴モノナリ又臍上積動シ氣強ククワツ〳〵ト氣ノボルモノニハ瀉脾湯加龍骨牡蛎尤ヨシ又積ニテ腹痛甚シク臍ノ上左右ノアタリ形アリテムク〳〵モチアガル如クニ嚴シク痛モノコレ大建中湯ノ證ナリ又臍下ニテ痛ミ男子ハ疝氣女子ハ癥血ノモノタタレ疝氣ニハ建中湯加呉茱萸又熱アラバ小柴胡湯加呉茱萸川鳥頭山梔用ベシ疝ハ臍ヨリ腰ヘカケテ痛モノナリ或陰嚢ヘサレコムモアリ婦人ノ癥血ニテ小腹痛ヘ拄挾袴湯加大黄用ベシ甚シキモノハ抵當丸ヲ用ベシ物ニアテ積ノ調理ニハ建中湯ヲ用テ氣血ヲ和スベシ建中湯ノ證ハ腹筋ハリ痛ムナリ建中湯ハ急迫ノ氣ヲ緩ムルナリ此意ヲ以テ考ヘ用ベシ全体腹ガサ〳〵シテ無力ソノ内ニコヽカレコヽニ凝アルモノハ建中湯ニテ和スレバヨシ以上古方家ノ治法ナリ又後世ニテノ積ノ治法ハ青皮肝積留滯ノ氣ヲ推シ破ル莪朮ハ血積ヲ破ルコト強ク血中

ノ氣積ヲ破ルナリ 今、茶肆通用三稜倣物也格別非ニ攻撃茶 不換金加青皮抜實諸積ニ用ルナリ痛ニハ加木香又左ヘサレコニ有熱ニハ君子湯加柴胡青皮芍薬後調理ニハ逍遥散加青皮香附用ルナリ又積甚痛煩悶スルモノニハ熱ナケレバ大七氣湯ヲ用ユ塾甚シキモノハ柴平湯ヲ用ユ此皆古來ヨリアリ觸ル治方ナリ古方後世ノ治法トモニ人ノ虚實病ノ淺深ヲ考テ用ベシ其内人壯邪實者ハ古方ヲ用ベシ病モサホドニ劇シクモナイ人モアニリ丈夫ニモナクバ先ツ古來ヨリアリフレタル治法ヲ用ヒソレニテヨクバ重疊ノコト行キ過ル治方ハ必スベカラズ病人ヲナブリモノニスルト云モノナリ夫トモ古方手ニ入リ虚實ノ決断タンカニサヘアラバ茶ノ

キ、メハ雖方ユヘ古方ニアリテ汗下ノ劑ハ其効速ナリ然レ共婦人小兒ソノ外茶嫌ヒノモノハ多クハ呑カヌルモノナリ作略アルベキコトナリ一擔ニ後世方ヲ古方家カラ奴隷ノゴトクイヘモ宋明ノ医モ皆ガ皆近下手バカリモアルニ非昔時日本ノ老醫宋明ノ書ヲ專ラ用ヲ妙手多クシテ概古規矩ニ違ノ發ル時刻ニヨリテ大柴胡桃仁承氣大承氣ヲ用ル差別アリ此治方ハ却テ金瘡ノ瘡門ニナレ宋明ノ後世ノ医ノ使ヒ覚ト見エルナリ又土茯苓蚺蟺蛇生漆等ノ茶金瘡モ組合タル方モ見ヘ子共古方家使ヒ覚ナリ兎角後世ノ方書ニテモ儒門事親ナドハ取リ用テ聊補虚ノ事ヲ云ヘル方書ハ取ラズ此題言モ述ル如ク長沙氏ノ

古方ヲ用ルト云ヘドモ專ラ寒茶瀉葉ノミヲ主トスル流ニテ昔時丹
水翁ノ温葉補葉ノミヲ主トスル流ト背腹ニシテ両流合セバ偏見ノ弊
ナカルベキ乎

三黄瀉心湯 見血

小柴胡湯 見傷寒

柴桂湯 見傷寒

厚朴七物湯 金匱云痛腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故此湯主之

厚朴 半斤 甘草 大黄 各三両 枳實 五枚 桂枝 二両 生姜 五両

右水煎〇此古ハ表證ヲ帶テ腹滿硬痛者ニ用ルガ先ツ主方ト見

ヘタリ或食傷ニモ外邪ヲ兼タルニ用テヨシ此皆腹滿ヲ目當トシテ用
ルナリ古方家藿香正氣散ノ場ニ用テ外邪ニ食滯ヲ兼タルモノニ
用ルナリ然レドモ藿香正氣散ノ證ハ格別腹滿硬痛スル證ニモアラズ
垂細盛胃門ニ云如シ右ノ輕證ニ厚朴七物湯ハ病ヨリ藥ガキヤ
ウサンニコソアレ金匱要畧ニ藿香正氣散ノ代ニナリヲウナル古方ハ
ナシ無理ニ厚朴七物湯ヲ擬フヤウニナリレモノナリ是ニ於テ古方
バカリニテモ不自由ナリ能々了簡アツテ考ベキコトナリ

鴻腎湯 積通用或腎上積動悸強上逆古中入參直根參錢

茯苓 厚朴 各七分半 半夏 桂枝 生姜 各九分 黄芩 甘草 各五分 人參 三分

右八味以水三合煎一合半常用加龍骨牡蛎各七分
○千金翼方ノ方ナリ古方家専用テ積氣動悸ヲ治ス
五重 或加石膏
寛中湯 腹脹或積在左右全躰腹弱者主之
即建中湯去飴加枳實厚朴 兼症者加曲香呉茱
大建中湯 心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有
頭足上下痛而不可觸近此湯主之
蜀椒二合去汗 乾薑四両 人参二両 直根或雜參ノ書參
碎參臨證以意可擬之
右三味以水四升煮取二升去滓内膠飴一升微火煎取一升半
令温再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食盡温覆之

桂枝 茯苓 牡丹 桃人 芍藥各等分
右水煎○或加大黄臨時○五味細末蜜丸常用湯劑亦佳○婦
人産後一切瘀血結證用之○古方家産後二世間龍王湯擬
某ノ用ル場ヘ加大黄用ルナリ或肉桂延胡索ナド云場ニ用ル也
抵當丸
大黄三錢 桃仁五錢 蜚蠐 水蛭各六分
右四味各別杵篩合和煉蜜丸為四丸以酒合煮一丸取八夕日二服
茯苓桂枝甘草大棗湯 治發汗後臍下悸者欲作賁豚

茯苓八分　甘草炙二分　大棗四分　桂枝四分

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升内諸藥煮取三升去滓温服一升日三服　甘爛水法　見金匱

モノ尋常ノ菜ニテ効ナク労ノ如ク萎薾トメ形容衰ヘ食タトキ八腹脹リ或手足拘攣シテ立ツコトアタハズ一両年モシモツレタルモノニ此甘味ノ煎湯ニテ大効アリ甘草急迫ヲ治スルユヘナリ建中湯ニテ無効ニ此湯ニテ即効アルコト多シ菜汁甘ク呑カヌルモノハ醤ノ類ニテモ先嘗テ菜ヲ用ベシ一両日モ呑ナレハトキハ後ハ何ノ障リモナク能呑ムモノナリ予此湯一病人ニ年余ニナリシ積労ヲ治タリ

蔕平湯　積塊羸瘵者宜清化也此方主之

紫胡　黄芩　半夏　厚朴　陳皮

青皮　枳殻　神麹　山楂　薤白　甘草各半

右姜棗水煎〇或加檳三枝自可採之菜肆通用者偽物也

大七気湯　治五積六聚状如癥瘕瘕随気上下発作有時心腹疼痛上気塞小腹脹満大小便不利者

三棱　莪朮　青皮　香附　益智　陳皮　枯梗　薑香

右水煎〇加大黄捵柳治諸般疼積面黄肌瘦四肢無力皆緣肉

有虫積也○戴元禮治五積加減之法在衆方規矩大成卷二
○嚴用和文潞生方ノ大七氣湯ニ戴元禮ガ五藏ノ加減アリ證治要訣ニ詳ナリ此五ノ氣ノコトニツキ予ガ先人内經一見識ノ發端ノ辨ヲ擧ルナリ近來内經ハ僞書トノ一向不信用ナリ夫素問ノ名ハ仲景傷寒論自序ニ素問九卷ト八十一難トニ云ニ始ル定テ其前ヨリアル名ナルベケレドモイヅレガ始トニ云コトハ知レヌ靈樞ノ鍼經トモ云古書ニ黄帝鍼經トゾンガスナハチ靈樞ノコト正シノ靈樞ノ名ハ唐王氷ガ次註ノ序ニ濮呉普ヲ引テ素問九卷ト此二書ヲ合セテ内經ト云ハ蓋文志ニ書ニ音内經十八卷ト有ルヲ指ガ素靈ヲ内經ト

称スルハ過ハカノタヤナリト叱レトモコレモイニフメ穿鑿セリ（五名ノ口十カラソウ云ニイモノデナシ内經ノ内經タル所ハサヤウノ無益ナ名仕ヲヤリデハナシ先ツ結思テ見ヨ人ガ生レナガラ知ルモノデナイ耳目鼻口頭面手足ナドハオノレトシリモせウヅカ腰中ニアルモノハドレガ藏ヤラ府ヤラ堅人ノ教ヲテハ知レヌナリ（ハラノ事ハラワタトバカリ意得テイレバ魚鳥ノハラワタヲ見ルモ同前ナリコレヲハタカラ内經ノ教カ無テモソレホドハ知レソウナモノトイヘドモ中々ソウデナイヤスイコト素問五藏別論ニ方士ガ説ニ頭腦骨髓腸胃ヲ藏ト云トアルヲ黄帝モ不審シ王ト岐伯ニタヅ子玉ヒシニ岐伯ノイヤ〳〵ソウデナヒト精ノ解ノ再ビ異論ノ

ナキヤウニ云テアル其時サヘサヤウノ異説アレバ後ニハドノヤウニヘ聖人カ岐伯ノ輩ト論ノ五藏六腑ハ云ニ及ハス四肢百骸脉絡經穴毛髮ノ末ニテ詳ニ説テハレヌ素靈ノ中ニ歷々トメアルワレガ病ムトキカヤウニアルソレヲカヤウニ療治セヨト萬世ノ為ニ云テアル此ヲ思ヒカヘシ思ヒヤリテニレバソコデコノ内經ノ辱イコトモ重寶ナコトモ實ニ身ニ覺ヘラルヽ闇ノ夜ニ日月ノ恩ヲ知リ親死ノ日此ノ如在ガ殘念ナヤウナモノ無益ノ名ゼサリハイラヌコトナリサレヒ此書カ回春ナトラ見ルヤウニ口近ニナイモノユヘ遠イコノヤウニノケテオクハ庸醫ノナラヒ又アヽリ深ノ思ヒ過シ此書デ直ニヒガ取ラルヽヤウニ思フヘハ此各ノ惣体ニクライト云モノ

世間デ内經ノ註ハ次註ノ註證發微ノ呉註ノ類經ニテノヤウニ思フガカノウデナイ越人仲景孫眞人許叔微ナドノ遺サレタ書ヲ皆内經ノ註ナリ素元明清ニ至リテモ理ニ叶フ病論効アル薬方ハ皆内經ノ註ト今ニスレバスグニ内經デヒガトラルヽト云モノナリ猪今時通用内經ノ註ハ次註注證發微呉註類註ナリ其外唐宋和本トモ三種ヤアレヒモ此世家ノ註ノコトデスカラ穿鑿ハツキテイル猪ソレデスムカトイヘバスキトスニヌ詳ノ仕ヤウガアライカト云ハヾ隨分詳ナリソレニナゼスニヌトイヘバ内經惣躰ニクライカラナリ其ノライト云ハ内經ハ黄帝岐伯ニ起ル其書ガ直ニ黄岐ノ書デハナイ撰

ハイハリト云モノナリ偖徐春甫ガ曾テ傳ハルト云ヘルハ何ノ傳ヘカラン偖又今日デモ國語戦國策史記ヤラノ見タモノハヤ合点スルコトナリ徐春甫ガ古今醫統ニ云ハ黄帝岐伯ノ旨ニ違ヘイト此說ハヨホドヨイ光アル說ナリシテ是非トモ黄岐ノ書上云ヘル證ヲ引出シ

ヘルハ何ノ書カアラウヤウガナイ伏羲神農黄帝堯舜ノ間ハ年數ガイカフヘダシル堯舜ハ黄帝ヨリイカウ近キコトナレ尚書經ノ堯典舜典ノ記録ヲ見ヨニ典ヲ細字ニ書クトキハ紙二三枚ニナスムソレヨリ遡ニ以前ノ書ガカヤウニ詳ニ數十万言ノコラウマウガナイ種子又陸象山ナドノ說ニ戰國ノ文章ニテ戰國ノ書トイヘリアノ程ノ見タモノハヤ合点スルコトナリ徐春甫ガ古今醫統ニ云ハ黄帝岐伯ノ旨ニ違ヘイト此說ハヨホドヨイ光アル說ナリシテ是非トモ黄岐ノ書上云

ヘルヲ引出シ偖又ソレホドニナイコトモ術文錯簡モアルハズ然レバ皆ガ皆ニデハスマヌハズノレヲ皆スマサウトカ、ル類經ノ

二文々句々如金玉ト云モノカウ云訣カラ註家ノ説
テ反テ内經ハスベテコナルナリ讀メヌ手紙ヲ無理ニ讀デスルヤ
ト同ジコトスベコハ闕疑シテオイタガヨイヌシハスメモスンデカラ
合点ノイカヌ者ガアルコレモ闕疑スベシ闕疑ノ二字ハ論語ニ出テ
書ヲ見ルニツノ意得ナリ此書ノ所詮ハ前ニ云ヤウニ平人ト病人トノ
ニツヲ云平人ハ生レツキ自然ノ先天ノ沙汰カラ後天ノ沙汰ニデ詳ニ
云テアルソレガ病ムトキハ外六淫ノ邪ニ感シ内七情ノ傷ニヨル訣ヲ内
外詳ニ説テアルコレヲ病人ト云此ニツヲ説テアル二理ニ於テ當然ゲニ
モノアルコトヒアリ又理屈ハアリナガラ實ノタメサヌコモアルソレ後

世ノ輩合附會ノ説ト云ル理屈ハキコヘテモクメサスル（蔓カ）ル
モノタトヘバ夏涼キ家ハ冬ク（暖カ）ハナケレモ間
ニハ夏涼（スゞシ）ク冬モ寒（サム）キ家ガアルモノ上戸トキクトルニワスサキカラ
餅ハキラヒト合点スレド間ニハニツナガラ好物（コウブツ）ガアリ此容ヲ見ルニ
ハ理モ實モ具（ソナ）タコトアリナガラ理ハアリナガラ實ノナイモアリ是ヲ
見分ルガ肝要ナリ又問答ノ發端ハオヒタヽレキコトニテ医術全体ヘ
カヽルヤウナレモ其下ノ問答ヲ見レバソレホドナコトデハナシ是理モ
實モアリナガラ古代ノ書ハトレモ此ヤウナモノナリハヾメヨリ此
書ヲ作ラントテ云合点ハナイ一座ノ間答ヲ記錄（シルス）シタモノユヘ首尾（シュビ）ノ

ソロハヌコトカアル一篇ノ名モ後世ノ人ガ付タモノ其並ビヤウノ次第モ全元起ガ太素ノ本ト王氷ガ次註トハ違フ是モ王氷ガ了簡デヨイヤウニ移レカハタモノ深キレサイハナレ偖此書デ療治ノタメニナツテハ鍼ノ療治ガ專ニ云テアル是ヨリ先キズンド上代ハ移精變氣ノ術ト云テマジナヒノヤウナコトデ病ガナオル此書ノ時分ハ鍼療治ガ專ナリ此合点ノレニ云モノハ内經ハ療治ニハ遠キ書ノヤウニ云ヘドモソウデナイ鍼ノ療治ハ隨分手近ニ云テアル其ノ病ハ某ノ穴ヲ刺セトヂカニ云テアル是ヨリ手近ナ云ヒヤウハナレ仲景ノ時ハカカラ某方ノ療治ガ專ラナリ内經ノ時分ニ某方ノ療治ガ專ラ行ルヽナラバ藥ホカモ手近ニ云テアルハズナリ鍼ハル二鍼ノ療治專ラ行ルヽト云ヘドモ此時ノ刺法ハ今ハ絕テナシ張子和ガ久瘧ノ病人ニ十本ノ指ノサキカラ血ヲトリテ愈シタトアルハ珍シキコトノヤウニ云テアル内經ノ時分ハオシナメ此ヤウナ療治ヲシタト見ユルサレド内經ノ時分カジヤトテモ某方ノ療治モ其外イロ〳〵ナ療治ガアル後世デモ某方ノ療治カリデモナレ間タニハ鍼灸ノ療治モセ子バナラヌナリ是レ内經全篇（アノカル大意ヲ述ルナリ此合点ナレニ内經ヲ見レバサニアラズ治ヲ少タメニナラヌ書ノヤウニ思ヒ僞書ナリトメ一向ニ捨ルヤウニモ近來ハナリ

ダリ然レ𪜈今日五藏ノ名目ハ何レノ書カラ云ヒダシタルコトナルゾヤ仲景ノ金匱要畧ノ開巻ニモ藏府経絡先後第一ト心肝脾肺腎ノ名目ハ仲景モ内経ヨリ五藏ノ名ハ出シ玉ヘルニアラズヤ又近来周禮ヲ據トノ九藏ノ說アリ此五藏ニ膽胃大腸膀胱ノ府ヲ合ノ九藏トシ小腸ノ府ハナシトイヘリ古来ヨリ大腸小腸ノ府ハ各ノ上口ト下口ノ如クニノ其間ニ白ノ心木ノ如キ處ニ關門ト云テ水穀ヲ泌別スルト云ヘリ金匱要畧五藏風寒積聚痛ノ條ニ大腸有寒者多鶩溏有熱者便膿垢小腸有寒者其人下重便血有熱者心痔ト云ヘリ今小腸ナレトモ仲景ノ言モ妄ナラン乎此ニ一伏水ノ外科伊良子見道齋ガ官府ニ乞テ自盡罪ノ者ノ腹ヲ割キクハレノ見テ大腸小腸一府ニシテ上下ニカサナリ其間ニ關門アルコトヲ自ラ解ヲ見タリ近来内經ノ說ヲヤブラントシテ医書ニテモナキヲ〳〵周禮ニ九藏ノ說アルヲ以テ内經ヲ破ラントスレトモ古方家ノタツトブ仲景ノ書ニ腸アリ但シ云ガヽリニナリテハ仲景トモ云ガヽリテ見ルベシ胡乱ニ素靈ヲ偽書トスルモノハ自ラコトオモヒヤリテ見解ノ不足ナリ戴元禮ガ五藏ノ五積ノ加減ニツイテ素靈ノ用捨ヲ次手ニ記スモノナリ

○本邦老醫ノ傳ニ乱世ニハ肝膽ノ氣鬱スルコトスクナシ治世ニ

皆肝膽ノ氣尚スルナリ故ニ燃胆ヲ用テ開其尚肝膽ノ氣ヲ達セレムルナリ治世ニ積氣ノ病多キハ肝胆ノ氣鬱スルニヨッテナリ

○又傳ニ背肉ニ行通リノ穴所ヲオスニ上ヨリ下ニ通リテ任脉ノ如キ脉道連リアリソレヲ外ニスルヤフニメ陷沒ノ所ヲ求テ点スベシ或ハ其人ニヨリ其上ニ点スルコモアリ又其外ニ点スルコモアリ是始ニ灸メ其アタリ凝血デキテヨリアレバヤハリ其所ヲヨケテ点ス畢竟腹内ニ徹セシコトヲ願ヘバナリ其所ノ陷沒ト云モコレ少シニテモヒクケレバ腹ヘ徹スルヲヨケレバナリ

○又傳ニ狂ノ下地ニテ妄ニ恐悝シ人ヲ見ルコトノ愧ヂ室ニ引籠リ半年モ後ヤウヤク其氣味止ミテ手足拘攣シモコハバリ言語難澁ス其心下板ノ如ク積氣ノ勢甚シクスナハチ北月ニ灸セシメ能胆ヲ用ヒ是ニヨリ其證大半緩クナリタリ惣体半途ニ至テノ拘攣ノ證ヲアラハシテハモハヤ狂トハナラズ其治モ易シ唯狂トナル外ニ何ノ苦ミモナリ偏ニ積氣内ヲ攻テ心コレガ為ニ其職ヲ失フユヘニ治シガタシ半バ已外ヘ出タルモノハモハヤ狂トナルコト少シ

○中氣ノキザシアル病人ニハ速ニ灸セシムベシ是腹氣不和ナルコト甚シッコト食傷ナドスルト甚ヂ中氣ヲ發ス故ニ灸ニテ其不和ヲ和セシムルヤウニスベシ然

ルニ下部不足陰虚ヲ兼テ中氣ノキザシアルモノ灸シテ倘ク眞陰ヲ耗シ
中氣トナルコアリ意得ベシ是ニハ灸治斟酌スベシ何レ既ニ發メハ陶器
ニヒビレ入タル如シ本ニ復スルコト難シ豫防グベシ
○積氣ノ患アリテ后時疫ニ感ノ欵甚ク譫語ナドアッテ其氣ヨホ
ドツカレタルトキニ邪モ大方ニ解ストイヘドアト連綿タリ是レ積氣心下衝
テ大便秘スル㕝六七日固テ眼薬ヲ止メ飲食ヲナサヽル后大便通シ日ヲ遂テ
快復ス此病人第一大便秘スルト云カ大事ナリ 秘ル者ハアセリ元氣ノツカレ
ナキモノナリ
○痞ハ塞ナリ鬱塞ノ意ヒッカヘリトイヘドモ形不成ノ氣ノ聚ヲ云是ガソロ〳〵聚テ

積トナル痞ハ積ノ下地ナリ痞ハ天地否ノ意ナリ鬱滯壅塞得凝結
ノ七字痞ノ義尽ク苦辛ノ葉ヲ用テ可ナリ
○積聚古人ノ分チアリトイヘドモ分チナキモ可ナリ臓腑ノ間ニ垢ガタマルモ
ノナリソロ〳〵ト氣聚リ凝結スルナリ裏面ノ内分ヘカルナリ
○積陰偏メクラサレバナラス故灸火ノ陽氣ヲ借テスレバ消化スルナリ難
經五積ノ事形是レ不限仲景ノ奔豚ト云ハ下カラ直ニ升ルモノヲ通メ云
婦人血塊ハ經閉ナリ是レ苦歸湯ニ紅花桂或氣劑ニ紅花苦歸ヲカテ
用ニ可ナリ甘草朮ノ類不可用又燥衆ト積氣ト見誤ルコアリコレハ
クルくトシテ手ニテ按テ大抵レルヽモノナリ下焦ニアルノミニアラズ上

中焦ヘモ升ルナリ

○痰ハ津液ノ化スル処ナリ惣メ痰ト云ハ津液ノ化スルナリ津液凝結メ皮膚ノ間ニアレバ腫物ヲナス所謂氣腫ナドノ如シヅチ咽喉ノ間ニ壅閉シテ流行スルモノ皆積氣カラ塞ギ元気ノ流行不順ナレバナリ中ニ結トゞコオルトキハ痰カ積氣カニナルスベテ流行アレキカラナリ九臓腑ニハ毛ノ孔ノ如キモノアリテ津液ヲハコブ舌ノ孔ヲ以テ知ベシ

○膈證鼓脹ト其因同シコトナリ初ハ同シヤウナルモノナリ先初膈下ニ浮腫アリテアレバ漸々ニ張出スト鼓脹ニナリ次第ニ背ヘツクト膈ニナル

ナリ灸三四ヨリ十二三デノ脊際ニ數万ノ灸スルガ宜キナリサテ碍時ハアラキノ類用ル宜ナリアラキハ燒酎ノ類ナリ

○鼓脹ノ脹ツヨキハ腹ニ青筋テキルモノナリ是ハ水氣ニテ推出スナリ先ハ腹バカリトイヘ手足ヘモ少々浮腫アルモノナリ

○労氣ヲ患ヒ腹中瀉シ易ク食モ中秘ニツホドナラデハ食ス是積氣脾胃ヲ妨ケスボムナリ此證ニ瀉多キハ孤氣下リニ同シ是ニ赤蛙ヲ用テ治ス然ハ赤蛙ハ小兒ノ三治スルニアヅタルヲ用テヨシ

○凡餌食ノ鳥類ハ雉鶴ヨシ野雉ハ其性人ニ宜シカラズ水鳥ハ鴨鵞鳥ノ

類常人食ノ害ナシ病人食ヘハ大便ヲユルクス是其鳥皆便ユルシ其餘推シ
○虚労ノ證腹ヲ按スルニ心下ヨリ臍ニテニ任脉ノ手ニ當ルハ皆底ニ気ガ
聚テ脉ヲハルナリサナキハ沉テアルナリ若人ナトノ脱肉シテ死ニ近ク
心下陰部ニテ任脉上ヘハリ出ルモノアリ是死ニ近キ證ナリ又按腹シ
テ心下任脉ノ左右引ハツタルハヨキナリ弱キ腹ハ此ヒツハリナキナリ
○虚冷ノ人唇ノ血色耳輪乾キカレケタルハ救ヒ難シ此両虚見シヌハ救ヘ
者多シ又虚浮ノ者脱肉甚ザルヤウニミユルニ心ヲ付テ見ルベシ世間ノ人コレヲ
以テ脱肉ト思ハヌナリ先ミル所ハ背部ナリ病人 欬スルカ或ハ喘シナドソ
氣逆スル度ニ背陷出ヲ氣動ク因テ脱肉ノ所ニユルナリ虚浮ハ只気ヘ

ノミハツテヲルモノニテ元氣ヨク含斂モノニアラス
○労證ノ脉細數ナルモノ和平ニナルニ必死ニ近キナリ 欬シモ脉和ノ甚ク
死スト云ニハアラズ二三五七日ノ間ニ死スルナリ
○虚冷ノ人大便泻利セスヨキホドニテ一日ニ度通スト云モ安心ナラヌ
モノナリサアル者ハ后ニハベタ〳〵ト泻スルモノナリ只秘結ノ三日ニ度ニ
日ニ度便スル方ヨシ
○音声ヲ專ニスル人吐血スルモノ多シ常ニ吐血脉スムモノナリ今却テ脉
不進或ハ一ムモアリ眞吐血ニ不進モアリ九虫邪愈ヘ難ク愈テモ又ヨ
ク發スルアリ是風劑ヲ多服スベカラズ只温散ノ薬ヨシ温散ハ気ヲ

順ズル故ニ久用ルモ可ナリ

○痔下血ノ者諸失血ノ後未復ノ風寒ノ邪ニ中ル者多ク労ト ナル邪ニアタラサレバコチケテ身中ノグワイアレクナルユヘニ労火動トナルナリ

○瘡毒ニ脉進ムト遅鈍ナルトアリ兎角瘡毒ハ脉スミテモ欵アリテモ思ノ外肉脱セヨモノナリサテ大便秘小便淋渋スルナリ労證ニハ小便ノコルコトアレモ淋渋スルコトナキナリ瘡毒ノ大便泻スレバ未ニアルコトニレテ是ハムツカシキナリ又瘡毒ノ眼ニ入ルモノ其始頭痛ヨリ生ザルハナシ

○痢疾ニ鯽鰌ヲ用ルコト通ノ用ガタシ凡テ生ナル物ハ悪シ煮焼ノ物ハ内ニテコナレヤスシ奈良漬ノ香ノ物ヲモ不用ヨシ痢ノミニ不限諸病皆同シ凡鯽魚ヲ可用痢ハ疎緩スベキ證ナリ補劑ヲ用ル痢ニハ赴ホズベシ

○本邦名医甲斐徳本子梅花無盡藏云

△賓丹

白豆蔻 一分　辰砂 一分　乳香 一匁
薝蔔香 青葉二匁　水銀 一匁半　黒鉛 一匁
金蝎 二匁　華澄茄 一匁二分　眞珠 二分
麻仁 二分　烏蛇 一匁　當帰 一匁
人参 一匁半　肉桂 一匁　川烏頭 二分
以上二十二味以生蜜煉

△玉丹　瀉下ノ丸薬ナリ諸腫ニ用

沈香 一匁

巴豆燒一丸　代赭石燒一丸　胡椒三分　丁子半一丸　人參二分　大黄二分
白朮二丸　辰砂二分　拮梗三分　天麻二分　南星一丸　挍擲一丸
赤石脂一丸　鷄金一丸　巴硝三丸　大戟三丸　射干一丸　牽牛二分
右十八味以生蜜煉以水一度一丸五分用之ヲ
玉丹用ニヲロ訣
欲用玉丹使病者厚衣足伐袋鉢寒而后可投之雖大暑時身冷寒
以一度一錢半為十五丸丸吞之必勿中齒不
然則破口中若服後嘔吐氣以生米少炒二三粒可食之如是則
吐氣必止可施前也　且禁葷氣故新厠可建之ヲ

○寶丹　諸病常々可用之室丹玉丹ヲ用ル丁徳本ハ自由自在
ニセシトナリ病證ニヨリ用ヤウノ分量ニ甚タ勘辨アルトナリ此
意味肝要ニテ粗工ニテ難及ヿナリト云レントナリ又室丹ハ何病ニ
テモ常ニ用テ吉病人ヲ見テハ寶丹ヲ用ヨトイワレントナリ按ズルニ此
書ノ極意ハ諸病ニ玉丹ヲ以テ治シ寶丹ヲ以テ補ヘトテ云ノ治法ナリ
二方トモニ効アルベキ奇藥ナリ

○同書云　三聖湯　大寒　黄連　黄芩　大黄各大　芒硝中
乾姜　肉桂各小　甘草　右煎服　○二聖湯中寒
黄連　黄芩　山梔各大　黄蘗中　柴胡中　肉桂小　白朮小　莪朮小

甘草　右姜熬　○小白散小寒　地骨皮大　黄柏大
知母大　升麻中　山梔中　肉桂小　白朮中　柴胡小　甘草　右煎
○升氣湯大熱　附子中　乾姜中　木香中　良姜大　白朮大
肉桂小　藿香大　甘草　右煎服　○藿香湯中熱　乾姜大
白朮小　肉桂小　藿香大　川芎中　白芷中　甘草　右煎服
○白朮散小熱　人參中　黄耆中　白朮大　茯苓大　藿香大
肉桂大　莪朮大　甘草少　右煎服
按右ノ六方大寒大熱ノ藥ノ大中小ヲ三段ニ分テ諸病ノ寒證ト
熱證ト二用ユ手取早キ治方ナリ九證施イテアリト云ヘ𪜈茶劑

寒熱ニハヅルヽコトナシ其外此ノ稱號無尽ノ藏ニ九數前湯ヨリ發ヘノ次第ニ
通例ト違ヒ乱方ナリ尽ク右ノ書ヲ理會スルトキハ右ノ一流ニモナルベシ
然レ𪜈未熟ノ者ハ得ト斟酌差畧ナケレバ亦誤ルコト多カラ𪜈爲
ノミヲ以テスレバ妙薬医師ノ如クナルベシ徳本子ハ自ラ數年經驗ノ
工夫ツモリテ未熟粗工ノ及フベキニアラズ今此玉丹寶丹寒熱
ノ六方ヲ意ヲ以テ此流ノ極意ヲ知ルヿ銘々ノ了簡ニアルベキヿ
乎玉丹ハ近來紫圓ヲ以テ諸病ヲ瀉下スル法ニ近シトイヘトモ
其方多味ニメ用ヒヤウニ法アリ又寶丹モ弁用テ補フナリ一概瀉
下スルバカリニアラズ寒熱ノ六法ニテ補瀉ノ緩急ヲ知ベシ

右件本邦老医ノ傳此門ノ積聚ノ病ニ不関コナリト云ヘ𪜈當流ノ意得ニナルヿ多クレバ記スモノナリ

水腫

水腫ノ病因甚多シ故ニ治法モ亦多端ナリ諸方書ヲ歴覧スベシ此病ノ治法急ニ治スルト緩ク効ヲ取トノ二ツノ分別カ大事ナリ病人ヲ詰取ハジメニ此思案ヲ定ムベシ最ニ得タル證ハ急ニ治シテモ効アリイツマデモ腫満ノ證ニテリタル𪜈緩ノ療治セザレバ効ナレ水道ヲ通シ小便ヲ利スルガサシアタッテノ療治ナレ𪜈直ニ小便ヲ通ズルヤウニスルヨリハ小便ノ不通本ヘ心ヲ付テ療治スルガ医者ノ工拙ノタル処ナリ陰水陽水気血ノ辨博ク群書ニ求ベシ脈ノ浮沉肝要ナレ𪜈腕カ大キニ腫レバ浮ナル脈モ沉ニナルコトアリフレ𪜈ニ脈ヲ審ニ考ベシ此證ノ不治ハ群書ニイヘルコトレフレガ一ツアッテモ難治ト意得ベシ二ツモ三ツモアレバモハヤ不治ノ證ナリ腫満ノ病塩ヲ食スルヲ甚タ忌ム然レ𪜈一向断ハ食事ノ進メヤウガナイ此等カ医者ノ見計ヒ肝要ナリ

○陽水ハ飲食或濕邪脾胃ニ停滞シ或氣ノ鬱滞ニヨッテ発ス其證小便赤渋或大便結スルモナリ脈數ニシテ力アリ腫モ皆オモテ通リ陽經ニアリ是ヲ推ニクボムトイヘモ力アリ或渇スルモアリ先腹堅クシテ後手足ヘ腫ル、ナリ皆脾胃ニ濕邪停滞スルモノナリ故ニ

タベ中焦ヲスカスガヨシ厚朴猪苓澤瀉木通等ノ通薬ヲ用ベシ妄リニ大黄剤ハアレ、水腫濕邪ヲ受テ腫レテ足ナド痛ムモアリ或脚氣腫滿足腫ルヽモノ或風水トテ發邪ニテ偏身ハレヽアリコトグヽク越婢湯ヲ用ベシ食積停滯、厚朴七物湯心下痞シテ腫ルヽモノハ半夏瀉心湯又氣ニテ腫ルヽモノハ多クハ上ニ多シ腫ヲ推テ見レバ堅クシテ手ニ隨テ起ル上ニ多キモノハ薏子湯小柴胡湯ナドヲ用ベシ兒角腫ルヽハ通葉ニテハ通シガタク何ゾ發ルユエンアッテ腫レルナリ薏子湯ノ證ハ上ニ腫氣アリテ角ナドカタクコリ面ハルヽコトタシ下虛ニ實ノ證ナリ下ニ腫多キモノハ越脾湯ヨシ腹ニタタキモノハ

桃花湯ニテ下スベシ婦人小腹ニ魂アツテソレヨリ腫ルヽナスモノハ抵當湯或桃ノ承氣湯ヲ用ベシ○陰水ノモノハ咽燥セズ小便少シテトイヘドモ甚ダシブラス大便結セズ或病後久瀉ノ後腫レヲナス其腫ヲ推ニクサリタルガ如ク袋ノ内ニ入レテオスコトクアイラヘオセバ大ヒニクボンテヘッタリトナリコチラヘオセバ又ベッタリトナリ早速モトノ如クオシカヘスヲアガラズ是脾腎不足ニ屬スルナリ八味丸或眞武湯或附子理中湯ナドヲ用ルナリ長病ニテ少シニテモ足ノ甲ハルヽモノハ不治ナリ陰水ハ多クハ不治モノナリ後世ニテ用レバ陽水ニハ藿香正氣散加猪苓澤瀉或回春實脾飲又ハ胃苓湯ノ類ヲ用ルナリ又一方ニ白朮

茯苓陳皮厚朴麥門山梔猪苓沢瀉右八味水煎此方ハ腹脹腫気アルモノニ通ジ用ルナリ夏月濕邪停滞ヨリ腫レラナスモノ多シ右ノ正氣散胃苓湯ヨレ腹堅ノ凝テ腫アルモノニハ實脾飲ヨレ此方食積多シ濕邪停滞ヲ小便ニ通スルナリ後世陰水ニハ赤水壮原湯或附子理中湯加肉桂茯苓ヲ用ルナリ又ハ補中益気湯合五苓散用ルナリ又脾腎不足ヨリシテ腹ハリ小腹腫レ満デコレラ推ニ弱ク是ハ陰虚ニ多シ金匱腎氣丸尤ヨレ或氣腫ノモノ後世ニテハ分心氣飲又ハ分氣補心湯ナドヲ用ユ或導水茯苓湯ヲモ用ルナリ食物ニハ中鯉ヲヤハリ味噌ヲニ煮テ食スルモヨレ

越婢湯 方見氣短 此方ハ脚氣腫満ノ主方先ツ足腫レ痺レルモノニ第一用テヨレ或痛風ニテ偏身コヽカレコ大キニ痛ムニ用テヨシ或ハカク足ノ腫ヲ目當トレ用ルナリ日久レクレテ腫レメグリ兼ルモノハ加附子悪風ニ加ーアレモソレニ不限脉ニアラリ數ニヘズ少シ下ル指先キツメタキ氣味アルト云ヤウナメクリノヌルキモノニ附子ヲ見合セテカベシ

厚朴七物湯 方見積聚

蘇子湯 方見脚氣

小挾擲湯 全

桃花湯 婦人産後因瘀血腫者其人實者即効

半夏瀉心湯 方見痞満

桃花陰干一錢或二錢　右一味水煎

桃仁承氣湯　中焦蓄血ノ證ニ用ルナリ脉數ニシテ咽渇キ小便頻數ニテ腰カタノ塊ノ如ノナルモノアルハ蓄血ノ證ナリソレデ故ナクシテ湯水ヲ好ム六腫物ノ催(モヨオ)シト知ルベシ　方見傷寒

抵當湯　抵當丸ヲ湯劑トスルナリ　方見積聚

八味丸　方署

眞武湯　方見傷寒

實脾飲　腫脹一應之初起輕證通用

茯苓ホ　白朮　厚朴　枳殼　陳皮　茯苓各一錢　砂仁　木香各三分

香附　猪苓　澤瀉　大腹皮各八分

右生姜燈草水煎○衣松子云此方飲食ニ所傷ニ用テ腫ル者ヲ治ス或胸滿或噯(アイ)気或泄(スル)下者用之皷(ツヅミ)ノ梓(バチ)ニ應スル如シ或不服水土シテ腫モノ加(クハ)減(ヘル)香問亦奇ヲ得タリ若シ氣虛血虛ノ腫モノ此方中ニ於テ人參芍藥當皈ヲ加ト雖(イヘドモ)豈(アニ)能濟(ヨクスル)事ヤ学者臨(ノゾム)病酌量(ハカリ)斯可也ニ同春ノ加減ヲ見レバ一切ノ水腫ヲ治スル合点ユヘ北山翁如(ノ)勤辨(ベン)せり

壯原湯　治下焦虛寒中滿腫脹小水不利上氣喘急(ゼンキフイン)陰囊両腿(ヨウ)腫或面有浮気

人參　白朮各二錢　茯苓　破故紙各一錢　肉桂　附子　乾薑

砂仁 各五分　陳皮七分

右水煎食遠服○有痰加半夏一錢○喉中痺声加桑白皮一錢
欬亦加○脚趺面腫加薏苡二錢○中氣不轉運不知飢加木香
厚朴○氣鬱不舒加沉香烏薬臨服磨入○氣虛甚人參加作五
錢大附子加作一錢半○汗多再加桂枝五分白芍薬炒過八分
○夏月喘乏無力或汗多加麥門冬一錢五味子十一粒○夜夢
不安者加遠志一錢○面浮腫脇氣硬加白芥子八分○面浮腫脇下
氣硬加白芥子蘇子五分○身重不能轉動加蒼朮澤瀉七分○
濕盛加桑白皮赤小豆○一法用此湯爲散四君子湯加木香煨

心類送下○此方參朮ヲ用ル大抵苓破故紙ヲ用ル中桂附乾姜砂仁
陳皮ヲ用ル小ナリ此間分量進退意味アルベシ方ヲ制スル意未知上云ヘ
ル純ラ中下焦ヲ温補スルニ於テ此外ニ可用薬ナレ破故紙縮砂ノ二味意
ヲ付ベシ一方ノ趣向本方ヲ質トノ加味ノ働ヲ以テ効ヲ取ル合点トシヘ
タリ故ニ加味スベシ加減ノ方後ニ散薬ニノ用ルハ本邦老医ノ傳ナリ傳
者云破故紙ノ香ヲ忌ムト云ヘリ愚思フニ此薬ヲ煎服スルニ香サノミ
烈シカラズ然ルニ散薬ニスルハ煎湯ニテ用レバ秤ニカケレバ格別ヒ加減
何トメモ分量ニ不同アリ此薬分量ヲ大事ニスル薬故ニ兼テ散薬
ニメ分両不同ナキヤウニスルト云ヘリ

附子理中湯加肉桂茯苓方　此加味溫補ノ第一ナリ　飯田棟隆子
專用之寒熱虛實ニ不拘（カヽハラ）投ゼリ虛寒ノ者ハ即効アリ

補中益氣湯合二五苓散方　此二方ノ方意ヲ以テ虛腫ニ用ベシ

濟生腎氣丸料　按加味腎氣圓ハ嚴用和濟生方ノ方ニシテ後人
金匱腎氣丸ト名ク治腎虛腰重脚腫小便不利　附子炮ニ兩　茯苓
澤瀉　山茱萸　山藥　車前　牡丹各一兩　肉桂　牛膝　熟地
黃各半兩　右爲末煉蜜爲圓每服七十圓空心以米飲送下（ママ）薛
氏方　茯苓　熟地黃各四兩　附子五錢　餘藥各一兩　右薑棗水煎原爲丸
用之爲煎劑散劾（ママ）原方一錢半ヲ一分量異也意ヲ以テ臨證用ベシ

肉桂　茯苓　半夏
蒼朮　大腹皮各五錢

右薑棗燈心煎

分氣補心湯　治心氣欝結而四肢浮腫上氣喘急者

大腹皮　木通各三錢半　桑白皮　陳皮　青皮
青皮　香附　茯苓　桔梗　木通　川芎　前胡
枳殼　甘草　細辛　木香

右薑棗水煎

導水茯苓湯　治遍身水腫喘滿小便秘澁諸藥不效者用此即愈

赤茯苓　麥門冬　沢瀉　白朮各三両　桑白皮　檳榔子
紫蘇　木瓜各一両　大腹皮　陳皮　砂仁　木香各七銭半

右燈草二十五根連進三服小水漸利○此方去砂仁木香臭木加赤小豆商陸各大一兩治連翹各中一兩疥癬（カイセン）内攻シテ腫ヲ發スル二用テ吉

五皮散　面目四肢浮腫屬濕熱内無積滞者宜之或心腹膨（ハウ）脹上氣但急兼治皮水姙娠胎水ノ

五加皮　地骨皮　生姜皮　大腹皮　猪苓皮各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七八分頓服無時○三位法眼傳云脚気ノ腫満ト水腫ノ脹満ト積聚ノ脹満ト三品アリ脚気ノ脹満ハ平常脚気ヲモチヌル人足ヨリ腫テ上ル水腫ノ脹満ハ面ヨリ下ヘ腫テリ水腫ノ脹満ハ易治脚氣ノ脹満ト積聚ノ脹満ハ早ク治セヌレハ死スル治方ハ此湯可ナリ水腫ノ脹満ハ加木通檳榔枳殻書夜二十貼ハカリヲ與フレハ小便ヨク悉下（コトク）ルナリ積聚ノ脹満ニハ加枳殻大黄木通檳榔荊芥黄芩萩苓書夜三十貼ハカリ用ヨ大便不下ニハ大黄別煎シテ合半ヲ加ヨ此時ハ加人參ナリ脚気ノ脹満ハ積聚ノ脹満ト同方ナリ脚氣（カツケ）イトキハ少ク加鹿茸又兎絲子モ可ナリ○又云大切ノ病者小便閉此湯加人參萩苓檳榔○此湯加木瓜防已證治準繩名加味五皮散專治脚腫或不服水土入胃苓湯

脹滿

脹滿ト水腫ノ辨ヲ知ベシ水腫ハ手足面目頭下ヨリ腫テ次ハ第二腹ニ及ヒ
脹滿ハ腹ヨリ腫テ手足ニ至ルナリ水腫手足頭面ハカリ腫テ腹ニ不及ト
モアリ脹滿腹バカリ腫テ手足ニ不至コトモアリ或水腫腹ヨリ手足ニ及フモ
アリ脹滿腹ヨリ脹テ手足ニ及フ腫脹ト云水腫ハ多ク實ニ屬シ脹滿ハ多
ク虛ニ屬ス脹滿ノ病因モ亦甚多シ諸方書ノ證治ヲ詳ニ考ベシ

○鼓脹(コチヤウ)ハ單腹脹(タンフクチヤウ)トテ腹バカリ脹(ハル)テ手足ハ却テ瘁(ヤツ)ルナリ血證モト中焦ノ
ヤブレヨリ起(オコ)ルナレバ食滯(ショクタイ)リナレヨリ脹ヲナス是虛
中ノ實ナリ甚タ治シ難キモノナリ脹ヲスカセバ脾胃ニサワリ脾胃ヲ補ヘハ

脹イヨ〳〵ス何トモ治シニクシ時ハカヲ見テスカシテ後ニ補劑ヲモ用ベシ
朱ノ八厚朴七物湯或ハ小承氣湯ナドヲ用ルナリ間ニ十棗九ニ加大黃牽牛
子用テ下スナリ婦人血脹ナドハ抵當丸桃仁承氣湯ナドヲ用ルナリ是
古方家ノ治法ナリ後世ニハ血脹ニ準縄ノ當歸活血散又ハ散血消脹湯ヲ
ドヲ用ルナリ又通用脹滿ノ劑ハ後世ニテハ藿香正氣散加枳殼檳榔用ルナ
リ或實脾飲又ハ一方ニ白朮蒼朮陳皮茯苓薄荷厚朴麥門冬甘草七味水
煎氣滿アルト見ルモノニハ加木通木香或加豬苓澤瀉或加大腹皮何レモ腹
滿ヲ瀉スルナリ是補中治濕湯補氣建中湯ノ類ナリ此越脹ヲ脾腎虛
ヨリ發スルモノニハ壯原湯ヲ用ルナリ或腎氣丸ニテ無效モノニ景岳全書ノ方ニ

參附理陰煎加白朮治之トアリ脾腎虛極ノ甚キ二用テ効アリ予腎気丸ニテ無効二用テ効ヲ得タリ大劑ニシテ用ベシ熟地黄ノ製吟味スベシ

○婦人單腹脹ニテ小便モ相應ニ通シ食事モアニリ方ナヌニ積塊ノ加減ニテ効アルコアリ尤灸治ヲ數千壯スベシ後藤流ノ熟法ナド効アルコト屢見聞シタリ又自分ノ經驗モアリ煎湯ハ四劑ノ内消散ノ類或一方ニ茯苓半夏枳實厚朴甘草ヲ主トシテ我朮青皮芍藥ナド見合加味ノ積塊ヨリ發スル諸證ニ用テ効アリ或氣鬱類勞ノ證ニ灸治專ラ相兼テ効アリ此一方ハ金匱半夏厚朴湯ニ似タモノニテ後世四七湯ト名ク梅核氣ヲ治スル藥ナリ故ニ氣鬱ノ甚タニ當テ茯苓ヲ加減シテ効アルナリ茯苓ハ血気不足ノ一躰ヲ燥キアルモノニハ此一方ナドヒ或當飯阿膠小蘗根黄芩知母ノ類ヲ加味スルトイヘ𪜈爽火血熱ナド兼タルニハヨクレド眞ノ血気不足ノ證ニ用ルトキハアレカヤウナル味ハ諸流ニアタリ精シク試ザレバ治法一偏ニテリテ辞医ノ名分ヌヨカレ難シ又鼓脹單腹脹ニカギラズ一切ノ浮腫ニ赤小豆四十商陸七文大蒜ニ文三味煮熟シ商陸大蒜ヲ去リ赤小豆バカリ一日二食尽シテ其間粥一合ヨリ外ニ食セズ塩酢シテ鼓脹モ愈レコト屢見聞シタリ是モ本草細目赤小豆ノ附方ニアリ右赤小豆ニ廻リ或二廻リ二廻リ程ニ腫ノ輕重ニテ用ルナリ其間毎日丁字湯金加茯苓一貼づゝ赤小豆ヲ食フロナホシニ少々ツヽ用ルナリ大蒜ニテ口中アレクルナルユヘナリ

當皈活血散　療畜死血ニ因テ脹滿ナリ腹皮ノ上ニ青紫筋ヲ見シ
小水反テ利シ脈乳濇婦人此疾多シ先與桃仁承氣湯重者抵當湯
其人虛弱ニテ下劑難用者ハ此湯ニ調和之

赤芍藥　生地黃　當皈各一錢　桂枝半錢　桃仁　紅花　香附各一
川芎　牡丹皮　玄胡索　蓩朮各五分　三稜　青皮各七分

右水二鍾煎七分空心服

散血消脹湯　治血脹小便多大便溏黑光亮

歸尾一錢五分　五靈脂　肉桂　烏藥　甘草各六分
川芎一錢　蓩朮各八分　紫蘇五分　砂仁一錢半　生姜五片

右水煎食前温服○此方前ヒト大抵同シ玉ヒ血脹滿ナリ腹皮ノ上見青紫筋或手足有紅縷赤痕小水利大便黑輕證ニハ宜此湯重キヒハ八金丸下瘀血湯不應抵當丸去氷蛭ヲ加ヘ蠐螬ヲ換雖為丸空服進括子大三九血下ヲ止後服

○本邦老医傳云心膜肚腸ノ皮強ク皮ハリ推セハ大鼓ノ皮ヲ打カ如ク三タ九三ナク底ニ物ナク空虛ナル脹ナリ或大便少シツヽ瀉ス虛證ニシテ是ハ煎茶ニテソロ〳〵汗ヲ出シテ小便ヲ通ズヘシ

補中消脹湯

香附　陳皮　白朮　茯苓　藿香　編著

右六味水煎〇右煎湯ノ間ニ補薬ヲ丸薬ニシテ用ベシ

寛中丸

白朮　人参　木香　挍榔　厚朴　蕎木

右六味為丸〇右ノ煎湯ヲ薬油断ナク用テ禁物ヲ慎ムベシ

〇腰脇ノ皮ハツレホド脹リ尻腰モ脇モ大ニシテ底ヲタタク石ノ如クシテ痛ミ又便結シ小便黄赤ナルハ満ナリ實證ト知ベシ煎薬ヲ満気ラクルクルナリ

寛胃湯

厚朴　枳實　陳皮　茯苓　香附　挍榔　黄連

右七味水煎〇此分ヲ常ニ用テ大便結セバ六七日ニ一度ヅヽ瀉腸丸

ヲ五十粒ホドヅヽ用ベシ如此療治シテ満實ノ心少シクツロキ心安シトイハバ又補薬ヲ少々用ベシ

人参ノ白朮ヲ青皮　挍榔　大腹皮　芳茶　右水煎ジテモ丸シテモ用ルナリ脹満ニ限テ治痛ノ薬バカリヲ偏ニ用ベカラズ中焦ノ正氣虚セル故ニ脹トフクレ満トニナタルナリ故ニ補薬バカリニテハ脹満シリゾカズ消脹ノ薬バカリニテハ中虚本復セズ発心閙五六日ハ病ヲ攻メ又二三日ハ正氣ヲ補フナリ効験ヲ急グベカラズ

〇膨脹ニ限テ心腹ハリニチテ苦シキ故ニ病者モ泊シタガリ医者モ病者ニイソガレテ急ニ通瀉ヲ用レバ一旦ハクツログヤウナレドモ二三日スギテ前ヨリ二倍ツヨク脹ルナリ故ニ効ヲイソガズ表脹ナラバ汗ヲ發シ尿ヲ利シ

其間ニ補藥ヲ用ベシ裏滿ナラバ二便ヲ通ジ脹滿ヲ消治シテ其間ニ
補藥ヲ用ルナリ

○小便澁(シブ)リ小腹脹ラバ木通茯苓瞿麥車前子ヲ加ベシ小便澁(シブ)ル
ヲ其ヒマオケバ面目四肢ニ腫氣ヲ生スルナリ澤瀉山藥ノ目大ヲ加ベシ

○寒脹　木香小　厚朴中　山楂　良姜　縮砂　檳榔　青皮
肉桂　莪朮各中小　香附　芍藥　枳實　枳殼　大黃各少

○鼓脹ハ　山楂小　黃連　香附　芍藥　枳實　枳殼　大黃各少
○脹滿ノ禁食ハ魚鳥一切ノ美食生冷諸ノ硬物甘味ノ物菜ハ甘草
右補中消脹湯ヨリ下本邦老醫ノ傳ナリ

厚朴七物湯　小承氣湯　十棗丸　實脾飲　壯原湯
以上五方見前

參附理陰煎加白朮方　治腫脹脾腎虛極者屢得効

薤地黃大和產大者不用酒　當皈　二三錢　炙甘草一二錢
數遍蒸三五七錢　乾姜黃色炒一二三錢　肉桂　二人參　附子　白朮各三五錢

右水二鍾煎七八分熱服○景岳全書云金匱腎氣丸三方無効者
用之方中ノ茯苓澤瀉牛膝車前子等脾腎虛極ノ者ニハ不所宜
ト云ヘリ其論新刻睡脹全書ニ詳ナリ此藥ノ分量ハ時ノ宜キニ
隨ヘシ大抵薤地黃一錢目韓入參二分三分見計ニ用ベシ

産前後

從是以下三門ハ僅ニ治法ヲ誤レハ救ヒ難ク又ハ蓐(ジョク)草トシテ愈難キニ至ル病證ヲ次第ニ拘ハラズ擧テ經驗ノ治方ヲ記ス

諸ノ古書ノ通リナリ難産ニテハサヽ(ササ)ノ治方アリ催生(サイセイ)ノ薬モ〻アリ大抵仲條流ヨリ手早キ療治ノ法ナリソレユヘ産前後ノアシラヒハ都鄙(トヒ)トモニ仲條流ヲ多ク用ルナリ穩婆(オンバ)ノ功者ナル少シ産婦ノ虚實ヨリ産前ヨリノカヽヘニ補薬ヲ用ルコトモアリ初産ナドニ虚弱ナルモノハ催(モヨヲ)シアルヨリ獨參湯或參ノ姜湯ヲ兌計(トリハカラ)ニ用ベシ催生ノ藥ハムヤミト用ベカラズ格別ノ證ニ用ベシ然レモ胞水下リテ産ヒザル者ニハ急キ用ベシ催生ノ薬諸方書ニハ家々ノツカヒ覚アリ大抵催(モヨウ)レアリテ平和ナル産婦ニハ仲條ノ本味ヲ用ベシ人參

本味七味生氣散

入參　白朮　當歸　川芎　芍薬　沈香各等分　甘草

右水煎或加陳皮香附或隨證諸薬有增減(此方為散或獨參湯以薄味噌汁用之)此方ハ大抵一通リノ産婦ニハ人參ヲ産前産後ニ至リテモ用テヨシ虚弱ナルモノハ眞ノ人參ヲ用ヒ薩摩人參吉野人參ハ不可用此品痰鞕(カウ)ヲ推(ツ)レ

閧ク功アルニヨリ實證ナル産婦ニモ却テ白朮當歸ノ類泥ミズレテ
通用虚婦實婦トモニ産育養生ノ藥ニ數ノ藥ニレテ九味ノ本味ノ
古ヲ用ルナリ或國ニ此散藥ヲ實藥ニレテ産前後ニ通用レテ甚
タ効アリテ此散藥流行ス原仲傑ノ本味ノ粉藥ナレバ効アルモ理ナリ
○猪産後ノ事一通リハ仲傑ノ本味ニ證ニ隨ヒ加減レテ用ベレ仲傑流ノ
寫本多シ考見ベレ或ハ六味擯ノ藥アリ是レ赤井龍王湯ナリ類ノ家々
ニ多レ血暈上氣反張ノモノニ用ルナリ即効アル藥ナリ製レモ脱血多
キモノニハ禁用ナリ當參湯ヲ用ベレ脱血ノ血暈ニハ安神散ヲ獨參
湯ニテ用ベレ正氣ツヨバ藥ヲ銖銓ノ積虚湯ニ參湯ヲサレ加

（用ベレ是レ血脱ニ氣ヲ補フハ古聖人ノ法ナリ又難産ニテ手擧リ血脱レ
元氣モ弱ノ大汗出ルニ參ノ附湯デナケレバ屆カヌノ油斷ナク用ベレ又
産後ニ嘔逆アルニ虚弱ナルハ四君子湯異功散或湯アルハ七味白朮散
ナドニテ二貼見合ルコトアリ此等ハ皆虚弱ナ上デノ療法ナリ其外
産後ノ諸證黒藥ナドイロく治方アリト云ヘモ盡クハ記シ難シ此
書ニ産後ノ脱血家瘀血家ニテ治方若シ差ヘバ忽チ入命ヲ絶ツヘ
ニ産後虚實ノ大端素人ニテモ意得ニナルコトナレバ玆ニ書記スナリ
○猪出産レテ血ノ下リヤウノ多少ヲ第一ニ問ベレ是レ肝要ノ意得ヲ
リ瘀血ヲ一向ニ見ザルモノ或瘀血ヲ下リ少シバカリノ者ハ必瘕血上

テ血暈シテ正氣ノ头ヲコトアリ十六味擬茸ヨシ甚シケレバ一味ノ熊胆二三分或一二分用テ即効アリ必脉ガ伏スルモノナリ驚クベカラズ瘀血上衝テ經脉ヲ塞グナリ此時ニ熊膽ヲ用レバ瘀血ヲ下ヘ下スコト速ナリ瘀血下レバ脉モ出テ正氣ヅクナリ煎湯モ瘀血ヲ下ス劑ヲ用ベレ大黄ナド入ル煎湯或擺茸ヨシ必紫黒色ノ塊リタル瘀血ヲ大分下スモノナリ大方ヤ夜中モ次第ニ瘀血薄クナリテ下ルモノナリ近來ハ此場ヲ桂枝茯苓加大黄湯ヲ用ルナリ必補茸ヲ用ベカラズ此證ニハ久シク甚タシク著モ茸入モ脉ノ無キヲ見テ性々誤ル人アリテ、獨參ナドヲ用ルトイヨ〳〵甚ギヲ即死ス此時古方家吉野

人參ノ熊參湯ナドハ即効アルベシ是レ吉野參ノ人參ハ唐艹ヲニクシユヘ害ナレ韓參ノ害參ノハ瘀血ノ塞ルモヤハリ補フユヘイヨ〳〵甚キノ怨ナ甚ス大抵此味ニテ韓參唐參ノ場ヘ吉野參代藥ニナルモノカ考ヘ見ルベシ畢竟吉野參ハ古來ヨリツカニ來ルト和人參參節人參同物ニシテ直根ト云ヒテノコトニテ虫積ノ茶ニ入ルモノナリ微塵モ眞ノ人參ノ代ニナルモノニアラズ不吟味ノ医師益気湯太補湯ニ入レ用テカノニ障リモ見ヘヌモ理ヲ湯ナドノ吐瀉ノアル證ニハ忽チ害著シ但シ近來ノ說如ク元來補ト云コトハナシ人參心下痞鞕ヲ治スト云見解ナルハス格別ノ沙汰ナリ痛中人以上財主ナドノ初産ニハ産前ヨリ獨參ヲ煎ジヲキ瘀血ノ下ル多

少ノ吟味モセズ血暈脉伏スル否ヤ参湯ヲ用テ大ニ死ニサセルコトアリ却テ俾賤ノモノハ此アヤマチナシ故ニ既ニ分娩セバ敗血ノ下リノ多少ヲ詳ニ吟味スル事秘中ノ秘ナリ千ニノアタリ蠱試之産後補瀉ノ大端ト又人参ト熊膽トノ用法ノ分別コニアリ若シ脱血甚多ノ脉絶モノハ多クハ難治ナリ必虚弱ノ婦人ニアルモノナリ産前ヨリ其意得シテ補薬ヲ用テカニヨク然レ共何程産前ニ養性シテモ敷脱血シ随分大補ヲ立カケ用テ届クモノアリ人参ノ善悪分量ノ多少モアリ又定命モアリ此等ハ一概ニ意得ベカラズ大抵脱血家ハ脉ガフワ〳〵トガテカクナルモノナリ是虚脉ナリ其試自得ニアラバ人参ハカリニテハ

届ヌナリ参ノ附湯ヲ用ヘシ唯敗血ノ下ラヌモノニハ非ス一云ハ此補剤ハ禁ナリ若シ誤テ人参ヲ多ク用レバ脉モ伏スルモノナリ世俗ノ人産後ニ人参ヲ嫌フモノアリ是敗血ノアル産婦ニ誤テ人参ヲ用ヒ却テ血暈スルユヘニ人参ハ産後ニ悪シトノミ覚テイルモ是レ素人ノ餘儀モナキ了簡ナリ医者モ此大端ヲヨク〳〵考ヌヨリ産後脱血家ニ人参ヲ用ルトテモアブクトシテ恐ロシガルナリ餘病ト違ヒテトリナキモノユヘ血脱ト敗血トニテ補瀉ノ用法天地懸隔セリ實ニ詳カニ察セズンバ忽チ人命ヲ絶ツ天道豈恐レザルベケンヤ

○醋ヲカバセルモノハ敗血家ニヨシ脱血家ニハアレヘ

○虚弱ノ産後調理ニハ大補湯人参養営湯ガトリ〳〵意得ベシ或産後專

門ニ補中益氣湯加附子乾姜オシテ用ルナリ然レトモ其産婦火ノ勝チ上逆スルモノニハ升提ノ劑ニ桂附ハ逆上スルナリ逍遙散ニ人參ノ陳皮麥門冬ナドヲ加ヘ或苦酒調血飲ノ類見合セ用テ上逆定テ後ハ物湯ガヘリト意得ベシ抽黃泥ムコトアルニハ補虛湯ニ指引シテヨシ益氣湯ハ勞役或ハ氣ノ引立テカイナキニ用テ氣ヲツケノ意キカタキ是レモ血脫ニ補氣ヲ用ル例ナリ當飯地黃ナトハ急ニ補血スルモノニアラス血ハ氣ニヨリテ生スルト云古聖ノ格言ヲ以テ先ツ補中益氣湯ヲ主劑トシテ乾姜附子ハ長ノ者ノカヲメグラスタメナリカヤウナルコトハ返來テハ一向イハヌコトナレモ血ハ氣ニ依テ生スルコト現然タリ血脫補氣者古聖人之法也ト云ヒ是 内經ヨリ出タル要旨

シテ後賢此語ヲ述テ萬世脫血家ノ規矩トナルハヤハリ内經ノ註ト云モノニシテ今日内經ニテヒカ取アルヘシト云ヒノニアラズヤ我陰虛則内熱湯虛則外寒ノ經文ナト今日治療ニヒシト符合シテ東垣補中益氣湯ヲ建立シ玉フ深旨ナリ此陰虛則内熱一云ヲアレノ意得ハ陰虛ヲ動ノヤウニ思フ人間違ナリ此辨別記スト言長ケレハ此ニハ不述ナリ

○儲產後蓐勞ト云モノ多クハ調理アレノ補藥ハ乳ニ障ルナドテ胡乱ニ黑燒菜ノ類瘀血家ノ粉菜等ヲ飲ヘナリ是婦人トイヘトモアラカジメ意得ベキコトナリ

右ノ外產後ノ諸證イロ〳〵アリ大抵仲條流ニテスム考ベシ然レトモ括

別ノ六ケ數證ニナッテハ仲條流バカリニ拘ルベカラズ婦人良方ノ辭氏ノ註ナド見テ能々施治スベシ臨機應變ノ工夫アルベシ

補虛湯　産後ノ虛弱ナルモノニ用ベシ大補湯ノ類ヲ可用證ナレドモ食モシカク不進地黃ナドノ用ヒガタキニ先此補虛湯ニヨロシ加味ハ見ヨヒタルベシ

人參　白朮　當歸　黃耆　陳皮　當飯　茯苓　甘草

右水煎　發熱甚則加柴胡炒黑乾薑

安産名方　産前後打撲折傷金瘡大食傷狂亂滯痛大腹痛黃胖病氣附毒酒反張血暈疔瘡惡瘡癰中風瘡瘡後溺水胞衣

不下産後諸證効驗難尽述

當歸　芍藥　黃耆大　良姜中　川芎大　黃芩中　大黃小　木香中　川芎大　黃連中　肉桂小　桂心小　人參隨宜　甘草小

右十四味ヲ土器炒一貼壹錢四五分擬用三度石ニ書貝〇有艱加柴胡〇金瘡筋斷絶加柳中丁子小〇打撲倍川芎

凡瞎血ヨリ發ル諸病和流ニテ通用ヅリ金瘡血暈上氣反張大熱疾痛等ノ證最妙ナリ此方類方多シ家々ニテ兼銘モ違ヒ安暈湯滿湯ヘ參湯地香湯ナド皆此類ナリ二ツ十二味擬ニ云ハ是ナリ此方寒熱補瀉ノ品駁雜ニテ一處ニ炒リ火ヲ忌ム藥モカクハスベカラズ澤タル藥劑ナレバ上代

ヨリ都部ト一モ二用ヒ覚ヘ意外ノ効アリ産後一両年モ歴テイロ〳〵持病
ヤウニナリ或労證ナドニ給レルモ此方ニテ効アルコト多シ加減指引分量
ハ證ニ臨テ意ヲ以テ増損スベシ此方發地黄或乾地黄ナド入ル方モアリ
或紫檀乳香麝香ナド入レ方モアレ是ハ主治多キ藥ユヘ家々ノ加減ヲ
スクニ二ヶ所ト立シト見ヘタリ都部雑集ハ近来ニテハ実ベキノ方ナリト
イヘ共又理外ノ効アリ必用ベシ

黒荼順栄散　産後血暈悪露不下或労物煩悩盡瘡打撲一切血證

自然生　川骨生　黎霜十銭　沉香生　乾鮭首霜各
甘豆赤者浸熬茶去皮末一両　乾鮭七銭

右六味一味究細末後合之○黒荼頽方名ノ此方ニ至テ効アリ

安神散　脫血元氣甚弱血暈

茯神　白朮炮　黄耆　遠志　山菜各十銭　人参　桔梗各五銭
木香二銭半　辰砂　甘草各二銭

右為散白湯送下或以獨参湯和散服

失笑散　産後悪血上攻心腹作痛或牙関緊急者主之

五霊脂　蒲黄各一銭

右細末白湯送下

奪命丹　胞衣不下以致心胸眼痛者主之

附子半両炮　牡丹皮二両　乾漆一両　大黄一両

右為末桐子大丸温酒呑五七丸

無憂散　胎衣不出腹作痛手按痛稍緩者宜之

當帰　川芎　芍薬　枳殻　乳香各三銭　甘草　髪灰各一銭半

右為末毎三銭水煎服

芎帰調血飲　産後諸疾宜加減用之　加減法在諸方書

當帰　川芎　芍薬　熟地　白朮　茯苓　陳皮　香附

桂枝茯苓加大黄湯　見雑病○七味白朮散　方書

勝勢飲　治産前後一切諸證上鬱下寒者温腰膝赤白帯下屬寒者極効

香附炒　大川芎　茯苓　肉桂　當帰　蒼朮唐炒　沙參各中

木通小　丁子中　小甘草少

右十味擣用後煎服○和方ナリ婦人ニ用テ効アル薬ナリ

○産前悪阻六緊藕和気飲類其外痰ニ因ルモノハ二陳湯加味ヨシ半夏ハ黄色ニ炒用テヨシ或悪阻嘔吐属血虚者秩芩補心湯加黄連竹茹○悪阻ハ嘔吐ノ定ル時節アリ無理ニ薬ヲ投スレバ薬食上セニ受スコトアリ其節ヲ暫ク見合セ休薬シテヨシ小半夏加茯苓湯ヲ下ス半夏一銭餘

此病近來四方ニ傳深シテ輕重アリテ老壯男女ヒトシク患ル者多シ初発ハ淋病便毒疳瘡ヨリ證ニヨリテイロ〳〵ノ惱ミアリ繁華ノ地最多シト又食毒酒濕味ニヨリテ発ルアリ此療治方諸家ニイロ〳〵用ヒ覚ノ方ヲトリテ効ヲ取ルナリ其内素リ生レソイテ濕熱ノツヨキ證或其父母ヨリノ遺毒アル證ニ再ビ傳深スルモノハモヒトク并ニ火ノツキ安キ道理ヲ傳深モ速ニ其病モ重シ最初荊防敗毒散又ハ消瘡敗毒散消風敗毒散ノ類ヲ用ルナリ便毒疳瘡ニ至リテハ龍胆瀉肝湯或便毒下シ粉藥或和方キケンホウノ類方ニ大元湯ト云アリ最効アリ證ニヨリ速ニ愈ルモアリ長引

モ用レバ二五日ノ内ニ墮胎スルモノナリ今ヲ通用ノ粘半夏菜離ニテ數遍水ニテ洗ヒ晒シタルモノヲヘ製同然ナリ然レドモ姙娠ニ壹錢餘モ用レバ胎ニ障ルナリ○偖胎動トテイロ〳〵ノ事アリ和氣飲安胎飲ノ類ニテヨシ甚シキハ子癎トテ臨月ニ痙ヲ發スルコアリ羚羊角散或葛根湯ト云主方アリ見合セ用ベシ其外子煩子腫子淋ナド皆胎動ナリ諸ノ方書ニアリ數覽スベシ惣体産前後ノ諸證此分ニテハ治法不足ナリ今此書ニ次第ニ掲ハラズ産前後門ヲ擧ルハ畢竟産後補漏ノ綱領ヲ著シ述テ素人ニデモ疑ナク脫血瘀血ノ證ニテ療法大イニ相違ナルコトヲ遠境辺鄙ノ医ニモシレキ里ヘ知レメント欲ス和氣飲等ノ數方衆方規矩大成ニ詳也

痲愈リカタキ難義ニ及ブ證モアリ此ハ毒氣ノ淺深其人ノ虛實ニヨッテナリ此病外見ヲ人々厭ニヘ發出スルコヲ息ミ或輕粉劑ヲ時節アレク用ヒ上部ニ毒氣ノ有無ヲ不論妄リニ用ヒ誤ルコ多シ本草ニ輕粉ノ毒頭中三非ズ百藥不治ト云ヘリ故ニ下部ニ毒氣アリテ愈ガタキニ多ク粉劑ヲ用ルナリ然レドモ用ルニ法ヲ得ザレバ却テ障ルナリ又葉湯或温泉モ所ニヨリ時節ニヨリテ的不的モ辨ヘズ却テ其病ヲ破壞スルコ多シ大抵土茯苓ヲ久服シテ其間加減指引シテ燥キタル證ハ滋補ノ劑四物湯六味丸ノ類ヲ兼用ルコトモアリ或解毒劑ナドニテモノ古方家ナド專用ルナリ土茯苓ヲ主トシテ不通忍冬ノ類ニテ小便ヨリ毒氣ヲ通シ大黄ニテ大便ヨリ毒気ヲ泄シ川芎ニテ血熱ヲ解スル此方モ家々ニテ少々茶品ノ差アレド大抵ハ右ノ藥味ナリ證ニ隨ヒ荊芥防風ヲ加味シ或芒硝ヲ加味シ蝮蛇ナドモ加味スルコアリ一貼土茯苓三錢或五錢壹夜三貼モ四貼モ病人氣根次第ニ用テ効アリ大抵此方ヲ最初ヨリ油斷ナク用テ愈ルモノナリ此方ハ便毒疳瘡久淋ニモ用テ効アリ又防風通聖散ニ土茯苓ヲ合半ニシテ用ルコアリ是ハ頭面ヘ發出シタルモノニ用ベシ兎角發出スルコトヲ忌テ最初ヨリ二便ヘ毒気ヲ拔ク療治當世專ラ諸人好ムコトナリ然レドモ都合ヨク両便ヨリ毒氣又ケヌ證アリテノ毒發出スルモノアリ此時ニ往々急テ輕粉劑ヲ用テ一旦愈ルト云ヘドモ後日ニ害ヲナス

コトアリ又其人ノ證ニヨリ粉劑ニテ愈ヲ重テ發セズ生涯無事ノモノアリ是ヒ毒氣ノ深淺其人ノ稟賦ニヨッテナリ此病彼ニヨキ程ニトテ又是レニモヨシト云テ請合ノ輕粉劑ヲ妄リニ用ベカラズ

○偖此病結毒ニナリテハ大抵ニテハ愈スモノナリ結毒ハ骨カラニトテ毒氣筋骨ニシミツイテ筋骨痛ヲナスナリ或久年ノ頭痛トキ〳〵增減アリ是ヒ風邪ナドノ頭痛ト違ヒ頭ノ骨ノ痛ムナリ或手臂肢脚ノ骨イタミ或腰胯膝足ノ脾ナド痛ミ步行ナリ難ク或陰莖痛ヲナシ陰囊腫レ硬ク或穴ヲ生シ膿水出テ或頭面肩臂手足ニカギラズ瘡爛ヲ骨ヲ見シ年ヲ歷テ口ヲ收メズ或皮肉ハ潰リナク骨ハ爛レテ口鼻ノ咽喉關ヲ蝕潰セル上ヒ是病根甚深ニ中々通例ノ劑キケンボウ解毒劑ナドノ治スベキニアラズ回春ニアル通仙五寶丹ヲ用ベシ此方ハ王泡泉ガ廣東ニ遊宦シテ傳來シ極メテ眞ニ楊癩ノ仙方ナリ寶之寶之ト襲氏ノ書シレモ外ノ丸散ハ回春ノ上池ノ如ク皆々功アルヤ否ヲ不知トイヘ共楊梅瘡ニ於テハ五寶丹ニ經驗セシコト數人ニ及べリ其外楊梅瘡ヲ癒テ後一切名ノミクラヒ又病ヲ患ヘ癩癇アルヒハ類中風ノ如ク一向楊梅瘡ノ痼疾ハカリニテコレヘズ他病ニ紛レテ何薬ヲ用テモ愈ザルモノ五寶丹ヲ用テ久年ノ

病根ヲケルコトアリ其名狀シガタキ病モイロ〳〵アレバ委クハ記シ
難シ偖此方奇方ナリト雖モ世間了簡チガヒアリテ五寶丹ヲ
至極ノ峻劑ノヤウニ覺ヘ素人ハ勿論醫師モ甚ダ恐レヲナスモノアリ
是レハ右ノ藥ノ内ニ飛白霜ヲ用ヒ日本ニテ不圖トリチガヘ輕粉ニシテ用ル
ユヘナリ飛白霜ハ温飩ノ粉ナリ炒リ過シテニ分半トアルニヨリ輕粉
取リ差ヘンモノナリ今ニテモ輕粉入ノ五寶丹アリ是ハ絶テ口ニ
口中破損シ甚ダ苦シミ堪ズ虚弱ナルモノハ危キニ至リ又ハ輕粉ヲ
生ニテ炒ズ分料モ餘計入ル方ハ別ノ峻ナリ然レドモ瘡ノ愈ルコト七
八日ノウチニハラノト乾キ食ルナリ此外投込ナドト云丸薬多シ何

モ輕粉ヲ生ニテ餘計入レ方ナリ妄リニ用ベカラズ毒気上部ニアルモノハ
究メテ害アリ一應ノ瘡便毒処ノ治邊ニ毒発出スルニ且粉入
ノ丸薬ヲ用ヒ早速ニ愈ルコトアリ此レハ輕粉ヲ炒リ過シ隨分小粒ニ丸
レ辰砂ヲ衣トシ一度ニ卦目ニ分ツ、蜘蛛物湯加柴胡山梔肝火ヲ制スル
剤ニテ送下ノ即効アリ然レドモ後日ニ骨痛ナド発スルモノナリ其時ハ
搜風解毒湯ニ大黄川芎ナドヲ加ヘ用テ治スベシ上茯苓五七錢モ一
貼ニ入レ油断ナク用テモ効ナキ者ハ最ク五寶丹ヲ用ベシ何剤用テ
モ害ナシ病深重ノモノニ世間ニ二剤ヲ用テ少シ効アリトイヘド大剤ヲ
茯苓煎ナレバ用ヒアグ其外食忌モ多ケレバ退屈シテ呑得スシテ愈

ザルモノ多シ但春三五寶丹ノ呑汁ノ土茯苓湯ハ毎日一斤ヲ前シテ十二杯ヲ
スベシトアリ五寶丹粉茶ノ分量ハ五錢六各ノ分量アツテ麪粉二分半餘ノ
粉茶合シテ五匁即是ハ唐モ日本モ同シ分量ナレ圧土茯苓
湯ハ但春ニ於毎日百六十目ナリ日本ニテハ隨分餘計ガ四十目ナリ十二
日分ニシテ四百八十目ナリ唐目三斤ニシテ但春ニアル分量ニ十二ケ月ナリ
四双倍ノ分量多シ尤異邦ト本邦ト菜ノ呑ヤウ圧多少アレ圧元來
此土茯苓ト云モノ味淡薄ニシテ餘計用ニサレバ効ナキ菜ナリ惟間
土茯苓ノ恐ロシガルハ土茯苓ノ各ニアラズ土茯苓ノ煎湯ノ加菜
大カタ大黄黄連黄芩ナリ或兼用ノ丸藥巴豆輕粉并ビ用ル丸

アツテ瀉スルカ不食シタリロ中爛潰ヲ吐キテ加菜ノ論ニヨリ暗ニア
ルベシ是ハ土茯苓ニハ恐ナリ本草ニ健脾胃利濕トノミリ又廣
東ナドニテハ平生野菜ニ土茯苓ノ食アコト日本ノ芋ノ如シトイヘリ少シモ
恐ルベキモノニアラズ尤乾ス時ナルモノニ血分ヲ扶クル人ハ用捨スベキナレ
圧既ニ楊梅結毒ノ人ハ血分乾キタル人ニテモ外ノ藥ノ及ブベキニアラザレハ
土茯苓ニテナケレバ効ナシ跡ニテ滋補ノ調理ハ格別ノ支先ツ五寶丹ヲ
ド用ル中滋補ノ兼用ハナリ難シ手方傳來ニ土茯苓四十日ノ内ヘ
貢連壹ヶホト加味シ用ルナリ如斯スレバ火ノ多キ婦ノ證モ土茯
苓一味ヨリ用テ燥カズ又證ニヨリ五寶丹ヲ土茯苓煎ニテ用ル中

大便秘結シ難儀ニ及フコトアリ是ハ石方三黄圓ヲ製煉ニシテ土
茯苓煎ヲ用ルゴトニ掛目三分或五分程モ用ベシ里竟五寶丹ヲ
灌粉茶ニテ骨節ニ毒氣ヨリ發シタルヲ早朝ニ一度用ルハ藥物
ノ垢キタルヲ吸ヲ穀テ磨クヤウナルモノニテ跡ニ大劑ノ土茯苓煎ヲ
用ルハ水ヲ流シテ洗フカ如キモノナリ此水大水ニテクンバ垢ヅキタル
モノサヘハリトナリ難シ會五花茶百六十目ヲ水三升ニ煎シ
テモ格別濃キ煎湯ニテモナシ十二掬ハ大抵一升二合ホドナリ十二
日ガ間四春ニ茶湯水難鵝毛劑ヲ忌ヲ然レバ病人大ニ
ナラバ鹽酸ヲスル程ニテモヨシ小便能通スレバ効速ナリサレ共一向

鹽酸モナラヌモノナシ然ニ昆布ナト蒲ノ者ヲテ食スベシ飯ハ舊テ能進ムモノナ
リ下地不良ノ者或久シク煩ヒ食事ニサリ嫌アルモノハ輕キ魚類一塩ア
テ、見合用ベシ是等醫ノ見計ナルベシ惣体五寶丹ハ遅キガヨシトノ人
ニ大抵二百日以上ノ病ニハ氣ヅカヒナシニ用ベシ左結毒ト云モノハ最初ニ
結毒ニナルモノニテナシ痢瘡便毒或發出毒ノ後ニ初發ノ藥治ス能テ
モ悪クテモナル支アリ早過ナドヽ云支モ回春ノ向ニテ見ベシ是ハ輕
粉入ノ五寶丹ヲ用ルトテイヒ出シタル支ナリ輕粉ハ毒ノ深淺ニヌキ
ラヾ早速愈リテ毒發出セントスル勢モ押込テ仕廻ユヘナリ
○偖回春ノ分量ノ如ク一味ヽ擂細末シテ一褁三分ヅヽニシテ十

二日 十三服ナリ無朝一裹ヅヽ土茯苓煎ニテ攪テ用ヒ二度目ヨリモ茯苓湯バカリ被ヘカケテ呑盡スベシ土茯苓四十目ニ水三升ヘレ一升ニ煎ジ用ルナリ一服斯ナレバ再煎ニ不及ヤハリ常ノ釜ニテナリ吐鍋ニテナリ吐煎ズベシ一升ヲ呑得ザルモノハ水二升ヲ合ヲ八合ニ煎ジ用ベシ若シ呑得サルモノハ一升八合ヲ六合ニ煎ジ用ベシ若シソレヲモ呑得サルモノハ耳目鼻口モ破壊スルト意得ベシ世俗此病ニミヅテ發入トナレルハ五寶丹土茯苓ヲ恐ルヽ過ナリ唐ニテハ土茯苓二十二日一劑ニテ愈ルナリ若シ不愈トキハ二劑ニテハ愈ルナリ五寶丹ハ二廻ニテモ卅日七文二分土茯苓

云ハ甚タ不案内ナル夷ナリ病深重ニ及ベバ少シノ斤數ニテハ愈ルモノニテナシ然レドモ下地虚弱ナルモノハ子ガ傳來ノ五寶丹一劑ノ内ヘ韓人參二分或三分加ヘ細末シテ用ルナリ又指當ル床ニツキ長引ク楊梅瘡ハ先ツ調理シテ食事ナドモ病人相應ニ食ノ節見合用ベシ隨分ト重キ結毒モ五劑ホドニテハ愈ルナリ病人退屈セバ一劑ノ間大抵五七日モ隔テ用ベシ氣強ク丈夫ニ用ルモノハ二三劑モ立カケ用テヨシ儲土茯苓ハ上品ホドヨシトイヘドモ卑賤ノ者ニハ菜肆シヤカツラト云皮ツキアリ是レ價最卑ニシテ氣ヲ洗ヒ皮ヲモニ刻ニ用ベシ菜肆三番皮ト云モノ品ニヨリ

硬手ト云ヲ水ニ數日浸シ不殘皮ヲ仕立ルモノアリ是氣味薄ク効速ナラズソレヨリハレヤカツラヲ皮モニ刻ミ用テ適カニ効アリ意得ベシ

○猪今一ツ世間ニアリ簡差ニタル人毛間ニアリ輕粉入ノ丸薬或粉薬或嗅藥管ニテ烟ヲ裏或香ノ薬ヲ此等ノ薬ヲ一廻リ七日ト シテ用ル一兩日用レバ口中破損シテ涎ヲ流スヲ是毒氣口中ヨリ出テ病ノ根ヲ拔ク大方覺テイル左ニハアラス涎ハ脾ノ液ニテ今日飲食胃ニ入テ脾ニテ運シ十二經絡週身ヘ此飲食ノ正味吉粹津液トナリ行ワタリテ入ハ生テオルモノナリ今輕粉ノ爲ニ劫カサレテ水穀ノ精気コトゴク涎トナリテ口中ヨリ出テ十二經絡週川ヤナル故ニ瘡瘍悉ノハシヤギ五三日ノ内ニハラクト痂オチテ

テ愈ルナリ是毒氣ノ口中ヨリ拔ルニハアラズ脾胃ノ津液ヲ口中ヨリ吐一身全体カワク故瘡毛早速ニカワキ愈ルナリ金ノ毒氣ノ口中ヨリヌケルニハアラザルナリ是レ素人ノ意得違ナリ焚レモ輕粉劑モ時節ニヨリテ用ヒザレバナラヌ處アリ輕粉一錢目ヲ大抵五六分ニテニ炒上テ用ルナリ如斯スレバ菜蝕ドカラズ丈夫ナル人病火急ニナリ陰萎ナド落シトスル劑ニ至リテハ生ニテ一錢目モ用ル處アリ焚レモ是ハ止ムコヲ得ザルノ療治ナリ最初ヨリ次第ヨク療治ノ時節ヨク五云丹ヲ用レバ輕粉劑ニハ不及ナリ五寶丹ハ大抵二百日已ニテ病ニハ輕重トモニ必レモ障リハナレ子一病人百五十日バカリニレテ頃ニ一瘡ヲ

生ジ足膝痛ヲナス此行ジガタキ證ニ劑用ヒ三四日ニシテ頂ノ瘡ヨリ膿水ニ合ホドヲ出デ十二日用ル内ニ足膝ノ痛モ和ギ平愈シタリ是等ハ日數ヲ歷ズトイヘ𪜈五寶丹的中シタリ然レバアマリ遽ク用ヒヨト云事モ一概ニ拘ルベカラズ然レ𪜈最初毒發出シテ惣身ニハラリト出ル時ハ用テ即効アレ𪜈先ツ荊防敗毒散ヲ數貼服シテ後五寶丹ヲ用ベシ是至極ノ治法ナリ又瘡ノ口一處ヘヨリニナリ硬ク腫痛シ膏藥ナドヲ用テ口アキ膿水出ルモノハ毒其處ニ滯ルナリ是即結毒ナリ油斷ナク用レバ膿水オビタヽシク出デ病根ヲ拔ナリ或面部頭頂ノアタリ小キ瘡ヲ數箇所ニテハ咽管ノ吹口ホドナル漏ヲ生ジ膿水絶ヘズ甚ダ臭氣アリ或鼻ヨリ膿汁ヲ出シ或ハ陰部ノ如キ處ニ生ジ其ノ色ノ紫黑ナル疾ナリ此等ハ皆毒氣ノ結滯スル故ナリ以上ノ數證イソキ五寶丹ヲ用ベシ少シレモ遲速ノ氣遣ヒアルベカラス結毒ノ頭痛ニ解毒劑三黃湯或ハ黃連解毒湯ナド數貼用ニ及ベバ大便瀉スルバカリニテ頭痛少シモ不止ニ五寶丹ヲ用テ四五日ニ至テ痛ノ如キ忘愈タルモノ數人ニ及ベリ又世間楊梅瘡ノ後目瞤ニ耳聾ハコトアルハ輕粉劑ノ用ヒソコナヒナリ毒氣上部ニアルモノニ用ルヘキナリ此外ノ治法種々アリトイヘ𪜈通仙五寶丹此病ノ惣テクリナリ溫泉ニ時節ニヨリテ的不的アリ精ク考ベシ

消痞敗毒散　消風敗毒散

二方見諸方書

便毒下方　大黄　黄蘗　粉各二匁　川芎　當帰各二匁

右細末白湯送下

又方　山梔二箇　鹽梅中者二箇

右二味焼存性為末用巴豆二粒去油和匀前末為二服用一服得快利則止後服○便毒痛甚有二一属肝火一飲成膿也腫上微赤腫根如燒鞭痛甚者肝火也龍膽瀉肝湯飲成膿者宜内托

ニ便毒ヲ散スト膿ノ分別要論ナリ

黄蘗内托散　便毒内托劑

川芎　當帰　黄蘗各二　白朮　金銀花　天花粉

皂角針各一　甘草　澤瀉各五

右水煎○便毒血虚有鞕加味逍遥散

大元湯　楊梅瘡門方

大黄　杜仲　牛地黄　黄連　牛膝各二　猫活　秩柳　茨苓　防風各半　當帰七分　甘草二合　土茯苓十五

右水煎醫誡以此分量為一貼或為二貼或為三貼○水ノ分量ハ貼ノ大小ニヨッテ見合ベシ先ッ一廻リ七日用ルナリ儲此藥ヲ煎ジテ頭蟹霜五八霜ヲ茶碗一盃ノ煎湯ニ耳掻ニ七ッ程ヅヽ入レテ用ルナリ明日ニ雞肉ヲ味噌或醤油ヲ多クナリテ二切ヅヽ食ナリ雞肉ハ魯八切

ホゞ七日三六十切バカリナリ大抵カレハノ雞二羽ヲ肉ゞカリ白燒ニシテ置キ時ニ醬油味噌溜ノ類ラツケ炙リ服スル食禁如シ此方和方キケンボウノ類方ニノ經驗ノ良方ナリ

瘻風解毒湯 治楊梅瘡久年結毒

土茯苓二錢　金銀花　防風　木通
皂角　白鮮皮各五分

右水煎此分量經驗傳也或去防風白鮮皮加大黃川芎爲二貼或爲二貼亦効コレ本邦キケンボウノ祖方ナリ水ノ分量八三盃ラ以テ二盃ニ煎ズベシ日ニ二服用ルナリ

和劑三黃圓　服ス劑土茯苓勢天便秘結者兼用之

大黃　黃芩　黃連　等分　右細末煉蜜

即驗丹　治斑瘡或毒氣下部障服

輕粉二錢　或巴或生　角石二錢

黃芩各一錢

右糊丸以大辰砂爲衣如粟米大每服一分日三服○此四物湯加柴胡山梔一選下或以小料土茯苓煎送下丸藥分量每日可服三分凡一月計而可取勢如斯則雖粉劑無害瘡癍自愈

斑瘡數藥

馬勃草一錢　光明朱二分　右細末

一日分料 飛白麵二分半 合放五室丹五重 則全量三分

通仙五寶丹 鐘乳粉三分 大丹砂二分 琥珀五分 氷片五分 珍珠二重半

（士茯苓四十目）煎法以水三升煎二升無再煎又〇傳云服藥中斷塩味但煮昆布可食之若食不進者隨宜雖然醇酒厚味温熱物可禁之〇近來黴瘡毛食禁ナレトイヘ𪜈厚味辛熱ノ物ヲ食ヘバ瘡口膿水モ多ク爛レヤスク瘡愈ルヿ遅シ淡薄ヲ食スレバ膿水モ清稀ニレテ瘡口モ爛レルコト輕シ此事ハ病人ノ處實ニヨッテ見計タルベシ此病毒気ヲ内ニ滞テサメヤスニ最初魚鳥モ食セシメ或雞肉ナドモ用ルトイヘ𪜈結毒ニナリテハ中々食餌ナドニテ發出スルモノニァラズ却テ混熱ヲ弥盛ニテ宜シカラズ此前食事ヲ慎ムモノ多シ審ニ考ベシ

發熱疑似之間見證用薬

瘡ノ流行スルハ冬ノ中比ヨリ翌年ヘカケテ行ハレ大方五月比ニテモ行ルヽハ流行ノ年ナリ又冬ノ行ハレズ春カラモ行ハルヽ此ハ年ノ運氣ニヨルナリ運氣ノ經驗ハ外ニ書アリ先ツ此ニハ療治ノ仕方ヲ書ナリ

發熱ノ時ハ常ノ感冒ト同レヤウニ見エレ𪜈熱強ケレバ強キナリニ弱ケレハ弱キナリニ熱夕ヘズサレテサメル時ガスクナキモノナリ是ハ常ヲ語ル也又スキトサメテ又サスモアリ其時ノ治方ハ升麻葛根湯ニ加減シテ用ルガヨシ或藿香正氣散參蘇飲香蘇散敗毒散普ユ等モ初發熱ニヨ

シト云成程アレクハナレ其證々ニヨリテ若シ食滯ヲ兼タラバ藿香正
氣散嘔吐瘧疾ノ類ナラバ參蘇飲數強キニハ敗毒散或敗毒散ニ葛根湯ヲ合
方ニシテモ用ルナリ又イカフ其病ヒ兒虛證ナラバ葛根湯合四君子湯用
ルコアリ是ヲ升君湯ト云活カ心法ニ實證ニハ加味葛根湯虛證ニハ加味
參蘇飲ト入カテオイタルモ大概ナリ第一痘ニハ乾カス治方ガアレキナレバ
故モナキニ半夏ナドハ不好ナリ葛根ハ發表モシテ又潤ス藥ナレバ痘ノ
全体ニヨキ主藥ト云得ベキナリ猪此等ノ藥ハ感冒ニシテモ用テヨキ
藥ナリ疑キ内ニ用ルニ非ナレバ尖方手ノ又腰ノ部又ハ股ノ中面部ナドニ
モ二三粒モ發スルモノタト云ヒ發シタトテモ痘ヤラ何ヤラ知ヌホドニソレヨ

リ後ハ心ヲ付テ生長スルヲ見ルベシレス當歲ヨリ三四歲ニテモ知ル疑似
ノ間ニ斃ル者レバ上氣喘嗽眼瞤斜スルマツナル驚墜類スル證ノリサ
ヤウノ時ハ實證ト見ユル兒ニハ攝合香圓モ用ベシ盡ニ見ユルニハ赤
龍丹ト云ヲ用ベシ或輕キ獨參湯ニテ用ルコトモアリ此赤龍丹ハ辰
砂麝神ニ味等分煉蜜ニテ子リオキテ用ル大拔方ナリ猪曰ヲ
見ヌメ齒ヲ喰ツメテ暫時或半時バカリ氣ノツカヌコモアリ然
レモ少々右ノ通リニ痘ト才ホレキ吹出物モアラバサワガズシテ癒結
ナド用テヨシアリハテヽ灸治スベカラズ見ヌメルホドノ數ナレバ暫セテバ
サメヌモノヲ煎湯ハヤハリ見合ニアレラスベシ敗毒散ナド天麻全蝎

ナドノ入ルカ減ルカ輕ノ用ヘシ大方右ノ如キ葉ノ氣附ニテヨキモノナリ

○儲古書ニ升麻葛根湯ヲ用テ見黙シタラバヤメヨトアリ表發過テアンキトアリ然レモ是モ一概ニ守ラレヌ支モアリ中和ノ劑ハ大カ子湯ノ類ナリ又千金内托散ニテヲスコトモアリ是ハ瘕ノ形容外證ノモヤウ次第ナリ

○儲右ノ疑似ノ間ニモ虚ツヨク見エル二八輕キ獨參ヲ用ル支アリ是等ハ古書ニ見ヘヌナリ○儲發表ノ常例ハ三日ナリ然レモ變ニ至リテハ五日十日或廿日モカヽリテ癒ル支アルヲ此事ハ古書ニモアリテ予ガ經驗シタル支ナリ然ハヌトアレテ知レヌテレバニ三粒見黙シタルモノヲ見レバ成程瘕ト見エルガ時アッテ沒シ時アッテ顯レ如斯スル支廿日バカリモカヽリテナンナク瘕ニテナリタル支アリ然レバ常例ハカリニハ拘ハラレヌ支ナリ○瘕ト見ヘテスラ〳〵ト澤山ニ出ルハ重シ搖動ト下アルハカヘッテ輕キ出物ナリ其意分別アルベシ

見黙之間見證用薬

儲面部ニモ二三四五粒手足ニモ四五粒モ見ヘテ憒ニ瘕ト見キワメタルニ其色赤キニ過テハ血熱ノ心アテニテ用薬スベシ色白ク瘕形粟ノ如ク弱クテ其人ノ元氣モ弱ク靜ニテ陰證ト見ルトキハ温補スベシ其赤キニ過タルハ必其人モ躁ガシクキヨトヽキ聲高クチ足ヲ攣テ或唇舌乾

咽渇キ引飲スル者ヨホド出テ却テ没セントスル勢ヒノ見ユルハ毒多ク血斂スルニ遑ノ渋リ或ハ通又ハ通ズレド赤ク濁ルナリ此證ニハ十神解毒湯的方ナリ二三貼用ルト内ニハ諸證退ノ第一ノ捷解スルトニ重氣頭痛止シ小便能通ズルガ正面ニテアルナリサヤウアレベ瘡色モ赤過タルガヨイ位ニサムルナリサタメテ諸證退キタルトキハ消毒飲ニ甘桔湯合方ナド軽ク用テヨキナリ○色淡白ニテ全体瘡色ノ外ニ元氣モ虚寒ト見ユルニハ温中益気湯ニ人參一分二分三分或五分モ用ベシ隨分槽出シ用ベシ表モ温ニリ見ルト雖ニテモ見點スルモノヨリ是モ見點シオ、サタヲバ保元湯ノ量ニシテ用ルガヨシ肉桂木香ナドハ

ウカト長々トハ用ヒラレヌゾ○備古ノ虚實ノ二證ハ毎々驗ノアル方ナリ此二通リ當流ノ最初ノ極意ニシテ外ニハ格別ノ見訣ナシ然ルニ予ガ師傳ニ毎度此二通リニテスミヌ事ヲ見出シタリ其證ハ痘ノ全体淡白ニテ虚寒ト見ユル證ニ存ノ外其人狂躁シテ咽渇キ或瘡淡白ナリトイヘ共間ニ赤キ點一二粒毛交リ出テ全体躁シク陰陽錯雑ト見ユルハ是痘毒ハ輕ケレ共其人ノ心火有餘ニテ此證アリ此證ニハ反テ六要ノ近制清暑益氣湯ヲ用ベシ又ハ六君子ニ黄連山梔竹葉麥門冬ヲ加味シテ用ルナリ若シ虚甚キハ獨參湯兼用スベシ此證ハ予ガ師傳ノ經驗ナリ惣シテ十神解毒湯ノ證ニモ黄連ヲ加味シテ

用ル妥モアリ是ハ活幼心法ノ清解散ノ行方ニ似タレ𪜈又ソレトモ違タル処アリ所註子カ師傳ノ了簡ハ其ヘノ心火有餘スルヲ黄連梔子ノ類ニテ泻シテ心火ノ本分ヲ守ラスルトキハ痘ニ害ヲナサヌホドニ宜シクナリテ平和トナルナリ是モ治方過タルハ宜シカラス起脹ノ前ニデハ大力子湯ナドニテ見合セテヨシ大力子湯ハ大力子桔梗芍薬陳皮荊芥川芎蟬退甘草以上ハ味ナリ此方中和ノ劑ニテ十神解毒湯ノ證ノ後ニモ用テヨシ虚アルニハ人參ヲモ黄耆モ加味シテ用ルナリ又温中益気湯ノ證ノ後ハ大方千金内托散ニ加鹿茸ヲ是ハ血補相兼テ甚タ宜シ又温中益気湯ノ證ニ其當分ハ元気虚寒ユヘニ用テ効アリタレ𪜈外痘發出シテ見ユルニハ是モ大力子湯ヲ用テヨシ全体虚實𪜈ニ加味スベシ用ヨキ薬ナリ何分見點出揃ノ頃ハ此薬ヨキナリ又起脹ノ時ハ用薬ノカワルコトアリ次ニ記スナリ又此大力子湯ノ場ヲ回春ノ神効散用ル妥モアリソレハ錯々ノ医案ニテ用テ可ナリ古ニハ專ラ神効散ヲ用テ塀明タルヲ見ヘテ何レノ痘書ニモ一番ニハ神効散ナリ此補泻兼用ヒタル方故ニ百來ヨリ用ヒヨカリシト見ヘタリスベテ活幼心法ニ始メ清解散次ニ記ス化毒湯次ニ清毒活血湯ノ分ハ何レモ神効散ヨリ加味シタル方ナリ活幼心法ハ温補ニカヲ入レテ用ヒタレ𪜈清解ノ方ニハ神効散ヲ主ニシテ

兎角黄耆人參係元ヲ離レヌヤウニシタルモノユヘニ格別ノ藥毒ノ證ニテハ右ノ藥ドモニテハ届ヌナリ清解ノ方ニハ近來ノ瘡科鍵ガ至極ヨキナリ活幼心法ト瘡科鍵上両書交ヘテ施治スベシ予活幼心法ノ調元化毒活血湯ノ類ノ證候ノ藥毒甚シキニハ四味ノ黄連解毒湯加紅花生地黄又ハ生地四物湯ヲ合方ニシテ用テ功ヲ取ルコト肝要ナリサヤウノ時ハ擺ス藥ニシテ効ヲ即時ニ取ルカヨキナリ是予ガ僞授ナリ其ト云ハ躁シキガ靜リテ元氣モドウヤラ能クナリテ或寐入ルカ食ヲ好ムカ小便ヲスルカナドシテ形容ヨケレバ是其効ナリ若シ躁ガシサレキニ用ヒテ急ニ靜リ緩入リテ息モトキコヘヌホド鼾入リテタワヒナキヤウニ見ユルモ脉ヲ見ヨ必和シテ宜シケレドオコサズ寐入ルホド安腹サセタルガヨシ一時カ二時ニハ必サメテ快キモノナリ

起腹之見證用某

偖起腹ハ痘ミナク出切リテ後ニ水ヲモル哉ナリ此時モ毒毒シキハ清毒活血湯或解毒湯四物湯合方モ用ルナリ又白ケテ痘虚薄ニ用ルハ保元湯或千金内托散或内托散加鹿茸意ニ任セテ用ベシ○又色ヘ赤キニ過テモ痘ニ艶アリテ潤フヤウナルハヤハリ内托散ヨシ色赤キニ過テ艶モ強キハ必艶ナクカラクト乾キテ黒ク鮫ノ氣味見ユルモノナリサヤウナルハ前ノ主方ニテ清解ヲツヨク湯ヲ用タルガヨキナリ

癰腫

癰腫ハ入リタル水ガ化シテ膿色ニナルトキナリ起脹ト格別ノ療治モナシ

起脹サヘヨケレバ膿ニナルハ手間モイラヌモノナリ又輕キハ起脹一所ニテ格別二日ヲ建ルニデニハ及ハヌモノナリ然レ共常例ニテハ発熱ヨリ三日〳〵ト建テ來ルナリ此時モ膿ケカイナキニハ内托散ヨシ熱毒サヘ〳〵大方ガ内托散ニテヨシ虚モ見ヘズ熱毒モナキハ順痘ナリ是ニハ内托散ニ人參肉桂木香ナドヲ去リ山査子ヲ加ヘ用ベシ格別輕キニ服葉セヌモヨシ食事ニ気ヲ付ベシ然レ共出物ガ多クハ食モ進ニ機嫌ガヨクトモ内托散ヲ半當ニ用ベシ癤ハ膿ニナリ絲結痂スルナリタトヒ痘別事ナクトモ癤ニアレハ必アトガツクモノナリ女子ナドニハ順痘ナリトモ癤ニナヲ手當第一タルベシ其内裏毒ノ癤ニハ六ヶ敷モノナリ偖痘瘡解毒ニハ起脹ノ時分ヨク〳〵毒気アル方ナキカヲ見テ若シ毒氣見ヘバ一角ノ細末ヲ一分ホドツヽ用テヨシ或近來蠻國ヨリテリヤアカ渡レリ眞偽ヲ吟味シテ用ベシ解毒第一ノ丹薬ナリ若シ急ニ求ルコトナラザルモノハ赤水玄珠ノ小靈丹ヲ用ベシ亦毒気ナキ證ニハ何ニカキラズ解毒ノ薬妄リニ用ベカラズ○明吳門李聲懋本草臍云底野伽一名體亞香南海出于羅國以諸獸肉和藥所製気味甘涼無毒主治小兒百病発痘解胎毒初生時未食乳用三五厘合黄連甘草

末蜜調令服之佳又痘毒未解或小児二三歳用之預防痘毒患散癖邪而解諸毒〇赤水小靈丹　解毒発痘之聖薬治紅班黒陥不起一切危悪如服此而不見効者決無可生之理矣　硃砂雄黄各二銭乳香没薬各壹銭半大蟾蜍取心肝一尺上鹿臍香三分右細末取猪心血雞冠血丸皂子大毎服一丸〇身無大熱生酒化下〇熱甚不飲酒紫草灯心湯下即時紅活而起〇此丸若猪心血雞冠血ナキトキハ蜜丸ニスベシ

收靨　或結痂

收靨灌膿解カラ皆ト見エルモノナリ是ニテハ元気モ痘気モ表ヘ張リテ居レド此時ニナリテハ膿ノ根モユルミリ緩ガヨルナリソレユヘ此時ニアラト風寒ニ感ジ又ハ食滞ニテモ又ハ気ニ觸テモ雑證起ル事ガアルナリ此砌リ重キ古又ハ寒戦咬牙ナリ寒ミ戦モ變毒ト虚寒ノニ證アリ咬牙モ同前ナリ虚寒ニハ活幼ノ建中湯ニ参附湯モ兼用ルナリ熱毒ニハ活幼ノ加味四物散或ニ陳湯ニ黄連山梔子ヲ加ヘ用レバ多クハ治ス虚寒ノ證ニハ建中湯カヲ忘レテ用レモ不治ノ證ニナルモアリサヤウナルハ全体ノ痘重キカ或毒ニ氣内ニ残リタルカ訣ノアル故ナレバ是非ニ及バヌナリ其毒氣ノ少シニテモ内ニ残リテ收靨ノ時ニ害ガ出來ルモノナリ

落痂

痂ノ落ル仔細モナキ支ナレ𪜈是亦證ニヨリテ

○又最初ヨリ虚實ヲ医師見誤リ或毒気アルヲ解セズナドシテオクベキ物ハヲハ解シテニッ毒残リテ居レバ起臌瀉膿等ハ其ニテ救醫落痂ノ時ニ至ッテ不治ノ證トナルモノナリ又毒氣モナケレ共大分ノ出物ニテ咳嗽ニモ明キ處モナク胸膈ニモ出ルモノアリ是ハタトヒ十三四歳ニテ食気モ前ノ湯毛理會シテ飲ニ最初ヨリ隨分雜證モナケレ共濃膿ノ節出物多キユヘ悉ク膿ヲハコベズ薬食トモニ通ラヌヨウニナリテ死スル是等ハ是非ナキ天命ナリ大方十二日時分ニ變出來ルモノナリ又毒氣甚シキ證ハ五六日ノ内ニタタヲ死ス此系黑ニ變レ起臌セズ瘀血或ハ色ナル臭涎ヲ吐キ齒齦ナト瘡破リ悶乱スタタクハ難治ナリ見殺シニモノラルルニ三分モ或四五分モ度ノ間ニハ助ルモノモアリ此場ニ及ンデハ運命ノ懸ル處ニシテラ簡ニ及ビ難シ

藥方畧記

加減敗毒散　此方初發歛發擂属實者宜此湯若發擂属虚者宜用温中益気湯

依本方加荆芥防風天麻地骨皮去人參茯苓

加味升麻葛根湯　此方憎寒壯歛頭痛咳嗽鼻涕清涕者多因外感可發散體気素壯實者宜此湯

依本方加山查紫蘇川芎牛房子梔梗防風右善煎熬服取汗
加味參蘇飲 此方前證而體氣素虛弱者宜之
依本方加川芎牛房子山楂去枳穀木香
消毒飲
牛房子四錢 荊芥 甘草各一錢 防風半錢
右水煎〇一方加黃芩一錢 犀角五分 是毒重者主之
加減藿香正氣散 此方疑似之間兼食滯者宜之
依本方去半夏加山楂子 痘忌燥無故不好半夏
見點三段之用蒸法

十神解毒湯 此方已出未出三日以前痘點煩紅燥渴欲睡臥不寧小便赤澁者血熱也此湯主之此某專治身發壯熱腮赤紅臉赤毛焦色枯者宜之

當歸 生地黃 紅花 牡丹皮 芍某 桔梗
木通 大腹皮 連翹 川芎 各等分
右入燈心水煎有熱加黃連〇身熱壯盛加葛根前胡〇毒盛綿密加荊芥牛房〇渴加天花粉竹葉〇小便尿血加犀角梔子〇大便黑加犀角黃連或桃仁〇吐血乾嘔加黃連犀角〇發紅斑加犀角黃芪黃蘗梔子玄參〇小便赤加梔子〇小便短澁加豬

苓澤瀉○小便秘加檳麥滑石○大便秘加枳殼前胡大黃○煩躁加麥門冬天花粉○煩渴狂言譫語加知母麥門石膏○嘔吐加黃連豬苓澤瀉○嘔加陳皮○咽喉痛加甘草牛房子荊芥○泄瀉加豬苓澤瀉

溫中益氣湯　此方已出未出三日以前痘影淡々在皮下不紅活潑淡面色白或帶青脉亦遲緩怠倦嗜臥不思飲食形狀齡著虛寒也宜之

人參　白朮各五分　黃耆　當歸　炙甘草各三分　川芎　白芷各二分　防風各一分　木香　肉桂各三分　山查子大

右壹劑煎服一服中病即止○治氣血虛弱透毒氣不出而驚搐狂躁者或身熱雖輕至三四日而怠倦嗜臥不思飲食所出之痘影淡白點粒不明此非痘毒輕少亦是血氣虛弱透毒氣不出○初發穀疑似之間發搐屬虛者堪用

張氏逆制清暑益氣湯　此方已出未出三日以前痘影淡々在皮下或交出紅點二三粒驚搐狂躁譫語診之微細數者虛爾無寒證也此湯主之或昏睡精神不正者獨參湯兼用

人參　白朮　麥門冬　五味子　陳皮　甘草　黃耆　當歸　黃蘗酒炙

古姜煎

右件三段ノ明薬ノ法コレヲ見訣ル妙秘中ノ秘ナリ始メ二ケ條ニ見訣ヤスキ後一ケ條ニ見訣カタシ是瘡疹ノ始終全躰ニ關ル始ナリ

瘡科鍵木香異功散　寒戦咬牙（カンセンカウガ）痒瘍（ヤウヨウ）泄瀉（セツシヤ）為重（シヨウ）虚宜此湯

人參　白朮　茯苓　甘草　當皈　附子　肉桂
木香　丁子　陳皮　肉豆蔻
右（ミギ）擣末（ツイマツ）入煎服

右ノ外種々方アリトイヘドモ今補瀉ノ大端ノ薬ヲ挙ルモノナリ諸方ニ於テハ活幼心法保赤全書瘡科鍵ヲ考（カンガ）ヘシ世々瘡疹ノ説ハ證治準繩瘡疹結要（ケツエウ）ト云家書アリ此書瘡家ノ證治精徹ニシテ世々先輩ノ論ヲ述（ノ）タリ伊勢州平宗安ガ述ル所ニ平宗安ハ村上春臺院ノ門人ナリ今其書ノ要ヲ摘（ツマ）ミ予カ經驗見聞スル所ヲ參（マジ）ヘテ此門ヲ記スモノナリ

諸雑證總要

○頭疼　此有頭疼輕○日閉　初起ハ不治八九日ハ無事ナリ十二三日ハ凶ナリ○咳嗽　無事○気急　初發ハ凶八九日ハ無事○聲啞　初起ハ不治七八日ハ可治或哭泣声啞シ色錫（スズ）ノ如キ者ハ生ク暗ナル者ハ死ス痂（カサブタ）落テ後ハ凶ナリ喘急ノ兼ル始終不治傷風ノ如ク声啞ス

ル著ハ不治〇喉痛　初起ハ難治ハ九日ハ可治痂後ハ凶ナリ〇乱語
初起ハ重ク痂落後ハ凶ナリ〇心胸痛　不治〇肚痛　初熱ハ無事
痂落後ハ凶〇腰痛　初起及ヒ痘中ハ凶十四日後ハ無事〇十指
冷　不治　手搖　不治〇手足痛　初起ハ凶ハ九
日ハ無事〇手心疼　用二芍散一〇足冷　過膝者ハ不治〇眼出
血　不治〇耳出血　不治〇鼻衄　無事〇口吐血　鮮血可治
黒血不治〇尿血　不治〇大便血　可治〇吐黄水　肚痛ハ凶肚
不痛ハ無事〇吐臭痰　不治〇蛔虫　初起吐
一二條無事多則凶十三四日吐出即死便ニ出ルノ多キ者凶〇措候

初起ハ凶貫膿ノ時ハ妨タゲズ〇寒戦　初起ハ不治七八日後ハ不死
〇咬牙　初起ハ不治起脹ノ時ハ凶シ七八日ノ後ハ可治〇泄白糞
寒也理中湯〇泄紅糞　熱也可治〇泄青糞　寒也理中湯〇泄
黒糞　不治臓腑ノ壊也〇痘痂　口渇煩躁者凶〇痘痂不食者
凶ナリ
右吉凶治不治大抵如是假雖不治證盡力可治之是醫仁術也
〇脈　發熱ヨリ起脹ノ時ニ至リテハ毒内ヨリ陽ニ出ルノ候ナリ脈
浮大ニシテ數ニヨロシ沉細ニシテ遅ニヨロシカラズ收靨ヨリ以後ハ毒
外ヨリ解ス陰ノ候ナリ脈和緩ニヨロシ洪數ニヨロシカラズ此大概ヲ

云ナリ

○當世元気ノ虚實ヲ不論保元湯ハ唯痘疹ニハ定タル方ノヤウニ思ヒ主方トスルコト甚不可ナリ若シ気實ノ者又ハ順證ニテ某治不及痘ニウカ〳〵ト用レハ必害出來ルナリ是レ當流ノ第一トスル志得ナリ原此方ハ東垣ノ黄耆湯ト云方ナリ蕭山(セウザン)挂岩(ケイガン)石ノ穉直(ヂ)ガ博愛心鑑ニ此方ヲ殊外ニ称美(ホメ)上ケテ痘疹ノ始終ニ方ニテスムヤウニ云テ置タカラ後人其心得ヲ用ヒ誤(アヤマ)リテ來ルナリ尤痘ハ表氣ヲ堅(カタ)ノ護(マモ)ルガヨキ一云ニテ黄耆ニテ肉ノ元気ヲ表ヘ引出シ達(ツラ)セレメテ護ル所道理ヨケレ共順證又ハ表實ノ性質(タチ)ナドニ用テハ實(ホント)ニカユヘニ却テ痘出兼(ダシカネ)或出タルモ引込ム

ヤウニナルコトタシ此所ニ隨(シタガ)ト念ヲ入レテ元気虚ノ者ニ用ヘシ(諸何)ノ方中ニモ附子ヲ用ルハ虚寒ト云寒ノ証候(アカシ)タレカナラハ用テ應ノ効ヲ取ベシ元気ノ虚寒ニハ功アレモ一体ノ痘疹ニハ敵(テキ)某ト云コトハ世間ニハナキ云分ナリ此ハ平宗安ガ毎度經驗シタリト痘疹結要ニ書ケリ故ニ其書自見解(ジケン)ニ痘火病也ト云論ヲ設(モウケ)タリ其大畧ヲ云ヘハ痘ノ病因(イン)ハ本(モト)火病ニノ其火病ニ挂附ノ温熱ヲ用ル事ノアルハ標(ヒヤウ)ナリ參朮(ジュツ)ノ補ヲ用ル事ノアルハ元氣ノ不足ナレハコレモ標ナリ痘本(モト)火病ニメ元気ニモ不足ナク寒気暑気疫気等(トウ)ノ障(サハリ)ナケレハ不某(ナニガシ)ガ宜キナリ然レモ痘稠密(タミツ)ナルハ必元気ヲヨウチ或(アルヒ)ハ寒

藏心實主之○又云痘疹出於心驚搐亦出於心搐疹事變發則動心此理之自然云云○格致云諸瘡皆屬心火心之華在面瘡病之候但以面之部位占之思過半矣○又云瘡疹爲火火盛則痛云○又云經曰諸痛癢瘡皆屬心火○又云少陽所至爲嘔瘍瘡則痘爲火毒昭々矣云云○治療毛全体ハ中治ト意得テヨシ寒ク涼モ大攻ハ解毒湯ヲカギリトスベシ石膏ナドヲ用ルコトハ格別ノコトヽ思ヨキナリ世醫心法并ニ保赤全書ナドニハ石蒸ヲ多ク用テアルナリ故ニ此念ヲ入ルコトナリ變蒸ニテハ肉桂丁香乾姜等ヲ限トシテ附子ハ格外ノ某ト意得ベシ大抵病ヲ治スルハ臨機應變ト云

暑ノ障リアルベキナレバ其筋々ヲ見分テ防ギニ葉ヲ用ルナリ又難治ノ證ハ格別ノコトナリ痘毒本火病ナル故ニ同気相應ノ常ニ心火ニ屬シ發スル時モ心ヨリ出ツ故ニ痘ハ輕シトイヘドモ其人生質心火ノ亢ルル人ナレバ其痘毒ニ併セテ有餘ノ害ヲナスコアリ然ルニ心火ヲ瀉ノ其本位ヲ守ラシムルトキハ痘甚ナク發出ノ別義ナシ如此ニ輕キ痘ニサヘ心火有餘ノ害アレバ若稠密ノ痘ニ生質ノ心火有餘スル必難治トナル也此所ニ隨分ト気ヲ付テ可ナリ儲痘ノ心火ニ屬スルトニ云コハ珍シカラヌ云分ナレ共近比ハ此論ヲ云出スモノハ少ク唯醫書ノミヲ云ユヘニ此ニ痘心火ニ屬スト云證文ヲ二三擧ルナリ雖然綱云翁仲仁云痘出之始雖有四

テ其考ヘナレニ用ル人多ケレヒ雑病ハ其害輕シ痘ニ至テハ應変ノ考ヘヲ隨分念ヲ入テ用ザレバ必即時ニ害來ルナリ雑病ハタトヒ一且害アリテモ大方死スルニハ不及痘ニ一且害アリテハ死ニ極ルモノメタシ生死判然タル所ヲ重シメノ假初ニモウカトシタル療治スベカラズ

○儲痘全体ノ療治ハ温補宜シト云モノアリ消毒宜シト云モノアリ其外二夫々ノ説アレヒ畢竟歸一ノ論ノナキト云病原ヲヌキハメ侍ザル故ナリ經曰治病必求其本ト云予ガ師傳ノ説ハ先天懲火論ヲヒカト心ニ融通メ病根ヲ火病ト立テ置テ儲治方ハ時ノ宜キニ隨テ温凉兼施シ用ルニ効ヲ得ルモノ多シ

○儲原痘論三子ノ説ヲ案ニ予ガ師傳ハ保赤ト絡致ノ二論ノ先天懲火ノ説ヲ取ラ活幼ノ食ノ厚薄ニヨルトスラズ如何トナレバ惣体痘ノ病形ヲ察シ見ハニ由病ハ格別ノ所アリ發變三日見點三日三日ト十三日ツヽヲ以テ病功ヲ終フコレハ傷寒傳經トイヘル方ホト二著クアルニアラズ言語道斷格別ノ病形ナリ其外病中ノ禁事人火ノ淨穢生死ノ善悪一ツトシテ不思議ナラズト云コトナシ不思議餘リ多ケレバ略之是ヲ以テ考レバ明據モ無ク難測トコロノ先天懲火ノ説ガ尤ト見ユ食物ノ厚薄等ノ後天ノ害ノイタス所ニアラズ既又毋血穢ヲ食タルモノハ表ヘ出ルトキハ瘡トナリ裏ニ畜フトキ

癖積ト名ケテ別症ノ雑病ト名ケテ治方モ別ニアリテ治スルナリ若シ瘕ノ出ルトキ此血穢ノ毒アルモノカ差合セテ表ニ交リ發シ又裏ニ動ノ驚癇等ノ害ヲナスコアリ世俗ニクサニジリノ痘ト云モノ是ナリ然レトモ餘リ多クハ無キ證ナリ當世ノ医久サニジリノ痘ト云ヲカリソメニモ云ナリソレハヤハリ火毒ニテ紫黒ナト顯スヲ治スルコト不知ノ多ニシリト無理ニ目利シレテ難治ノ證トスルハ誤ナリ活幼心ニ據ラレカト取リタキ心ユヘニ先天慈火ノ說ヲ云消シレタルナリ

右痘疹病原ノ大要ヲ摘ンデ記之者ナリ

醫療手引草上編坤終

醫療手引艸後序

盛哉近來古方之學大行尚傷寒金匱肘後千金外臺等書而不敢取宋明以下本邦中古以來專依薛氏書治諸病只平々藥劑投之

白鶴濱二樹 蒲田湯溫涼


與之。竢病自愈者。京洛時醫往往
一轍轍耳。時哉。卓識豪英競起。一
洗舊習。專用寒涼攻擊。奏奇効者
不爲不多矣。而今有事補者焉。有
事瀉者焉。病客則自察之。虛弱之
病。乞治於補藥家。壯實之病。索劑
於攻擊家。於是補瀉溫涼之術。竝
行而不相悖也。嗟呼
本朝昌平日久。凡百藝術。日精月
審者實

昭代之澤也。予雖淺陋。而自弱冠
屢往諸侯之閫。或會平安東都之
醫。講究方書。日事刀圭。既四十年
矣。其數以試効。撰此書。記以國字
者。海內幽僻乏醫之地。資以施治。
或庶幾可免夭折之患爲是篇先
人遺命。而松梅院序文所述。所以
誓於
聖廟也。若夫議當時醫風者。我豈
好辨。不得已也。實不顧僭踰。記以


述其志耳

寶曆甲申孟春皇都盛塘滕懿之

於三河國府主篤菴中謹書



眞證



每部須認
此圖記

明和三丙戌年開版
明和九壬辰年再版

浪速書肆 心齋橋南四丁目吉文字屋
高麗橋一丁目角藤屋
鳥飼市兵衛
淺野彌兵衛

烏巢先生著
醫方捷徑 未刻 二冊

傷寒通玄類證 刊行
金匱通玄類證 撰註 未刻 一冊

醫療手引草 中編 二冊 刊行
病家示訓 增補附錄 未刻 本邦老醫述 一冊

同 下編 刷出 二冊
方的 的効方 附六經證治綱領 各病諸診 刊行 全一冊

同 續編 各門方旨 刷出 全部六冊內二冊出來
張氏醫通簒要 全一冊 未刻

同 別錄 冊
合刻 治痢經驗 全一冊出來 附 和韓人參考 增補

和韓漫考 後編 附家授切紙傳 一冊 未刻
治痢經驗內經金匱論丹水子友矜等方考痢疾試効治論等詳記錄之也

六八本草 中山氏片玉本草顯書 全二冊
和韓人參考 稻若水之論并會朝鮮醫而正諸家掌語指韓參唐參和參品類等悉擧以備參明之也

烏巢先生著
醫方捷徑 未刻 二冊
傷寒通玄類證 刊行
金匱通玄類證 撰註 未刻 一冊
醫療手引草 中編 二冊 刊行
病家示訓 增補附錄 未刻 本邦老醫著 一冊
同 下編 副出 二冊
方的 的効方附六經證治綱領 各病諸診 刊行 全一冊
同 續編 各門方旨 副出 全部六冊內二冊出來
張氏醫通纂要 全一冊 未刻
同 別錄 冊
合刻 治痢經驗 全一冊出來 附和韓人參考 增補
和韓漫考 後編 附家授切紙傳 一冊 未刻
治痢經驗內經金匱論丹水子友松子方考痢疾試効治論等詳記錄之也
六八本草 中山氏序 壬本草顯書 全二冊
和韓人參考 稻若水之論并會朝鮮醫而正諸參 掌語韓參唐參和參品類等悉 縣儒弁明之也