


合類增補衆方規矩


延寬

永原了の増撰
山田昌殷校正



研医会図書館蔵和漢書整理票	
書名	合類増補象規矩
撰・編・著	永原了の撰
記述・筆録	山田昌殷校正
原本年代	
再・復刻年代	延宝4年 1676年
写記年代	
卷・冊数	6卷6冊
刊・写	刊行本
形態	縦13cm 横19cm
登録番号	原簿第 頁
備記	





合類增補衆方規矩卷之一

永原了の増撰

山田昌殷校正

中風

二 八味順氣散

治中風先服此

藥以順其氣次用治風之藥

伽藍 苓 童 芷 陳 葵

參 絡 二 坤 介

右煎服○或加星蜜以攻痰氣

○或痰盛加守仁姜片○氣厥

者與中風相似何以別之風中

身濕氣中身冷先以此湯

按有四君子湯補脾胃中氣

藥也並去手陽明經風發通



腎胃間氣陳理肺氣童泄用
氣若風在手陽明而肝肺腎
胃之氣實者專可用之○卒
倒不知入事痰涎壅盛癱瘓
不仁舌強不語與此湯間求
驗○卒中風醒後七氣佛醫
而手足厥或癱瘓痺痛者亦
間得奇効○或語云一切臂
病氣弱者效也又云諸病共
有少眩暈者用之
補一方去
苓陳加定泉水瓜○老人加
餘芍斤沙

三烏藥順氣散

治卒中風手足

不遂言語蹇澁四肢骨節疼痛

肩膊麻痛筋脉拘攣及脚氣步
履艱辛婦人血風老人冷氣

麻 蘇 陳絡二 蘇
薑 枳 桔絡一 永炮甘牽

右入姜棗煎服○寒熱頭痛加
葱白○身軀不能屈伸為未溫
酒調下○癱瘓抽之成瘡薄苛
煎湯調下○中風一身俱麻加
參伽斤門○久癱瘓去麻加定
芸差守星蜜斤○口眼喎斜加
連差芸荆瀝姜汁○遍身痛加
斤官乳沒○臂痛加差芸官苓
蘇○背心痛合行氣香蘇散加
蒼守苓○脚膝浮腫加膝搖佳



○腰痛加膝伸曲○眼眩加細
茶○四肢冷痺加附官○婦人
血風加芸芎荆○胸膈脹滿加
實我○虛汗去麻加苈○潮熱
去水加苓○二三年不能行合
獨活寄生湯○拘攣加瓜解○
濕氣加蒼伽栝○心腹刺痛加
苗○手足不能起床加續命○
陰積浮腫合五積散○臂痛因
風者或乳婦以臂枕兒傷於風
寒而致臂痛者宜此湯○白虎
歷節起注骨節疼痛加瓜沒方
○四肢冷痛加附官
按卒中風先用八味順氣散

六七貼以順正氣次與此湯
以可順表氣○中風口眼喎
斜或肩膊及背麻痺不仁或
脚膝痿弱或言語蹇澀皆宜
此湯○臂麻冷起手甚難五
積散合九芎湯未效則此湯
加羌瓜而安○乳婦以臂枕
兒則其臂麻痺不仁疼痛若
因風者宜此湯若因寒者宜
五積散

三

防風通聖散

治中風一切風

熱大便閉結小便赤澀頭面生
蒼眼自赤痛或熱極生風舌強
口噤或鼻生紫赤風刺癢疹而



為肺風或為風厲而世呼為太
風或勝風而為痔漏或腸管而
為諸熱譫妄驚狂並皆治之

芫 斤 片 虎 芒
翻 藜 麻 荆 伽 丹
酪半鬱 楷 芥 酪 滑 兩
一方去芫加藤參守

右入姜煎○自利去芫虎○自
汗去麻○飲酒中風身熱頭痛
如破加葱白○咳嗽喘急加守
桔菀○耳鳴因酒過加柴枳桔
童星荊○癩疹通治如身疼加
蒼差○痰嗽加守○一切大風
癩狂加嬰地牡○兩耳聾者厚

味動胃火加酒煨虎○膽移熱
於腦則辛頰鼻淵加苛連○頭
癩偏腫連一目如半蠶其脉洪
大此風乘陽明經氣血俱多風
腫去芫虎加姜葱豉煎服取汗
以草莖刺鼻中出血其腫立消
○治風熱瘡疥癬久不愈○瘡
頭瘡用本方為末酒浸燂乾凡
三次食後白湯調服日三服至
頭有汗效○小兒身常發熱風
斑及脚指紅腫去芫虎加連
為末服

按此方雖古法用表裡客熱
三焦實火而其實火用黃連



解毒湯腸胃實熱用大承氣
湯風熱症專用此湯○或語
云春夏專用通聖散秋冬專
用五積散見中寒是乃時令表裡之
方也○狂亂症解毒湯不效
則用此湯此湯若不效則備
急圓也○打撲者倍片虎
加紅沒○疥癬楊梅瘡瘡良
久者用此湯間有驗補小兒
諸風潮搐急慢驚風大便閉
結邪熱甚甚腸胃乾澀寢汗
咬牙目睛上竄睡語不安傳
筋驚悸肌肉蠕動每一兩加
虎一錢一錢調苓末一錢○肌肉

蠕動者調羌活末一錢經曰
肌肉蠕動命曰微風○癰疽
惡瘡腫毒本方一兩倍堯斤
加連一兩匪一兩參一兩密一兩堯一兩銀一兩牡一兩各半
兩名勝黃飲子如瘡在上加
沂○發斑熱本方一兩加連
五錢○痢後鶴膝風良驗

四小續命湯

治卒暴中風不省

人事半身不遂口眼喎斜手足
顛擗語言蹇澀肢躄麻痺精神
昏亂頭目眩暈痰涎壅盛筋脉
拘攣不得轉側及脚氣緩弱不
能動履屣僻諸風服之皆驗東
垣曰中風自汗者不可重發其



汗故此藥亦不可輕用也

芩 半 麻 離 桂 苓

附 芎 芎 參 苓 一

附 甘 苓 半

右入姜棗煎服○精神恍惚加

麻 遠○骨節痛有熱倍芎去附

○心煩驚悸加犀○骨節痛有

寒濕倍加桂附○嘔逆腹脹倍

參加守○燥悶大便澀去附倍

芎入瀝○臍寒下痢去離苓倍

附加木○自汗去麻杏加木○

脚膝酸加膝解○身疼加朮○

腰痛加嬰仲○失音倍杏○中

風無汗惡寒加倍麻芩杏○中

風有汗惡風倍加枝芍杏○中

風身熱無汗不惡寒加雷膏去

附○中風身熱有汗惡風加葛

官苓○中風無汗身涼倍加附

加永○中風有汗無熱倍加桂

附芎○中風肢節攣痛不仁加

羌翹○治剛柔二症之通用也

○產後中風脚氣最為要藥然

手足攣攣者當去附

按不可用多汗者大抵身冷

或四肢厥冷而拘急不仁者

宜○一婦二十餘歲產後三

十有奇日腰足冷腹瀉甚膝

酸不伸脉沉遲加附得奇效



大秦朮湯

治中風手足不遂舌

強不能言用之養血則筋自榮

羌活 獨活 黃芩 石膏 芍藥 甘草

細辛 附子 地黃 茯苓 白朮 白芍

右煎服○天陰雨加生姜○春

夏加雷石○心下痞滿加實和

○治血弱陰虛不能養筋筋燥

而手足不能運動指爪乾燥屬

風熱甚者

按此方榮血養筋故脈浮大

數而四肢麻木肌肉稠動則

三歲內當發中風是其為養

生專用也若脈微細者回春

養榮湯可也○俄手足痿腰
不立舌軟不能言者不分左
右專用之也

六加減除濕湯

治右半身不遂

手足癱瘓筋骨疼痛

仰二升 芍藥 斤 赤芍 陳

守 菖 連 苓 藥

枳 羌活 一升 芍藥 芍

桔 共 廿餘 八

右入姜煎服○身痛加羌黃○

足痛加膝離歲

按治氣虛與濕痰兼以久手

足癱瘓者也予連年試此方

一應癱瘓不相應矣久守專



要也次方亦然

加減得燥湯

治左半身不遂

手足癱瘓口眼喎斜頭目眩暈痰火熾盛筋骨時痛
頭痛心悸

涉仁斤蘇芎 伽 苓 星

守 定徐陳塩 蚘 芡 酸

冷 膝灸 羌 嬰 芸 桂

絡大紅 甘絳 酒紅

右水煎入瀝姜汁服○手不遂

倍加芩桂○足不遂倍加栝

按治因血虛與瘀血而久手

足癱瘓者也若久左右手足

皆癱瘓者血氣兩虛宜十全

大補湯 方見前

領氣散

治腰腿疼手足不能

屈伸半身不遂口眼喎斜風氣

中風中氣用風藥而十無一愈

即服之見效

伽細 葵 定徐 參 梟 芷

童 甘棗 藜 瓜 各三分

右入姜棗煎服○心脾疼加苓

守絡 陳蜜 羌 一入姜煎服

半日效

按中風症風藥不效則此湯

合二陳湯數得奇效又腰腿

痛者亦得尚可有加減消息

九

養榮湯

治中風血脉四支



不舉口不能言及痰迷心竅不
省人事舌強不能言語痰涎纏
盛口眼喎斜半身不遂

介 芍 芍 地 薺 薺

洞 葛 麥 卷 連 芸

凡 匿 守 麩 麩 甘

各等分

右生姜三錢一水煎服為丸用亦可也

按風中血脉者外無六經之形證內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言為在中也

十三生飲

治中風昏迷痰涎壅并口眼喎斜半身不遂

星 錢 川 烏 附 各 一 蜜 五 分

右水煎服○去烏名星附湯脈

沉無熱者宜服

按此方治一切風痰氣厥不省人事初作者通治之劑

貝母瓜蒌湯

肥人中風口喎

麻木左右俱痰世用之

貝 蕒 麩 芥 芸 羌

槲 芬 連 伽 貴 桂

歲 守 花 甘 各 等 分

右入姜水煎服

按此方治中風口眼喎斜者調理之劑

愈風湯

治一切風症卒中初



中中腑中臟及藏府俱中已上
數者先宜本病藥治之後用此
方調理

參一錢 同 苓 貴 守各
二一分 一錢 芎八分

芸 羌 各七分 芍 二分 甘 三分

右入姜棗水煎臨臥入瀝姜汁
磨蜜調服

按中風症內邪已除外邪已
盡當服此藥以行導諸經

加味大補湯 治左右手足皆

癱瘓

桂 參 加 苓 解 芎
芍 干 泉 附 蜜 各三分

薏 儻 桂 瓜 芸 羌
搖 蕙 各五分 桂 甘 各三分

右入姜棗煎服

按左右手足皆癱瘓者此血
氣之大虛也宜用此方

補類中風

四十

附子理中湯

治中寒厥倒

附 朮 吳 桂 參 斤
貴 枳 加 甘 灸

右入姜棗水煎服 冬月卒中
寒氣昏冒口噤肢攣惡寒或口

吐涎沫重則四肢強直則先用
此湯若不急治則舌強囊縮而

死矣



木香順氣散

治中氣運倒

蜜

砂各五分

麥 苳 薑

貴

守

檟

奴各一錢 桂

糲

甘各三分

右姜片水煎○氣不轉者加泉

蘇子

按此方由七情過極氣厥昏
胃或牙關緊急者宜用之或
宜藿香正氣散

加味二陳湯

治痰運倒

貴

守

苓

斤

洞

利

杏

良

砂各七分

蜜

桂

甘

各三分

右入姜棗煎○氣逆加蘇○元

氣虛男去洞

按此方因內虛受寒痰氣阻
塞手足厥冷麻痺眩暈欲倒
脉沉細者宜此湯

加味四物湯

治血虛眩暈卒

倒不可艾灸驚哭叫動動則乘
虛而死矣

斤

芎

芍

地

苧

檟

參

伽

貴

苓

朮

甘

右棗二枚烏一筒水煎○飽悶加苳

砂去檟伽

按此方因平日去血過多虛
而成血運脉微瀋者宜此湯



加味六君子湯

食厥者過於

飲食胃氣自傷不能運化故昏
胃宜此湯

參七分 伽 苓 貴 守 各一
分 一錢 蜜 砂 各五分 其三分

右入姜片三棗二枚水煎○又宜行
氣香蘇散加蜜童查方見傷寒

凡中卒倒口噤不能言目不
識入四肢不舉等症多者飲

食過度變為異常必須審問
明白

補中益氣湯

治氣虛卒倒方見

傷
中
內

傷寒 附傷風虛煩

香蘇散

治四時傷寒感冒頭

痛發熱惡寒及內外兩感之證
春月宜用之探病

滋 蘇 各二 陳 一 甘 半
办 办 办 办

右入姜葱水煎服○頭痛加芎

芷名芎香蘇散專治氣虛頭

痛○頭如劈癢加膏葱○偏正

頭風加細苛膏○太陽穴痛加

靜膏傷風自汗加枝傷風無汗

加麻葛○惡寒加蒼○發熱加

柴芩○寒慄加枝○虛熱不退

加參○潮熱加參芩○咳嗽加

楷會○咳嗽不止加守杏○鼻



寒聲重唧唧不和加桔○胸膈痞塞加枳實○氣促不安加腹桑○嘔吐惡心不止加喬守○飲食不化加破童○腰痛不能屈伸加官嬰○腹肚痛加蜜○脾寒加良薑○水瀉即脾泄加藿行○瘧疾加枳實○瘧痢加枳連去井○久瀉加蜜訶○身疼加芍官○心氣痛加索發苗○感風寒發熱頭疼合不換金正氣散○感寒頭痛壯熱惡寒身痛不能轉動合五積散又或合敗毒散○風濕脚氣加枳瓜各一 疎通氣道各之 損蘇散

○春夏氣溢腫而癩加五加瓜 枳鈴○濕氣周遊脚膝痛加忍蜜芍○疝氣偏墜疼痛初發增寒壯熱甚効加蒲蜜稜莪通○內傷飲食外感風寒夾食夾氣膈脹滿肚腹疼痛頭痛身痛發熱加發芎麻枳莖名 邪氣香 散因濕又加蒼外感風寒又入姜葱內傷飲食又加查曲○小兒傷寒夾食夾驚馬四時瘟疫瘧疾加童葛各 香葛散○婦人一切氣作痛或上癩心膈或攻築脇腹中結塊發濕刺痛月水因之不調或眩暈嘔吐往來



寒熱無問胎前產後益皆治之
加參二久永一煎服謂之正氣
天香湯

按此方散氣快氣之劑故耳
鳴頭聾或頭痛眩暈或咳
嗽痰熱往來或癰寒多熱少
或內寒外熱或寒熱相半或
骨節痠痛臍腹作痛或水腫
上氣喘嗽面目浮腫或浴溫
泉中風氣遊上而面赤頭痛
等皆治之○過酒之人其酒
毒支胸或嘔或吞酸加喬衍
○若治酒積加藜蘆或此
飲喬○脚氣不腫而痛者氣

痛也加枳瓜○小兒痘疹味
成加升葛○婦人足冷上氣
或姓婦四五个月而腰下浮
腫皆與本方得奇驗○巖咬
而發熱腫痛加連苓丹
一人頭痛咽乾或胸腹脇痛
不止合升麻葛根湯取驗亦
來治數百人故名之香葛湯

參蘇飲 治四時感冒發熱頭
痛咳嗽停飲中腕疼滿嘔吐痰
水寬中快膈不致傷脾一切發
熱及內傷外感諸般咳嗽痰喘
或欲成勞瘵並治

陳 苓各一 守 圖



西 齊各一 枳九 牛五 參

蜜 二味減半若新 病不用亦吐

右入姜棗水煎服○初咳嗽加

桑杏○久嗽加會梅○口乾加

門瑞○嘔逆加藿砂○脾泄加

蓮扇伽○頭癢加芎細○若感

鬱惡寒無汗咳嗽喘促傷風無

汗鼻塞聲重咳嗽益加麻杏○

肺多有熱加杏芩桑梅○肺寒

咳嗽加會承○心下痞悶或胸

煩熱或停酒不散或情雜惡心

加連實倍用葛陳○胸滿痰多

加薑○氣促喘嗽加雷貝○衄

血加梅門芩○心盛發熱加柴

芩○咳嗽吐血加升桂地○勞

熱咳嗽久不愈加雷貝門○衄

癢傷寒去守加菘○陰虛痰嗽

或吐衄合四物湯名**茯苓補心**

湯○瘡疹但覺身熱似傷寒疑

似未明宜用之○痘疹冬寒甚

初見紅斑不能發起者亦用之

按四時咳嗽風痰胸痛宜用

乏不傷脾胃進飲食順氣殊

感冒發散之方也常去參蜜

而用何者參入手大陰肺經

為火見雜著心盛者去蜜見

必用故新病去一味加芩柴

可退內外熱也雖然久病衛



氣虛則加參宜順氣也心氣
弱則加蜜宜連氣也○表熱
甚加蜜則間有斑點故他家
必去蜜也○傷寒七八日熱
入裏妄語口乾脈數雖與解
毒涼膈等而無驗故此方加
芩連而與則表裏熱退便通
而愈○衄血七日面赤他癆
無驗予診脈浮數故加芩密
側冷而五貼全安○瘧疾患
於旅途熱多寒少兼咳嗽故
加芩羌得奇效○喘促痰盛
喉中如水雞加香會○勞嗽
無汗潮熱五心煩熱加蘇○

小兒有痰嗽而驚風初發可
也虛弱加參或感冒發熱頭
痛痰嗽喘促痞悶專用之
一男三十餘歲咳痰泄瀉晝
夜四五行口乾胸苦肌熱去
穉枳加婁伽而取驗

茯苓補心湯 治男婦血虛無

汗潮熱咳嗽無顏色或心虛為
邪氣所傷吐血或心氣虛面黃
瘁血虛潮熱五心煩熱無汗欬
嗽唾血或婦人心胸嘈雜或婦
女經水不調吐血咳嗽發熱口
乾喘急胸膈痞悶嘔吐痰水或
婦人云血過多或氣逆心悶月



水不斷或女子血虧有汗朝熱者亦宜用之

按血虛而胸跳或咳嗽怔忡咳嗽吐血或虛勞潮熱或勞熱如瘧或心氣不足面黃肌瘦五心煩熱或咳嗽唾血或有汗怔忡或嘈雜或周身血斑此證多或產後失血眩暈或婦人惡阻或小產可也

霍香正氣散

治四時不正之

氣寒疫時氣山嵐瘴氣兩濕蒸氣或中寒腹痛吐利中暑冒風吐瀉中濕身重泄瀉或不伏水上脾胃不和或飲食停滯嘔逆

惡心胸膈痞悶或頭疼發熱熱無汗者

藿香 陳 佛手 枳 寧 各二 腹 麩 藜 各 錢 半 錢

右入姜棗水煎服

○霍亂轉筋

加瓜 〇腹痛加芍 〇寒痛加官

〇冷甚加永 〇飲食不化心下

痞悶加荜砂 〇米穀不化加曲

芽 〇肉食不化加查 〇心下痞

加洞童 〇中暗冒風加蕭扁 〇

時氣憎寒發熱加柴葛 〇發熱

加門竹葉 〇口渴小便不利合

五苓散 〇心腹絞痛加木 〇若



癡欲登閣不通加機○寒濕相
搏霍亂轉筋煩渴悶亂合連薤
散名之一香散○感風寒內傷
飲食霍亂轉筋吐瀉合五苓散
轉筋不止男以手挽其陰女以
手牽其乳此千金妙法○夏時
受涼傷外又飲食生冷傷內頭
痛身熱惡寒或腹痛吐瀉若外
感重去伽加蒼卷若內傷重加
宿曲○林曰尺厥飛尸卒厥此
即中惡之候因冒犯不正之氣
忽然手足冷肌膚粟起頭面青
黑精神不守或錯言妄語牙緊
昏不知入頭旋暈倒此是卒厥

容忤鬼擊吊死及入廟登塚多
有此疾以藜合香丸灌之俟甦
以藿香正氣散加蜜星殊驗
按霍亂主方兼內外有譽也
殊治山嵐瘴氣之第一也○
霍亂嘔逆去芷加守姜汁最
霍亂吐瀉腹痛者必用之○
四時感不正頭運昏惡寒
發熱專用之○夏月泄瀉或
傷食濕瀉俱以兼腹痛者亦
宜○七情過極逆氣連倒此
名中氣亦宜○溼身拘急憎
寒喘嗽頭目昏重加玄杏搥
梅得奇効○出遠方治心腹



脹滿此方專調榮衛利三焦
行痞滯消膨脹○腸胃受濕
下血不止加連梅有奇效○
癰疾初發無汗用之則必發
汗而愈○傷寒感冒頭痛發
熱而無汗亦可也○寢間風
入於口鼻中太陰則咽痛多
此方主之○飲酒而傷風發
熱或吐逆亦宜

人參敗毒散

治瘟疫四時通用

卷之四
圖 參 各 等 藥
右人參水煎服此藥治傷寒瘟疫
風濕風眩四肢痛倍

壯熱強喘咳不問老人小兒
皆可服或嶺南瘴癘或卑濕之
地脚氣痿弱此藥不可缺衆人
病一般者加葛為妙○傷寒頭
疼身痛頂強壯熱惡寒口乾心
中煩熱加芩○傷風鼻塞聲重
咳嗽吐痰加守杏○頭目眩暈
屬風熱加守定○眼目腫痛障
風寒所感加芸荆歸尾赤芍去
參苓○酒毒發熱作渴加葛連
○瘧疾不問先寒後熱先熱後
寒頭疼身痛加蒼葛果換○風
熱濕毒腰痛加續定苛瓜○風
熱入太腸下血不止加桑葉梅



姜兼有血加門若因酒毒加
連○足三陽經受熱毒氣流注
脚蹠上嫩赤腫痛寒熱如瘡自
汗惡風或無汗惡寒加蒼○皮
膚癢痒加蟬○熱而紅腫加
蒼○大便實加虎○風熱上壅
咽喉壅塞或痛或不和生瘡或
如肉腐痛妨悶加芩守翹倍加
桔時行瘟疫下利赤白發熱口
乾身痛加倉米連姜棗名倉廩
○噤口痢加倉米蓮○痢後
手足痛加瓜枚○臂痛冷起手
甚難透合五積散名艾加散加
瓜藤姜棗○諸般瘡毒腫痛或

癰疽疔腫發背乳癰疔瘡等憎
寒壯熱甚者頭痛掬急似傷寒
加芩芩翹忍去參名刑防敗毒
○身生瘡膿血昏腫極痛且
痒或風熱積毒發於面頭手足
如胭脂色加葛赤芍升定蠟散
門名平血飲○小兒急驚風
初起發熱手足攢攢上竄天吊
胎弓反張金一切感冒及瘡疹
欲出發搖加定全蝎蚕附錄○
瘡疹癩似三日發熱加芩荆定
錄去參芩

按病人氣實者去參若氣弱
難運藥力者加參○四時不



正瘧疫熱毒鼻塞声重頭面
腫痛加參芩姜○頭痛甚者
加蘇○如心經蘊熱口舌乾
燥加芩○傷寒頭痛發熱惡
寒半表重半裡輕者宜用之
若牛表牛裏○無名腫物赤
則宜小柴胡○而癩所有發熱世俗謂之風
毒腫若熱甚加芩可也
麻葛根在○外移腫物貼藥
下宜敗毒○故毒氣不出而周身浮腫者
宜用此湯○一鄉患痢世俗
謂之腹疫病加粳蓮○熱痢
與訶行則雖痢止而熱不退
此湯加三黃或芩宜解散其

藥毒○勝風下血及遊血亦
得驗○風眼目赤多血者用
之若甚腫痛加三黃或芩連
亦可○下湯風呂等風中浮
血故赤遊出甚痒加斤芩或
伽芸荆蒼芍地亦宜傳謂之
加六散毒散此方宜用癩疹
○癩風因風濕者百節痛者
脚氣痛處煩熱者俱得奇效
○癩氣有內難發出與此湯
則悉發出又因加棧內消亦
可○太頭瘰病項面腫及咽
痛加於連○小兒急驚風加
白附蚕○小兒疳則口眼疔



神隱少腫與此湯得數奇○
痘疹序病甚發熱與升麻葛
根湯其熱不去故此湯加紫
草有奇効○一人冬月患刺
無熱腹痛與芍藥湯不効故
慮感風濕為劑與此湯得奇
効○或曰鼠咬加貝○凡欲
與此湯者先試口氣熱或骨
節痛而可也

神本方加升芍地加芸假精
名**神傳敗毒散**治斑疹○夫
桔苓參加芸芥升葛赤芍止
加名**加減敗毒散**治天行瘟
疫頭面腫盛咽喉不利舌乾

口燥憎寒壯熱時氣流傳
愚按謂病人氣實者夫參者
此偏見也人參敗毒散去人
參是古人名方之意似相乖
矣可考嘉言父醫門法律

升麻葛根湯

治傷寒頭痛時

變憎寒壯熱肢體痛發熱惡寒
鼻乾不得眠兼治寒暄不時人
多病疫乍煖脫衣及瘡疹已發
未發疑似之間宜服

葛三升 芍 各二

右入姜煎服○頭痛加葱○咳
嗽加桑○上膈熱加芩芩○無
汗加麻○咽痛加桔其○發黃



丹毒加茲○癰疹者紅點如蚤
蟻之狀宜此湯○小兒傷風身
熱頭項強自汗表不和加苓○
瘡疹一見苗不可服慎之○冬
月加蘇八○四肢厥冷加棧
半○腰痛當知是痘加枝
○時氣發熱太甚乃毒氣盛加
力半

按治癰疹最上方也○八九
年已前六七月間天下人民
多患紅斑摩之則當手不痛
不痒頭痛發熱惡寒合麩腹
散二三貼而皆愈尔以來逢
此證則立得奇効矣○當世

人多患小瘡甚痒故合麩腹
散而與之則俄沒然發痰喘
心腹強硬起而死矣遇與不
遇勿履覆輒

補表熱加薰○內熱加黃芩
○熱甚加樨連或加翹花○
大便硬加樨鹿○頭痛加芎
○身痛加羌○胸膈痞悶加
利○咳嗽加杏○有痰加守
○發斑加茲如老人去考加
柴苓參

不換金正氣散

治四時傷寒

瘟疫時氣山嵐瘴氣寒熱往來
嘔吐瀉下痢赤白穢出遠左



不伏水土者宜常服之

蒼朮 陳 守 鬱 甘

右入姜棗煎服○頭痛加芩芷

○感寒腹痛加姜官○瀉熱加

柴芩○嘔逆加喬砂○口燥心

煩加柴葛○氣壅加稜枳枳茵

○冷瀉不止加木訶衍○熱極

大便不通加虎芩○瘧疾加恒

枳果○腹脹加菘枳○痢疾

加連椒去其○胸脇脹滿加實

砂莪○咳嗽加桔杏會○喘急

加麻戟桑○兩足浮腫加瓜腹

佳○身體痛加麻枝赤芍○濕

症聲啞加芎○寒症聲啞加官

○腸胃受濕下血不止加連梅

○小兒感冒風濕頭目昏重時

發壯熱宜此湯○傷濕重者骨

節疼痛漸漸咳嗽加瓜

按平胃散加藿守之方也是

乃辟瘴之劑故遊宦四方水

土不伏或旅途中可服未病

之先也○伊勢參後海狗

帶血腹痛心張加涂冷蜜換

○旅後增寒發熱上吐下瀉

兩腿痺四肢未冷無汗口渴

去淨其加葛喬砂○四十

餘自下血不止加芎芩連五

貼而愈○新久諸瘡加柴芩



藍苓澤枳果梅

補同春加滋砂各加減正氣

散○渴加加藟烏炒米○腹

痛加蜜荷○飽悶加益腹○

發腫氣喘加軾雪翁猪腹去

耳○小木短赤加翁猪梳木

去守其○內寒手足冷脉沉

細加永桂

十補湯

時令不正感疫妄行

或感冒發熱憎寒頭痛身痛無

汗或欲出疹此藥不脚陰陽兩

感氣治之

麻 葛 鹿 藜 蘇 藜 赤 妙

藜 蘇 陳 藜 甘

有人姜煎服○發熱頭痛加葱

○中滿氣實加枳○心腹脹滿

加實字○潮熱加芩門○咳嗽

喘急加桑桔守○大便閉加虎

芒○嘔吐加藿守○泄瀉加木

其○瘧疾加果枳○痢病加枳

連○腹痛加芍○發熱頭痛加

細膏○飲食不進加砂○嘔

逆加香果○衄血不止加梅葛

○疹毒加官參苓

按此方芫芷香蘇散合升葛

湯加麻故專要在麻黃一味

矣○感冒風寒者發熱惡寒

咳嗽頭痛甚而無汗者宜此



湯○傷寒否熱久不退也汗
 不出口乾頭痛是斑可出之
 證即與此湯間斑出而熱退
 也是乃醫術有功者所為矣
 予蚤歲頃見一病人其證壯
 熱久不退且無汗口乾頭痛
 故與參白虎湯則一二劑而
 死天刑難遁者也○東莊療
 婦人頂筋強急而腹脹去麻
 加蒼得奇效尔以來有數奇
 小柴胡湯 治傷寒四五日往
 來寒熱胸滿脇痛心煩嘔吐頭
 疼耳聾大便秘澀此在半表半
 裏也

柴二各 枳 參各 一 守八
 半 半 半 半 半 半

右入姜棗煎服○小使難潮熱
 腹滿加苓○下後陰虛生熱
 脉微惡寒去苓加芍○腹痛亦
 然○嘔而發熱胸脇滿小便不
 利去苓加芍○飲水過多
 成水結胸去棗加芎○往
 來寒熱咳嗽胸脇痛去參棗加
 會永各半○渴甚去守加參
 粳○身熱不渴去參加枳
 ○心中飽滿加枳桔○心下痞
 滿加連實○夜靜而晝發熱者
 熱在氣分加丹連雷錄○晝夜



發熱者熱在氣血之分合四物湯加連丹○下痢身熱挾外感者必惡寒發熱煩渴身首俱病此在表去參棗加蒼芎陳赤芍姜得微汗愈○傷寒陽症欬逆潮熱加陳茹姜○伏暑發熱汗澀暑入心胞不語加苓○瘧熱多寒少或單熱頭痛胸滿咽乾宜此湯去守加參括○瘧發寒熱作渴病在表裡陰陽不分者食五苓散名柴苓湯○無汗加麻○有汗加葛○寒多加官○熱多加芩○口酸而苦者肝膽有實熱加游童耳○如膽熱而

口苦者謀慮不斂也去芩加酸錄遠○吐酸飽勞而後大怒觸動榮血致吐血者加二門○灸後發熱煩悶加龍骨牡蠣○產後惡露下然斷絕寒熱往來晝靜暮劇語言狂亂如有鬼神此熱入血室而顛狂加地○產後虛羸寒熱飲食少腹脹加陳芎芍姜棗○小兒感寒發熱或作瘧宜此湯○痘疹出不伏身熱甚者加地○傷寒百合病加雷百合茹梗○本方去參其加芍虎各二實一入姜棗煎服

答之 **大柴胡湯** 治傷寒十餘日



不解大便不通身熱煩燥辨言
妄語此乃攻裡劑故以和為度
加身體疼痛者表證未解不可
服之○倍加芍虎各敷和湯治
腹痛大便結小便澀飲冷以
手按之痛轉甚手不可近或兩
手熱腹脾熱

按大柴胡散和宜實證不宜
虛證小柴胡傷寒和解之劑
也○夏月發熱煩渴小水不
利兼傷寒陰陽不分疑然之
間者去芍加門會連○下痢
赤白腹痛身熱加芩芍○如
新惡寒亦得○熱嗽發冷水

而暫止者加桑杏○煩熱加
門○噤臥減食加木○欬而
寒熱往來去參加會永○寒
熱不調作腹痛去芩加芍○
俄手攣而頭昏胃合香蘇乾
酸發耳中○灸後發熱煩悶
加連丹得奇效○陰囊濕痒
加痰童此乃通脈經故也○
男婦口苦兩脇脹或痛加連
丹○大飢發熱大食傷胃已
成黃疸其候食則腹滿眩暈
或心中佛膈不安加實朴丹
○婦人傷寒經水適來適斷
發熱惡寒夜則譫語此為熱



入血室故寒熱如瘧宜此湯
○小壯之人發熱惡寒入夜
譫語亦宜

補本方加_テ升_ヲ王_名加_テ味_ヲ小柴

胡湯又本方加_テ貴_ヲ餘_ヲ芍_名陶

氏小柴胡湯○又尋常感冒

用此等分名和解散○加黑

豆一撮名火邪湯而治火邪

諸症○傷寒日久不解者熱

必傷血攻表惡寒發熱而裡

未實者加_テ桂_ヲ○胸中煩而不

嘔去_テ守_ヲ加_テ參_ヲ栝_ヲ○腹痛加_テ童

○痰盛或喘加_テ雪_ヲ烏_ヲ○熱盛

錯語不眠加_テ升_ヲ連_ヲ栢_ヲ○少陽

陽明合病口燥目疼加_テ餘_ヲ甚

○自汗惡熱譫語煩渴去_テ守

合_テ白虎湯○自汗惡風腹痛

或寒多熱少脉弱去_テ芍_ヲ合_テ桂

枝湯○血虛發夜熱合_テ四物

湯_見虛_損去_テ芍_ヲ加_テ門_ヲ○舌乾口

燥去_テ守_ヲ加_テ花_ヲ或_テ勤_ヲ○脉弦虛

無力先因_テ房勞_ヲ夢遺感_テ寒_ヲ或

病後血氣未固以致咳嗽吐

痰晝輕夜重發熱不止合_テ四

物湯去_テ芍_ヲ加_テ門_ヲ胥_名栢_ヲ○脉弦

虛無力或浮散發熱煩躁口

渴不飲水此為_テ虛熱_ヲ去_テ守_ヲ本

合_テ生脉散_中見_中○嘔逆倍_在姜



加貴○頭痛加羌活○中暑發熱頭痛加連○溫瘧加恒洗○小便不利大便泄瀉合四苓散見中夾熱而利加煨連芍

大柴胡湯 胃亂譫語加連丹

○痞滿加奴利淡○舌胎黃赤口燥渴飲水加括○夏月熱病煩躁脈洪大加雷門蒿○發斑加地丹紗○發黃加茵梔○鼻衄加犀○大便不通加送

九正

黃連解毒湯

治大熱不止訖

嘔煩渴錯語唯啞不曉或傷寒

汗吐下後熱不退諸般積熱實火者大効

連芩 栝 丹 各二

右水煎○腹滿嘔吐或欲作利者加守 枳 朴 苓 各二 姜 片 ○ 三

焦實火內外皆熱煩渴小便赤口生瘡加翻芍柴苓等○狂亂

喜笑不休者此心火盛先行吐法而後加守瀝竹葉姜汁○臟

毒下血者必在糞後各逐血加翹槐細其謂之入實湯○婦人

赤白帶下屬壯盛而有寒熱者合四物湯加倍連尤効

按清熱之劑也○三十餘歲



婦人崩漏如瀉身熱口渴合
四物湯煎湯與棕灰而安○
又孕婦有先證合四物湯加
升伽而安

補一方加柴胡連翹各等分

正
白虎湯

治傷寒汗吐下後心

胸煩悶渴欲飲水而脈洪大

膏兩 雷兩 耳分 粳米

右水煎○熱盛煩渴不止及發

赤斑脈虛加參各一名

一方加粳米○大便不固熱不退

加蒼○脈尺寸俱長汗大出身

如石加桂○老幼及虛人皆

胃謔請或小便澀起淋無度或

煩而不眠加丹○上焦煩渴而

不欲多食謂之高消加參仁或

加升相○瘡疾表裡俱熱時時

惡寒有汗而大渴口乾加參

按此方除熱之劑也○夏因

暑熱而遺尿加參相○一男

熱不甚大便瀉不省人事脈

浮大無力背此與是死証加

參蒼取驗而後小柴胡湯合

四君子湯而調理則全愈

補本方加參門玄丹姜棗作

藥各隨氏自虎湯治法同上

○虛煩甚加門○裏熱大渴

煩躁表熱惡寒脈浮并加參



一

桃仁養氣湯

治瘀血小腹急

痛大便不利小便自利或譫語口乾遍身黃或血結胸中手不近腹或寒熱昏迷其人如狂

虎 炒一 麩 五 廿 二 桂 一

右入姜煎五更服

三

三一養氣湯

治消渴胃中有熱

虎 芒 朴 實 苈

右煎服

愚按治傷寒雜病內外所傷一切風熱風痰濕熱燥熱入裡之深大小便閉或難產死胎不下小兒斑疹黑陷等症○治消渴胃中有熱○又

能治肝經玉莖中痛

三

調胃養氣湯

治太陽陽明不

惡寒反惡熱邪在中焦作滿大便秘譫語嘔噦

虎 六 半 廿 二 芒 一

右上一味水煎入芒再煎沸服

四

小養氣湯

治六七日大便不

通潮熱譫語腹脹滿悶而喘○下痢赤黃內煩喜欲飲冷水小便不利者先用三服蕩滌而後調治之

虎 二 朴 實 各 一

右煎服以利為度

按活人大全日裡症脈浮



後宜下者小養氣湯主之肝
裏裡見症者加柴胡心之裏
見症者加赤芍翁脾之裡見
症者加芍丹肺之裡見症者
加翹本腎之裡見症者加滑石

五元

大養氣湯

治胃實譫語五六

日不大便腹滿煩渴舌乾口燥
日晡發熱脈沉實

虎_半

枳

實

各一

芒

半

右先煎實枳去粗心虎再煎去
粗細芒更煎一二沸服以利爲
度○瘧疾寒熱轉大者從卯至
午發宜柴胡湯從午至酉發者
邪在內宜大養氣湯從酉至子

或至寅發者邪在血宜桃仁養
氣湯下之微利後更以小柴胡
湯撤其邪可也

補愚按活人大全曰裡症脉

沉宜急下者大養氣湯主之
肝之裡見症者加柴芍心之
裡見症者加連門脾之裡見
症者加芍地肺之裡見症者
加芍羌腎之裡見症者加當歸

六元

加味養氣湯

治瘀血內停胸

腹脹痛或大便不通

虎

芒_{各二}

實

枳

斤

紅_{各一}

甘

五

右酒水_{各半}煎服病急者不用



按養氣之類可用壯盛人不可用虛弱人若不辨虛實則誤多○對瘧窺下風而與之則得卒効

元

涼膈散

治表未解熱入裏下

證未全懊憹不眠三焦實火煩渴口舌生瘡謔妄便瀉閉結發斑黑陷或治上焦熱甚陽明少陽之氣中血藥也

翹四各 丹 虎 苛 苓各

芒一廿五分

右水煎○或入竹葉生蜜少煎

食後服入生亦可或作末服○

東垣加桔治諸般熱退六經

實火○肺金邪熱嗽痰加守○

咽喉腫痛涎嗽加桔○咳而

嘔加守○身嘔嘔血加斤○

芋○淋瀝加消○風眩加芍

共膏○酒毒加葛連名清心湯

用蜜竹葉同煎○珠疹加葛○

赤芍芎芩桔○陽毒發斑加斤

○咳嗽加桑杏○結胸心下

滿加桔○譫語發狂踰牆赴

井皆陽熱極盛加連栢赤芍○

眠生醫瘡赤澁流淚加菊賊芋

○本方合四物湯名双和散能

益血泄熱

按除積熱實火之劑○丁婦



謔言發狂晝夜不眠不能坐
臥飲食與則食不與則不食
大便秘脉細緊而數四物湯
加連四十餘劑而愈

八正
八解散

治傷寒感冒頭眩身

熱惡風多汗嘔逆惡心

參 苓 伽 陳 藿 升
守 耳

右入姜棗水煎服

按此方濇也傷寒及諸病
之胎熱以寒劑而不退則與
此方而其熱退是乃熱即熱
用為秘中之秘矣○他家去
參加桔名萬安湯是以退諸

病之胎熱也○灸熟食熱等
亦可○醫王證輕用之○頭
疼發熱體倦或舌強不能言
語是乃有傷寒與中風之疑
則宜用之○風勞多汗或勞
傷過度怠惰自汗或飲食無
味或嘔逆惡心俱以取驗○
感風寒頭痛壯熱無汗則加
羌去參○頰頰及咽喉痛津
唾難吞加桔菴升○咳嗽加
西○脾胃虛而瀉除杜

九正
溫膽湯

治心虛膽怯觸事易

驚夜夢不祥異像致心驚氣鬱
生痰涎或短氣悸之自汗飲食



無味或傷寒一切病後虛煩不
得眠

守 陳 苓 實 各二 薤 各一

并五分

右入姜枣煎服

神加柴胡連參薤各一斤薤溫

膽湯治傷寒日數過多其熱

不退夢寐不安心驚恍惚煩

燥多痰不眠者

一方 治膽虛痰熱驚悸不眠

去芍加姜四煎服

一方 驚悸屬痰火而兼氣虛治

痰火而驚悸不眠

參 例 神 沂 池

酸炒 門 守 驚 澆 薤

膽 各等 辰 五分 并 三

右入姜片一束枚梅一瀝煎調辰

末而服

加味溫膽湯 治病後虛煩不

得睡及心膽虛怯觸事易驚

短氣悸

守 三 各 陳 二 各 茹 實 各 一

苓 并 各 一 各 遠 薤 參

酸 炒 各 一 條

右入姜枣煎服

按病後虛煩不眠者選先方

得數奇○一人與主君為口

論開戶一年餘心熱煩滿痰



火心攻腹脹嘔逆夜不能寐
他醫皆言陰虛火動而治不
應予謂氣鬱生痰而然加味
溫膽湯加連而安○姪婦心
驚煩悶不眠溫膽湯加參門
柴而安

一平

補九味羌活湯

不問傷寒傷

風寒熱頭項脊腰四肢強痛并
四時感冒疫癘晚發等症雜病
亦可通治此方不犯三陽經禁
解利神方

羌 芩

精各二錢半芎 芷

本 地

錢各二錢細 甘各五分

和入姜棗水煎○此方發春夏

秋三時表症代桂枝麻黃青龍

各蓋三時暄熱傷寒則不敢用

冬月麻黃而發表故代以羌精

傷風則不敢用冬月枝而實表

故代以芩微芎芷辛發表以代

杏地救血以代芍加芩以順天

時也○太陽症加羌本○陽明

症加周葛芷○少陽症加柴本

守○太陰症加精朴洞○少陰

症加利雷梅○厥陰症加芎柴

○復月加羔雷○有汗去細○

服此湯後不作汗加水○惡風

自汗加枝○復月去枝加芍○

汗後不解加鹿○嘔逆加姜汁



○有痰去地加守○肌熱加葛
柴○喘而惡寒身熱加杏地○
虛煩加雷門茹○胸中飽悶加
枳利○中風行經加附○便閉
加虎○中風兼五痺等症各隨
十二經內外上下寒熱濕涼四
時六氣加減補瀉用之○渴加
雷羔

赤水玄珠云此方予每用加
柴胡乃總治傷風各經之活
套也今人只知其為四時傷
寒如神不知加柴胡總治各
經之妙云

六十一順氣散

治傷寒傳裡大

便結實口燥咽乾怕熱揭衣謔
語狂妄揚手擲足班黃陽厥潮
熱自汗胸膈滿硬達臍疼痛症
柴 芩 芍 瀉 朴 虎
芒 甘

右水煎臨服入鉄秀水三匙

按代大養氣小養氣調胃養
氣大柴胡三乙養氣大陷胸
等湯之神藥也舉世無人知
此奇妙

清火化痰湯

治熱痰在胸膈

間不化略吐不出寒熱氣急滿
悶作痛者名痰結

連 芩 丹 貝 蕪 利



枳 貴 守 苓 好 芒
雪 甘 蜜 杏

右入姜煎入瀝姜并

按年力壯盛先吐痰法後服此湯此方治痰嗽之劑

四十四

芎蘇散

治四時傷寒頭痛發熱惡寒其外治孕婦傷寒傷風

芎 二錢 水 葛 各三 利 守

枳 貴 各一 柴 苓 各二 芒 少

右入姜棗水煎

按類香葛湯治四時傷寒時行疫癘表証

五十四

麻黃湯

治太陽症頭疼發熱惡寒脊強身痛無汗脈浮緊而

喘又治太陽八九日不解以此

發汗必愈乃解及不得汗發

又治太陽陽明合病喘而胸滿

腹不滿邪在表不可下者又

治陽明脈浮無汗而喘凡脈但

浮無餘症者皆宜服之

麻 二枝 一匙 其 六 杏 个

右姜煎○本方加升芎芷芸羌

本姜葱豆豉名陶氏麻黃湯治

法同上○若本經寒熱頭痛無

汗而喘去升加葛○本經寒熱

身痛去杏加精芍○本經寒熱

身痒面赤不得小汗者去杏並

升加柴芍○本經寒熱頭痛胸



中飽悶，加枳利。○蓋麻黃陽性，熱惟冬及春初兼病人，素有寒者，乃用正方，復至後服，必發。班黃狂悶。○如夏月得太陽証，惡寒發熱，頭痛脈浮洪盛，無汗以子和，六神通解散代之。

按此方治太陽膀胱經，無汗辛溫發表之劑。

六神通解散

精三分 羔 滑 芩 各一分 麻 七分
半 五分 甘 分

右水煎。○春加芸。○太陽發熱無汗惡寒，漸變為剛瘧者，加赤芍六分，乾葛一錢，豆豉二錢，入

葱白同煎。○傷寒中濕身體痛，身目俱黃，去枝，加翹二錢，雪赤豆各二錢，入生姜大棗同煎。○傷寒即病少陰經脈沉微，身體痛，得汗則已。本方中去枝杏，其加細一錢二分，附一錢。○傷寒大下，後脈沉遲，尺脈不至，咽喉不利，唾膿血，厥逆泄利不止者，雖曰難治，去杏，加升斤各一錢。雷芩、萎蕤各半錢，羔、伽、芍、顛、苓、永各七分。次，第取微汗而愈。○即病少陰經無表裡，症去枝杏，倍甘，加附一錢，二三服，後得微汗而愈。○風濕相搏，脈浮一身



盡痛去枝加薏一匙得微汗而愈

桂枝湯

治太陽傷風衛實榮

虛自汗頭痛鼻塞項強乾嘔面惡寒洒洒惡風翕々發熱或熱多寒少面色光而不慘煩躁身痛手足不冷脉浮緩寸大尺弱者宜如無汗溺數手足冷不惡寒者忌服夏月誤服麻桂必發黃瘕斑在悶而死

枝 芍各三錢

右水煎○加防芍卷本姜枣各

陶氏桂枝湯○如汗多加加○

汗不止加長○喘加柴杏○胸

中飽調加枝

按此方治太陽膀胱經有汗

辛溫實表之劑

桂枝湯

枝 芍 芩 桂 芍

伽 甘各等分

右水煎○加芍名桂枝黃芩湯

柴葛解肌湯 治足陽明胃經

受症目痛鼻乾不得眠眼眶痛

脉來微洪宜解肌屬陽明經病

其正陽明腑病則別有治法

柴 芩 葛 芍 芩 芷

利 羔 其

右入姜片三棗一枚水煎○本經無



汗惡寒去_其芬加_其麻

按此方治陽明胃經解肌之劑

九四 益氣養神湯 治傷寒新瘧方

起勞動應事或多言勞神而微復發熱者曰勞復宜服之

參 斤 芍 門 雷 丹

各一 柎 西各七 貴五 升

其各三分

右入棗一枚水煎服

十五 梔鼓湯 治汗吐下後心膈滿

悶或痛或微汗虛煩不得眠反復顛倒心中懊憹及噪熱怫鬱於內而氣不宣通

紅梔子 淡豆豉

右水煎○少氣虛滿加_其○嘔

噦加_其○有宿食而煩燥者

加_其○下後脹滿而煩加_其○澹

○下後身熱而煩加_其○差

後勞復加_其

按此方治懊憹之劑

一五 三白湯 治虛煩或泄或渴實

調理內傷外感之奇方也

餘 伽 苓 各一 其五

右水煎服

三五 加味益氣湯 治身虛弱兼乏

勞而染感且傷寒頭痛發熱者

樞 參 各一 伽 貴 斤 各

分柴一 升三 海七 羗一 錢三



錢一廿五分

右入姜水煎服○冬月加細○
熱甚脉滯有力加泔

桂枝大黃湯 治足太陰脾經

受症腹滿而痛咽乾而渴手足
溫脉來沉而有力皆因邪熱從
陽經傳入陰經也

枝 芍 虎 柴 洞 甘

右入姜棗水煎臨服入洗○喘
者加腹

按此方治太陰脾經腹痛之
劑

合類增補衆方規矩卷之二終



