

增補象方規矩

延室元年版



研医会図書館蔵和漢書整理票.	
書名	增補象方規矩
撰・編・著	
記述・筆録	
原本年代	寛永13年 1636年
再・復刻年代	延宝元年 1673年
写記年代	
卷・冊数	上・中・下3巻 1冊.
刊・写	刊行本.
形態	縦12.8cm 横19.2cm
登録番号	原簿第 頁
備記	

2-0131





增補衆方規矩



衆方規矩目錄

上卷之目錄

一 香蘇

三 麩腹

五 蒼朮

七 升葛

九 胃風

十一 小柴

十三 醫王

十五 滋降

十七 九清

十九 參養附養

二十一 平胃

二 葛麩附苓補心

四 九文

六 和腹

八 不換

十 十神

十二 八神

十四 滋至

十六 清肺

十八 七清

二十 香養

二十二 香平



三 四君

中卷之目錄

一 香六君

三 四調

五 二陳

六 五苓

八 芍藥

九 連解毒

十一 理中

十四 分心氣

十六 順和

十八 烏順

二 四物

四 八珍

五 二陳

七 胃苓

八 芍藥

十 白彪

十二 七氣

十三 加四七

十五 寬中

十七 通聖

十九 八順

二十 導痰

二十一 小續

二十二 大防

二十三 加潤燥

二十四 疎活

二十五 清化

二十六 沉天

二十一 降氣

二十二 大秦

二十三 加除濕

二十七 勻氣

二十九 獨寄

三十一 清抑

三十三 清心化

下卷之目錄

一 逍遙

三 溫膽

四 分補

六 補滯

八 五皮

二 柴抑

五 分消

七 赤豆

九 二八流



十 木流氣

十一 木調氣

十二 貴堅

十三 升補

十四 五香附五香連翹
加味五香

十五 承氣枳仁兼三乙兼調胃
兼小兼大兼加味兼

十六 涼膈

十七 十茹

十八 清益

十九 斤類血

二十 生津補

二十 蔓實

二十一 垣瀉白

二十一 加瀉白

二十二 潤燥

二十五 五淋

二十六 八正

二十七 清心蓮

二十八 滋榮養附參

二十九 六黃附當

三十 清暈化

三十 半伽定

三十一 驅風觸

三十一 清解鬱

三十四 椒梅

三十五 疎肝

三十六 通氣防

三十七 菴活

三十八 加八仙

三十九 清熱除

四十 清火安

四十 豁痰

四十一 消痞

四十一 犀地

四十四 芫菴附九防丰
方乾葛

四十五 洗肝明

四十六 滋腎明

四十七 通明利

四十八 通竅

四十九 加清胃

五十 清涼

五十一 返魂

五十二 升和氣

五十三 導滯

五十四 解毒七方

五十五 蘇和氣

五十六 催生九方

五十七 補虛

五十八 芎歸調



【十九】消癰

【二十】消食

【二十一】鎮驚

【二十二】醒脾

【二十三】消痺

【二十四】養老

右百二十方目錄終

衆方規矩卷之上

香蘇散

治四時傷寒感冒頭痛發熱惡寒及內外兩感之證春月宜用之探病

蘇各二陳一甘草

右入姜葱水煎服○頭痛加藜蘆

並名葶芷香蘇散專治氣虛頭痛○頭如勞痛加膏葱○偏正

頭痛加細苛膏○太陽穴痛加

靜膏傷風自汗加枝傷風無汗

加麻葛○惡寒加藜○發熱加

柴苓○寒慄加枝○虛熱不退



加參○潮熱加參○咳嗽加
梅會○咳嗽不止加守杏○鼻
塞聲重咽癰不和加梅○胸膈
塞塞加梅守○氣促不安加腹
桑○嘔吐惡心不止加香守○
飲食不化加礞石○腰痛不能
踞伸加官嬰○腹肚痛加蜜○
脚寒加良薑○木瀉即脾泄
加藿香○瘧疾加梅葉○瘧痢
加枳連去甘○久瀉加蜜訶○
身疼加芍官○心氣痛加索葵
苗○感風寒發熱頭疼合不換
金正氣散○感寒頭痛壯熱惡
寒身痛不能轉動合五穉散又

或合敗毒散○風濕脚氣加枳
瓜瓜各一疎通氣道移之檳蘇散
○春夏氣溢腫而癰加五瓜
枳鈴○濕氣周遊脚膝痛加恣
蜜芍○疝氣偏墜疼痛初發增
寒壯熱甚効加醋蜜棧我通○
內傷飲食外感風寒夾食夾氣
胸膈脹滿肚腹疼痛頭痛身痛
發熱加葵芍麻枳卷各行氣香
蘇散因濕又加蒼外感風寒又
入姜葱內傷飲食又加查曲○
小兒傷寒夾食夾驚四時瘟疫
瘧疾加童蒿各香葛散○婦人
一切氣作痛或上燙心胸或攻



藥脇肋腹中結塊發滯刺痛月
水因之不調或眩暈嘔吐往來
寒熱無間胎前產後並皆治之
加麥二冬一尾煎服謂之正氣
天香湯

按此方散氣快氣之劑故耳
鳴頭昏胃或頭痛眩暈或咳
嗽痰熱往來或瘧寒多熱或
或內寒外熱或寒熱相半或
骨節痠痛臍腹作痛或水腫
上氣喘嗽面赤淨腫或浴溫
泉中風氣逆上而面赤頭痛
等皆治之○趨酒之人其酒
毒入胎或嘔或吞酸加喬行

○若治酒穢加藜蘆鹽或曲
磁膏○脚氣不腫而痛者氣
痛也加木瓜○小兒疳疔未
成加飛蠶○婦人足冷上氣
或妊婦四五六月而腰下淨
腫皆與本方得奇驗○氣咬
而發熱腫痛加連苓丹
一人頭痛咽乾或將腹脇痛
不止合升麻葛根湯取驗亦
來治數百人故名之香葛湯

葛根散

附苓補心

治四時感冒發熱頭痛咳嗽
飲中脫痞滿嘔吐痰水意中快
膈不致傷脾一切發熱及內傷

外感諸般咳嗽痰喘或欲成勞
察血治

陳 苓各一 匙 守 圖

西 齊各一 枳 九 枳 五 參 分

蜜 二味減半 若新 病不用亦

右入姜棗水煎服○初咳嗽加

桑杏○久嗽加會梅○口乾加

門瑞○嘔逆加藿砂○脾泄加

蓮扁仰○頭咳加芎細○若感

冒惡寒無汗咳嗽喘促傷風無

汗鼻塞声重咳嗽全加麻杏○

肺多有熱加杏苓桑梅○肺寒

咳嗽加會永○心下痞悶或胸

煩熱或停酒不散或憎雜惡心

加連實倍用專陳○胸滿痰多

加藁○氣促喘嗽加雷車○

血加梅門茅○心盛發熱加柴

苓○咳嗽吐血加升牡地○勞

熱咳嗽久不愈加雷車門○姓

娥傷寒去守加菝○陰虛痰嗽

或吐衄合四物湯名茯苓補心

湯○痘疹但覺身熱候傷寒疑

似未明宜用之○痘疹冬寒甚

初見紅斑不能發起者亦用之

按四時咳嗽風痰胸痛宜用

之不傷脾胃進飲食順氣殊

感冒發散之方也常去參蜜

而用何者參入手太陰肺經



爲火見雜著心盛者去蜜見
必用故新病去一味加苓柴
可退內外熱也雖然久病衛
氣虛則加參宜順氣也心氣
弱則加蜜宜遠氣也○表熱
甚加蜜則間有斑出故他家
必去蜜也○傷寒七八日熱
入裏妄語口乾脈數雖與解
毒承臍等而無驗故此方加
苓連而與則表裏熱退便通
而愈○衄血七日面赤他療
無驗寸診脈浮數故加芍蜜
側冷而五貼全安○瘧疾患
於旅途熱多寒少兼咳嗽故

加苓羗得奇效○喘促痰盛
喉中如小雞加杏會○勞嗽
無汗潮熱五心煩熱加蘇○
小兒有痰嗽而驚風初發可
也虛弱加參或感冒發熱頭
痛痰嗽喘促痞悶專用之
一男三十餘歲咳痰泄瀉晝
夜四五行口乾胸苦肌熱去
守枳加婁伽而取驗

附
茯苓補心湯

治男婦血虛無汗潮熱咳嗽無
顏色或心虛爲邪氣所傷吐血
或心氣虛面黃瘁血虛潮熱五
心煩熱無汗欬嗽唾血或婦人



心膈嘈雜或婦女經水不調吐
血咳嗽發熱口乾喘急胸膈痞
悶嘔吐痰水或婦人亡血過多
或氣逆心悶月水不斷或女子
血虛有汗潮熱者亦宜用之
按血虛而胸跳或咳嗽怔忡
咳嗽吐血或虛勞潮熱或勞
熱如瘧或心氣不足面黃肌
瘦五心煩熱或咳嗽唾血或
有汗怔忡或嘈雜或周身血
斑此證多在產後或產後失血眩暈
或婦人惡阻或小產可也

題腹散

三

藿香正氣散也

治四時不正之氣寒疫時氣山

嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛
吐利中暑胃風吐瀉中濕身重
泄瀉或不伏水土脾胃不和或
飲食停滯嘔逆惡心胸膈痞悶
或頭眩增寒發熱無汗者

藿香三錢 陳 樛 守 圖
各二錢 腹 懸 莖 苓 各一錢 半

右入姜棗水煎服○霍亂轉筋
加瓜○腹痛加芍○寒痛加官
○冷甚加朮○飲食不化心下
痞悶加茯苓○米穀不化加曲
朮○肉食不化加查○心下痞
加減童○中暗昏風加藿扁○



時氣憎寒發熱加柴葛○發熱
加門竹葉○口渴小使不利合
五苓散○心腹絞痛加木○若
癩欲登鬪不通加棧○寒濕相
搏霍亂轉筋煩渴悶亂合蓮薤
散名之二香散○感風寒內傷
飲食霍亂轉筋吐瀉合五苓散
轉筋不止男以手挽其陰女以
手牽其乳此千金妙法○夏時
受涼傷外又飲食生冷傷內頭
痛身熱惡寒或腹痛吐瀉若外
感重去伽加蒼朮若內傷重加
宿曲○林曰尸厥飛尸卒厥此
即中惡之候因冒犯不正之氣

忽然手足冷肌膚粟起頭面青
黑精神不守或錯言妄語亦緊
昏不知人頭旋暈倒此是卒厥
客忤鬼擊吊死及入廟登塚多
有此疾以蕪合香丸灌之俟甦
以藿香正氣散加蜜星殊驗

按霍亂主方兼內外有譽也
藥治山嵐瘴氣之第一也○
霍亂嘔逆去芷加守姜汁最
霍亂吐瀉腹痛者必用之○
四時感不正頭運骨惡寒
發熱專用之○夏月泄瀉或
傷食濕滯俱以兼腹痛者亦
宜○七情過極逆氣運餓此




名中氣亦宜○渾身振急
寒喘嗽頭自昏重加玄杏
梅得奇効○出遠於治心腹
脹滿此方專識榮衛秘三焦
行痞滯消膨脹○腸胃受濕
下血不止加連梅有奇効○
癘疾初發無汗用之則必發
汗而愈○傷寒感冒頭痛發
熱而無汗亦可也○寢間風
入於口鼻中大陰則咽痛多
此方主之○飲酒而傷風發
熱或吐逆亦宜

九文湯 四 敗毒散也

治瘟疫四時通用

卷 藥 劑 西 機 時
圖 各 等 機 時

右入姜木煎服此藥治傷寒瘟疫
疫時行風濕風眩四肢痛憎寒
壯熱項強睛疼不問老人小兒
皆可服或嶺南煙瘴或卑濕之
地脚氣痿弱此藥不可缺衆人
病一般者加葛為妙○傷寒頭
疼身痛頂強壯熱惡寒口乾心
中蘊熱加芩○傷風鼻塞聲重
咳嗽吐痰加守杏○頭目眩暈
屬風熱加守定○眼目腫痛因
風寒所感加芸荆歸尾赤芍去
參苓○酒毒發熱作渴加葛連



○瘧疾不問先寒後熱先熱後寒頭疼身痛加蒼葛果板○風熱濕毒腰痛加續定苛瓜○風熱入大腸下血不止加桑苛梅姜糖有血加門若因酒毒加連○足三陽經受熱毒氣流注脚蹠上嫩赤腫痛寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒加蒼○皮膚癢痒加蟬○熱而紅腫加瓜蒼○大便實加麝○風熱上壅咽喉窒塞或痛或不利生瘡或如肉腐痛妨悶加芩守翹倍加桔時行瘟疫下利赤白發熱口乾身痛加倉米連姜棗各倉廩

散○喉口爛加倉米蓮○痢後手足痛加瓜板○臂痛冷起手甚難送合五積散各交加散加瓜膝姜棗○諸般瘡毒腫痛或癰疽疔腫發背乳癰膝瘡等憎寒壯熱甚者頭痛拘急似傷寒加荆芸翹忍去參各荆防敗毒散○身生瘡膿血脊腫極痛且痒或風熱積毒發於面頭手足如胭脂色加葛赤芍升定蟬苛門地各平血飲○小兒急驚風初起發熱手足搐搦上竄天吊角弓反張金一切感冒及瘡疹欲出發搐加定全蝎蚕附錄○



百病方
癰疹發似三日發熱加芩荊定
錄去參苓

按病人氣實者去參若氣弱
難運藥力者加參○四時不
正癰疫熱毒鼻塞聲重頭面
腫痛加參芎藭○頭痛甚者
加翫○如心經蘊熱口舌乾
燥加芩○傷寒頭痛發熱惡
寒半表重半裡輕者宜用之
若半表半裏○無名腫物赤
而痛所有發熱世俗謂之風
毒腫若熱甚加芩可也在上
麻葛根在○外科腫物貼藥
下宜取毒故毒氣不出而周身浮腫者

宜用此湯○一鄉患痢世俗
謂之腹疫病加櫻蓮○熱痢
與訶行則雖痢止而熱不退
此湯加三黃或芩宜解散其
藥毒○腸風下血及近血亦
得驗○風眼目赤多血者用
之若甚腫痛加三黃或芩連
亦可○下湯風呂等風中浮
血故赤斑出甚痒加斤芎或
伽芸荊芩芍地亦宜傳謂之
加味敗毒散此方宜用癰疹
○痛風因風濕者百節痛者
脚氣痛處煩熱者俱得奇效
○瘡氣有內難發出與此湯



則悉發出又因加減內消亦
 叩○大頭瘟病項面腫及嘔
 痛加放連○小兒急驚風加
 白附蚕○小兒嘔則口眼喎
 斜腫少腫與此湯得數劑○
 痘疹序病甚發熱與升麻葛
 根湯其熱不去故此湯加紫
 草有奇効○一人冬月患痢
 無熱腹痛與芍藥湯不効故
 慮感風濕為痢與此湯得奇
 効○或曰鼠咬加貝○凡欲
 與此湯者先試口氣熱或骨
 節痛而可也

蒼桔湯 五積散也

感冒寒邪頭癱身疼頭痛
 急寒嘔吐或腹痛又傷風寒
 發熱頭疼惡風無問內傷生令
 外感風寒及寒濕客于經絡腰
 脚酸疼及婦人經血不調或難
 產愈服之

蒼 二分 圖 一分 粳 粳 陳
 各 一分 枳 一分 水 各 六 分 解 粳
 枳 一分 水 各 六 分 解 粳
 守 守 守 守 守 守 守 守 守 守
 守 守 守 守 守 守 守 守 守 守

右入美葱水煎服○嚴寒用煨
 承○按氣加吳○足淨腫加五
 加腹○遍身疼加乳○細○巴
 成風痺加羌活芸○四肢濕痺



合烏藥順氣散○腰痛加嬰齒

○手足^聖加槌瓜膝○咳嗽

加杏雪○婦人調經催產加艾

醋○難產加麝桂○腹痛綿綿

無增^越因寒者宜治○腰痛感

寒濕脾胃氣閉加嬰○寒濕傷

腎經腰痛不可^挽加承嬰○

感風寒濕^積腰痛或遍身麻木

者用之遍身壯熱四肢骨節痛

因虛寒者加羌^搖穿○秋冬脚

膝腫滿疼痛因寒濕流注經絡

加瓜膝^板吳○醉飽後色慾不

節^觸傷小腹成疝氣其^或自小

腹痛連腰膝下^心頭吊痛額上

汗出加^察○又虛弱人中寒疝

氣作痛亦宜○婦人遇^經行時

身痛手足麻痺或寒熱頭疼目

眩去^水加羌^搖膝姜葱○咳嗽

加杏^玄○瀉泄去^積加^衍伽○

赤白帶下屬虛寒加^菝齒吳○

新產後以此湯除^敗血生新血

無^寒熱之患去^甲○熱加^苓○

小兒痘疹天時^嚴寒不能起^發

或^紅斑初見者除^桂枳外十三

味慢火炒令^攤冷入^二味加^生

姜水煎^熱服則為^賈膿

按夏至去^甲此方除寒濕故

有痛者必用○頭疼臂痛腹



痛腰痛脚氣癱風等皆有發熱而足冷則與此湯可也○寒滯脾腎肝三陰而四肢百節痛有奇効○因滯氣而腹筋張加重○寒疝加吳○因打撲而血滯冷痛立得効○冬月腰不立上氣面赤下冷又腰已下冷如冰面上火熱背憎寒宜○婦人兩腿痛甚有汗足稍冷加附三貼安○婦人淋病加車通可秘○婦人身冷經水不來者可○赤白帶下屬虛寒有痛加吳○難產腰腹甚痛時寒天

加附得効又腰腹痛破水下未產經宿亦得○產後餘血攻心或有冷塊攻心上氣則取驗若無驗則正氣天香湯有太奇○死胎腹痛大熱脉數加永附二貼而立下○然虛作瘧寒多無汗加枳果

和腹散

三和散也

治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇腹脹風氣壅滯肢節煩痛頭面虛浮手足微腫腸胃燥溢年高氣弱背脇痛妨飲食及脚氣攻胸腹滿悶大便不通

藜一各 卷 蘇 瓜 腹



泉各五 陳各五 檳各五 木各五 伽各五

一方加砂姜燈各五

右煎服○七情結五臟脾胃不和
大便秘澁或脇背走痛妨飲食
益治○水腫喘急者先當降氣
加蘇滯苴

按治因滯氣而秘結者之方也
○能食而大便不通為實秘宜
三黃承氣之類不食而大便不
通為虛秘宜此方是氣滯故也
○老人之秘結或腹痛俱以氣
不順故與此湯而順氣則自愈
真數得奇効○脚氣不腫而牽
急疼痛宜

此方若腫痛宜芹粘痛湯見脚

氣門若因風濕者可尋尤慈

蒼桔湯○水腫脹滿上氣喘

急加載守如大便不通加枳

是依降氣而愈故無氣鬱證

則不可腫之○治疝氣最上

方也畢尤連小腹痛是也○

無病人遊山翫水俄然胸腹

滿悶卒至頰頸而筋大強立

且口際滯不知人事故細

歸末吹鼻延齡丹擦牙通關

竅與此湯而全安○頸筋強

痛引兩脇而取暈不食身難

轉得大驗○腰痛難轉動而



不便秘澁得奇效○太抵礙
牽急則宜此湯是乃氣滯故
也○或語曰腦勝內有形如
指物拂之則累累為轉動與
此湯得奇術

升葛湯

七

升麻葛根湯也

治傷寒頭痛時疫憎寒壯熱肢
體痛發熱惡寒鼻乾不得眠兼
治寒暄不時人多病疫乍煖脫
衣及瘡疹已發未發疑似之間
宜服

紫三厥

荷

廿各二

右入姜煎服○頭痛加葱○咳
嗽加桑○上膈熱加芩荷○無

汗加麻○脚痛加桔其○發黃
丹毒加芩○癰疹者紅點如發
蠶之狀宜此湯○小兒傷風身
熱頭項強自汗表不和加芩○
瘡疹一見苗不可服慎之○冬
月加蘇八○四肢厥冷加枳
半○腰痛當知是痘加枝
○時氣發熱太甚乃毒氣盛加
方一及

按治癰疹最上方也○八九
年已前六七月間天下人民
多患紅斑摩之則當毛不痛
不痒頭痛發熱惡寒合避腹
散二三貼而皆愈尔以來逢



此證則立得奇効矣○當世人多患小瘡甚痒故合避腹散而與之則俄沒然發痰喘心腹強須臾而死矣遇與不遇勿履覆轍

不換金

八 不換金正氣散也

治四時傷寒瘟疫時氣山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下痢赤白若出遠方不伏水土者宜常服之

蒼朮 枳殼 陳皮 寧神 藿香 甘草

右入姜棗煎服○頭痛加芎藭○感寒腹痛加姜官○潮熱加柴苓○嘔逆加喬砒○口燥心

煩加柴葛○氣喘加葶枳檳榔○冷瀉不正加木訶行○熱極大便不通加虎芒○瘧疾加恒棋果○腹脹加蒺藜○痢疾加連枳去其○胸脇脹滿加實砂莪○咳嗽加桔杏會○喘急加麻戟桑○兩足浮腫加瓜腹佳○身體痛加麻枝赤芍○濕症聲啞加昔○寒症聲啞加官○腸胃受濕下血不止加連梅○小兒感冒風濕頭目昏重時發壯熱宜此湯○傷濕重者骨節疼痛酒淋咳嗽加麻按平胃散加藿守之方也是



十神湯 十

時令不正瘟疫流行或感身發熱憎寒頭痛身痛無汗或欲出疹此藥不問陰陽兩感並治之

麻 馨 麩 肆 赤芍
蕪 蘇 藜 桂 甘

右入姜煎服○發熱頭痛加葱

○中滿氣實加枳○心腹脹滿

加實守○潮熱加芩門○咳嗽

喘急加桑桂守○大便閉加麩

芩○嘔吐加藿守○泄瀉加木

苓○癩疾加果枳○痢病加枳

連○腹痛加芍○發熱頭痛加

細膏○飲食不進加砂芩○嘔

逆加香果○衄血不止加梅藟

○疹毒加官參苓

按此方茅芷香蘇散合升散湯加麻故專藥在麻黃一味

矣○感風寒者發熱惡寒

咳嗽頭痛甚而無汗者宜此

湯○傷寒在熱久不退出汗

不出口乾頭痛是斑可出之

證即與此湯問斑出而熱退

也是乃醫術有功者所為矣

予蚤歲頃見一病人其證壯

熱久不退且無汗口乾頭痛

故與參白虎湯則一二劑而

死天刑難逃者也○東井療



婦人頂筋強急而腹脹去麻
加蒼得奇效

小柴胡湯 十一

治傷寒四五日往來寒熱胸滿
脇痛心煩嘔吐頭疼耳聾大便
秘澀此在半表半裏也

柴胡二各 芍藥一各 枳實一各 黃芩一各 甘草五分

其分

右入姜棗煎服○小便難潮熱

腹滿加芍藥○下後陰虛生熱

脈微惡寒去芍藥加芍藥二腹痛亦

然○嘔而發熱胸脇滿小便不

利去芍藥加芍藥○飲水過多

成水結胸去棗加枳實一各○往

來寒熱咳嗽胸脇痛去參棗加

會各半○渴甚去守加參半

身熱不渴去參加枳實半

○心中飽滿加枳實○心下痞

滿加蘼實○夜譫而晝發熱者

熱在氣分加丹連雷磁○晝夜

發熱者熱在氣血之分合四物

湯加連丹○下痢身熱挾外感

者必惡寒發熱煩渴身熱俱病

此在表去參棗加蒼芍陳赤芍

姜得微汗愈○傷寒陽虛效遊

熱熱加陳芍姜○伏暑發熱汗

溼暑入心脛不語加芍藥○瘧熱


多寒或戰熱頭痛胸滿嘔嘔



宜此湯去守加參攪○瘧發寒
熱作瀉病在表裡陰陽不分者
合五苓散各藥苓湯○無汗加
麻○有汗加桂○寒多加官○
熱多加芩○口酸而苦者肝膽
有實熱加瀉壘耳○如膽熱而
口苦者謀慮不決也去芩加酸
錄遠○此酸飽房勞而後大怒
觸動榮血致吐血者加二門○
冠後發熱煩躁加龍骨牡蠣○
產後惡露下忽然斷絕寒熱伴
來晝靜暮劇語言狂亂如有鬼
神此熱入血室而顛狂加地○
產後虛羸寒熱飲食少腹脹加

陳草芍姜棗○小兒感寒發熱
或作癘宜此湯○瘧疹出不快
身熱甚耗加地○傷寒百合病
加藜百合茄梗○本方去參其
加芍虎各二實一人姜棗煎服
符之大柴胡湯治傷寒十餘日
不解大便不通身熱煩燥譫言
妄語此乃攻裡劑故以利為度
如身體疼痛者表證未解不可
服之○倘加芍虎各敷和湯治
腹痛大便結小便澀飲冷以
手按之痛轉甚手不可近或兩
手熱腹脾熱

按大柴胡敷和宜實證不宜



虛證小柴胡傷寒和解之劑也○夏月發熱煩渴小水不利兼傷寒陰陽不發疑似之間者去芍加門會連○下痢赤白腹痛身熱加芍芍○如兼惡寒亦得○熱嗽噤冷水而斂止者加桑杏○煩熱加門○噤臥裁食加木○欬而寒執往來去參加會永○寒熱不調作腹痛去芍加芍○俄耳響而頭鬱骨合香蘇散○酸發百中○灸後發熱煩悶加連丹得奇效○除囊濕痺加薤薑此乃通脈經故也○

男婦口苦兩脇脹或痛加連丹○大飢發熱大食傷胃已成黃疸其候食則腹滿取暈或心中佛前不安加實朴丹○婦人傷寒經水澀來適斷發熱惡寒復則謹識此為熱入血室故寒熱如癰宜此湯○小壯之人發熱惡寒入夜謹識亦宜

八解散 十二

治傷寒感冒頭疼身熱惡風多汗嘔逆惡心

參 苓 陳 藿 朴 守 耳



右入姜棗水煎服

按此方溫劑也傷寒及諸病之肌熱以寒劑而不退則與此方而其熱退是乃執因熱膠為秘中之秘矣○他家去參加桔名萬安湯是以退諸病之肌熱也○灸熱食熱等亦可○醫王論輕用之○頭疼發熱體倦或舌強不能言語是乃有傷寒與中風之疑則宜用之○風勞多汗或勞傷過度怠惰自汗或飲食無味或嘔逆惡心俱以取驗○感風寒頭痛壯熱無汗則加

羌活獨活○煩躁及咽喉痛津

唾難吞加桔卷升○咳嗽加

四○脾胃虛而瀉除科

醫王三 補中益氣湯也

治中氣不足飲食勞倦清氣下陷以致脾胃虛弱發熱頭疼四肢倦怠心煩肌瘦吐瀉瀉弱此藥能升元氣退虛熱補脾胃生氣血

芪一參 儻 片各七 陳五分

柴 周各三 耳

右姜棗煎服○頭痛加蔓○痛甚加芩○頂痛腦痛加本細○諸頭痛並用此四味足矣○痰



厥頭痛加守姜○額疼加芷葛
周○善癩者幾理不密冬邪所
擲加芷芎○耳鳴目黃癩腫
頸痠脇痛面赤脉洪大加
羌芩本其通其經血加芩連瀉
其腫加參芪益元氣○隘痛饑
腫脉洪大面赤加芩甘桔○口
乾隘乾加葛○夏咳嗽加會門
○冬咳嗽加麻根節秋涼亦加
春月天溫加甘款○嗽加蘇玄
○久病痰嗽肺有伏火去參○
食不下乃胸中胃上有寒或氣
滯澀加童密陳○如冬加益漏
○如夏加芩連更加枳漏破多
○春初觸寒加益漏○心下痞
調加芍連痞腹脹加實砂朮○
寒少加承或桂○心下痞覺中
寒加附連○不食而痞加姜陳
○能食而痞加連實○脉緩有
痰而痞加守連○脉弦四肢滿
便難而痞加連柴其○腹痛加
芍其○如惡寒覺冷痛加桂夏
腹痛不惡寒不惡熱加芩其芍
○寒涼時腹痛加守益漏○脇
下痛或脇下滿急加柴其○臍
下痛加芩如不已者大寒也加
桂○虛勞發熱去周加守芩芩
錄會○陰虛火動加楸雷飲酒



人元氣虛弱無功飲食裁少而
紅加守芍葛曲芽枳○小便
加門○大便閉加嬰紅麻仁○
元氣虛弱腰痛加栢雷膝芍○
夢遺加蛻龜○下部無力加膝
牡○脚弱加瓜離○泄瀉加芍
澤芩○汗多去升柴加酸夜間
不睡亦如之○精神短少加參
會○用心太過神思不寧或怔
忡驚悸加神遠酸苜槲子○大
病後元氣未復而胸滿氣短加
陳實芍○男婦骨蒸勞熱加
會○內傷氣虛自汗久不止加
附麻根淨麥○十指蠶麻益面

目遍身皆麻此氣虛也加水菰
門羌芸蓼○咽喉腫痛口舌生
瘡勞而愈盛是屬內傷不足加
絲酒雷桔○中氣不足脈虛微
氣不相續而發呢加參門會栢
以降陰或火加附○氣虛有汗
潮熱者或內傷發熱者益宜○
婦人因勞耳鳴頭疼身倦此氣
不足加門玄○孕八九月胎下
墜或動面黃體倦飲食少此脾
氣虛弱倍伽再加蕪梗三十餘
劑而安○婦人每交接出血作
痛此脾火動脾用此湯而愈○
金瘡腫痛出血不止寒熱口乾



此氣虛血無所附加芩門○小兒諸疳癯塊久治不愈多服尤効○痘瘡結痂而誤犯風寒惡寒發熱尤宜○酒慾過傷而成淋者用此方補元氣則水道運行故淋不作矣

按治內傷不足清氣下陷之方也登歲頃與一應之不食頭痛發熱四肢倦怠而時時憊入且重其證生眩暈為胸塞而已爾以來察脉與眼精而知可與醫王之法矣洪大而數緩大而無力急大而數時一澁是乃心脾肺之虛脉

也眼色見張鞞虛然無情是其所為也○一切病後元氣未復時無憊脉虛大則宜使加減消息而調理矣○傷寒愈後因勞力再發其症頭疼身痛寒熱往來腰腿酸疼沈困無力加柏菴芸若未効則加附運補藥丸也名之加味益氣湯○傷寒愈後為淋浴感風再發熱元氣虛宜加味益氣湯○傷寒愈後元氣未復於是犯房勞則必小便澁則熱沈困加附得奇効○平素不足兼勞役內傷挾風寒



弱者以致癘疾寒熱交作肢體
倦怠加琴芍守○痢疾久不
愈不能起床不食疲弊之甚
者加汚穢破血去柴○婦人
風毒腫愈後上下流注而腫
痛體瘦乏力發熱不食與此
湯腫痛在上加番在下加羌
而得愈按其流注者初為發
散不足之故歟○金瘡腫痛
其口開腫此湯尤宜若其口
閉則宜用棗苓補心湯也癰
疽亦然○內傷氣虛盜汗不
止兼乾咳肌熱加酸門辛栝
○予之父八十歲特冬月太

小便不通中及臍門甚痛
數方不效故灸氣海臍朝小
腹腫起三寸許二穴痛益甚
於是予喟然以醫王煎滌與
六味丸則嘔逆小水通至夜
爍麻下終四五日而安○一
男面自鼻流清涕不聞香臭
三年予以為肺氣虛加門丹
而愈○半產氣虛下血不止
昏暈不知人事加芎朮○產
後下血不盡與芎歸湯四物
湯之類不止故用此湯以得
奇効識下血崩漏帶下等亦
見氣弱體倦則亦當與此湯



○或語云，痛風百節痛，加本
羌活七伸，若痛止，則去加味，
可用本方也。

滋陰至寶湯 十四

治婦人諸虛百損，五勞七傷，經
脈不調，肢體羸瘦，此藥專調經
水，滋血脈，補虛勞，扶元氣，健脾
胃，養心肺，潤咽喉，清頭目，定心
慌，安神魄，退潮熱，除骨蒸，止喘
嗽，化痰涎，收盜汗，住泄瀉，開鬱
氣，利胸膈，療腹痛，解煩渴，散寒
熱，祛體疼，大有奇效，不能盡述。
沂 芎 芎 陳 雷
鹿 候 鐘 門 各 八 分

漿 牛 各 三 分

右入煨姜三片煎服

按虛勞熱嗽有汗者，宜此湯。
若無汗者，宜茯苓補心湯。是
乃表裏之方也。即逍遙散為
加味之方也。婦人虛勞寒熱
逍遙散不効，則與此湯。有數
奇也。○男子虛勞，症欲與滋
陰降火湯者，先用此湯，有得
安全。

滋陰降火湯 十五

治陰虛火動發熱咳嗽吐痰喘
急盜汗口乾，此方與地黃丸相
兼服之，大補虛勞，神效。



沂 各一分
 麥 各一分
 栢 各五分
 雷 各五分
 地 八分
 陳 七分
 芫 天
 右入姜棗煎服加竹瀝童便

姜汗少○骨蒸勞熱加錄柴○
 熱不退加永煖○盜汗不止加
 芪酸○痰火咳嗽氣急生痰加
 桑苑芩瀝○咳嗽痰帶血者難
 治加芩牡膠丹苑犀瀝○乾咳
 嗽無痰及喉痛生瘡者難
 治加芩葉貝會杏桑苑丹○咳
 嗽痰多津潤生痰加貝款桑○
 痰火作熱煩燥不安益痰火怔
 忡嘈雜加酸丹連茹辰瀝○痰

火驚悸同上治○血虛腰痛加
 膝仲○血虛脚腿抽痠弱加
 芪膝離仲去天○夢遺泄精去
 天加預蠟仲膝紙○小便淋瀝
 去芎加車瞿薺蓄膝丹○陰虛
 火動小腹痛去麥加茵木沙○
 陰虛火盛足常熱去麥加丹膝
 ○陰虛火動而喘急者加軾沉
 桑瀝○陰虛火動而眩暈加芎
 定丹瀝○煩渴引飲小便如膏
 名之下瀉乃腎火也去芎加瑞
 伽丹葛連梅○瘦人虛火懸赤
 白瀉去芎加木薜丹蓄○臍下
 氣上發呃者陰火也加秋苗沉



木丹辰柿蒂○虛怯人陰虛火動小便不通加穉澤瀉○腎經陰虛火動矢血發熱盜汗咳嗽痰喘心憊口乾是出火證○陰虛發熱者是陰血自傷屬心腎○酒色過度陰虛火動勞嗽寒熱盜汗痰多午後至夜嗽甚或火嗽有聲痰少面赤身熱脈數以上三条皆宜本方○吐血後見痰是陰虛火動宜此湯

按陰虛火動勞瘵之主方也一應發熱痰嗽自汗口乾者與之而動憊入只與元氣虛損之極可故察脈與眼色而

立可與滋陰降火湯矣脈細數而無力細弦而數數大而虛是也眼睛清冷如肅然有翳是也大抵陰虛症譬秋冬令故顏色青醜眼中清冷惡寒發熱口乾舌澀兼以咳嗽故間葛藜散加杏會以有退其症者若不退當宜此湯○一人陰虛發熱咳痰盜汗口乾心憊加遠酸○發熱盛加柴藜○嗽盛加會藜○痰盛加貝藜○盜汗多加酸蛇○胸不快加陳○泄瀉加蓮陳去柏雷○心憊退則去遠酸



加此加減而半歲得愈○午
後潮熱盜汗太府結小水赤
照加減經三月而安○乾咳
無痰盜汗色變肌熱小便赤
以加減煎湯與六味丸百日
許而安○吐血止而後惡寒
發熱盜汗痰嗽色濁照加減
一年餘而安予察此證生者
十得二三○產後羸勞四肢
煩熱咳嗽口乾盜汗與此湯
得奇效○老尼咳嗽發熱痰
迷心竅而怔忡加酸連二三
貼而安○小兒尾骨節痛加
桂為引而安○或語曰降火
症虫出攻胸咳嗽用七味清
脾湯則虫下咳止○又云降
火湯症熱難去則合黃連解
毒湯而得奇功○又云此症
有積聚者合太七氣湯而可

清肺湯 十六

治痰火咳嗽面目赤身熱咯紅
痰

苓 陳 芹 地 芍 天
麥 芩 丹 苑 膠 桑

各等 分 苈 梅

右入棗煎服 喘急加軾去天
○一切咳嗽上焦痰盛及久嗽
不止成癆加會杏貝吉瀝姜去



芍地菀膠○久嗽虛汗多去菀膠梅加會伽姜○久嗽喉痛色不清去膠加桔苛瀝姜○嗽而痰多去芍菀膠芍加會貝桔伽金沸○咳嗽身熱加柴○咳嗽午後至晚發熱去苓膠加栢瀝○痰咯不出去會膠加萋實瀝咳嗽痰結脇痛去地膠丹加白芥萋實砂木苗柴會杏瀝

按四云此湯治先吐痰而後見血者是積熱也滋陰降火湯治先吐血而後見痰者是陰虛也○久嗽不止痰喘色濁脉細緊而數去芍地膠加

桔貝杏○久嗽不止痰中帶血加杏貝童桔

九清脾 九味清脾湯也

治癰瘡脉弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾初發先服祛邪氣

柴 苓 苓 伽 枳 童 宇 粳 甘

右入姜煎服

按治瘧第一方也熱多寒少或寒熱往來而頭痛口苦咽乾小便赤或瀝脉弦數者此之證也若不可驟用截補之藥與此湯退其熱而後當用



截藥○傷寒寒熱往來口苦
熱不退者與此湯得奇効實
勝於小柴胡湯○一婦人發
熱戰慄鼓齒晝夜三四次熱
退而後頭痛與此湯而愈又
且有兼惡寒者也○產後寒
熱往來咽渴不食泄下與此
湯而安○瘧痢兼作頭痛惡
寒發熱咽渴脉大數雖柴苓
證而却與此湯加枳而安○
諸瘧不論新久其驗如神去
御加蒼陳藿澤枳梅入姜煎
未發前可服○久瘧加恒○
體弱加參○無

汗加麻○有汗加官○夾食
加蒺○渴去守加參

七瀉脾十八七味清脾湯也

治因食傷脾停痰飲發為寒熱

朴梅守童各二

果各一甘五分

右入姜棗煎未發前倫三服

按古人用此湯治脾瘧食瘧
今予連年以此方治因瘧而
虫攻上心胸寔去耳餘皆治
虫之劑也太抵瘧欲發時有
羞上胸物是當虫先用九味
清脾湯退熱而後七味清脾
湯加枳可服發日五更必有



奇効○因虫而久不止時
時惡寒發熱脉細緊用葛甞
散則爲嘔故與此湯而友○
勞嗽乾咳色暖用滋陰降火
湯則支胸不食故因虫與此
湯得奇効今按是遇中否雖
然切切依有驗而記之

人參養胃湯 十九

虛人患瘧者養正則邪自除也
外感風寒內傷生冷憎寒壯熱
頭目昏疼不問風寒二證夾食
停痰俱能治之

蒼 朮 守 各 陳 七 名
藿 果 苓 各 五 其

三 梅 介

右入姜棗煎服○寒多加官○
熱多加柴○汗多去蒼藿加芪
伽○飽悶去參加童砂○渴去
守加門雷○瀉加芍伽○瀉不
止去枳果加衍○嘔噦去果枳
蒼加砂伽預炒米○痰多去守
菓加貝瀝○內熱盛去守加苓
○暑熱盛去守藿加藜扁

按不換金加參苓菓梅之方
故寒多熱少或溼浙寒熱而
癰疔傷寒感冒疑似之間最
可也今察方中有平胃散治
胃癰有二陳湯治痰癰殊望



瘡愈而後親生藥則可與此湯也○咳嗽惡寒發熱用葛根湯○九文散而不驗則此湯去參加會桑得奇効○婦人赤白帶下漉漉而惡寒翕翕而發熱咳嗽無汗或潮熱與逍遙散而及下多血故此湯加芎歸得奇効○產後三十日計惡寒發熱而青不食自汗脉數逍遙散不驗與此湯而全愈○諸病後有酒酒憎寒或潮熱者必可用此湯

付 鵝胃湯

治脾胃虛嘔逆惡心腹脇脹痛

腸鳴泄瀉或寒熱如瘧骨節煩痛

藿 朴 守 苓 各一
附 陳 參 各七
半 白 多 半 枳 五
半 少

右入姜梅煎服○心下痞滿而不能食去果參附加茯苓木實多○瘦人去守加連○肥人加蒼○食積去枳守加曲查葉○血虛去守加斤芍○氣虛去守加參○痰膈中滿去枳守加萸貝桔源○脾泄中滿去守加蒼芍

此方在內傷不足按先方去



蒼加附仰也予常去附代
面治老人小兒之癘疾則十
得八九奇效

香砂養胃湯 干

治脾胃不和不思飲食口不知
味痞悶不舒

佛一 莎 砂 蒼 朴
陳 苓 各八 芩 七 參
蜜 各五 草

右入姜棗煎服○脾胃寒加
官○肉食不化加查果○粉
麵食不化加曲芽○生冷菓
不化加枳朮○胸腹飽悶加枳
腹○傷食胃口呆滯加木實益

○傷食泄瀉加永梅伽○傷食
惡心嘔吐加藿香守梅朮

按此方平胃散合四君子湯
加砂朮多蜜故除濕痰補脾
虛進飲食矣予與此方則連
年有試胸滿清冷而不食是
所以脾胃虛冷而不和殊胃
中有寒痰也雖諸病而胸清
冷而不食則止本藥用此方
進飲食且又與本病藥也若
此濕有支胸者可與枳朮之
類藥矣○久瀉日夜五七
行即令不食咽澀參苓白朮
散不効用此湯得奇效○老



男心腹痛全不食脉平和服藥吐數醫束手予謂是脾胃冷此湯一貼而吐止五貼而食進得奇名○婦人不食胸博而冷眩暈足亦冷沉香天麻湯不效故與此湯而愈

平胃散 王

治脾胃不和飲食不進常服則暖胃消痰

蒼八 朴 陳各五 甘草三

右入姜棗煎服或為末鹽湯點服亦可也○瀉脾濕加苓喬加芩調胃散一法加藿守○痰嗽

癘疾加守○癘疾寒熱加柴○本臟氣痛加胡○水氣腫滿加桑○婦人赤白帶加芪○子宮久冷加桂○酒傷加喬○飲冷傷食加良○滑泄加衍○小便赤澀加苓澤○風痰四肢沉痲加荆○腿膝冷痛加膝○渾身虛壅拘急加錄○脾胃困弱不食飲食加芪參○白痢加吳○赤痢加連○頭風加本○胃寒嘔吐加薑苓喬○氣不舒快中脘痞塞加荻砂薑○胸中不快心下痞加枳木○太便秘加虎芒○遇夏加苓炒脉洪大亦加

芩連○小腸氣痛加鈴菌○遇
雨水濕潤時加苓澤○欲進食
加曲生吳蜀椒永名吳茱萸湯
治傷寒吐利利加本名和氣散加
本桔名和解散加藿守名不換
金正氣散治傷寒吐痢瘧疾寒
熱者加芩○飲食不進身體沉
重肢節酸痛皮膚微腫米穀不
化腹脹本方一桑兩一入姜名
對金飲子○積蠱屬熱粒合小
柴胡湯加童枳曲查獲莪名柴
平湯○閱格吐逆小便不通者
合五苓散加藿

按治脾濕之方也○飲酒太
過小便不利或發黃合五苓
散加茵得奇驗

香砂平胃散

治宿食不消飲食不化者是乃
脾胃傷也

茯苓 陳各一 枳 蠶
各八 砂 各七 木 各五

右入姜煎服○肉食不化加查
果○米粉麵食不化加曲芽○
生冷瓜果不化加永童○飲酒
傷加連葛梅○吐瀉不止去枳
加苓守梅○吞酸吐酸去枳
木加連炒丹吳○日心痛服熱
藥過多後吞酸加連炒○食鬱



而饋雜去根藿加連炒丹芎芍
辰○右脇下有塊作痛飽悶者
食積也去藿蒼加青查芽永栝
○腹痛甚而瀉瀉後痛減脉弦
是食積也先用構急圓而下之
後用此湯

按治積之方也○腹痛而
瀉瀉後痛減去藿加朴查曲
官永得數驗○一婦人噯氣
作酸每夜寢間不覺瀉二丸
白布六七脚腹飽悶或痛惡
食不思二年大抵去藿加朴
查芽曲永尚隨時加裁經二
年餘而安殊去臍生一男也

四君子湯

治脾胃不調不思飲食一切補
氣之本藥也

參五 苓 朮 各十 甘三

右煎服或入姜棗○有痰加陳
守○吐瀉加藿多○嘔吐加藿
砂○泄瀉加木衍○脾胃虛弱
加官斤氏○咳嗽加桑會杏○
心煩不定加辰酸遠○心熱加
愛神蓮○發渴加瓜葛梅○心
煩口渴加參芪○胃冷加喬附
砂○脾胃氣短加水參砂○腹
脹不思飲食加多寶砂○胸膈
喘急加寶守枳○風壅邪熱加



荆芎苓○潮熱往來加西芎○
盜汗不止加苴麥炒○小便不
通澤通猪○太肺閉塞加栝虎
○水瀉不止加木訶衍○遍身
痛加赤芍桂○四肢惡寒有熱
加麻桂○氣痛加苗索斤○氣
塊加稜莪苗莖○腹痛加赤
芍官○小兒疹出未成者加升
葛○婦人難產加百草麝芷○
暴死有疾色者名痰厥加瀝姜
汁○手足癱瘓或在半身不遂
亦然○陽虛不任風寒体弱脉
甚者加附○脾胃元氣虛弱久
泄少食加潏蓮多枯麻○孕婦
假瀉者加片芎○五六箇月加
升○八九ヶ月加通腹○新產
後宜調理脾胃加陳藿砂苴姜
棗○小兒慢脾風加附麻冷亦
然○交精吐乳眼慢糞多穢氣
乃父母交合時喫乳所致加藿
木○痘疹欲出未出而吐利者
中焦傷寒或宿食加砂陳○色
癢加扁苴○脾虛而不生血加
斤炒炒○加陳名異功散治冬
嗽不已或腹滿少食或面腫氣
逆等○加陳守名六君子湯治
氣虛挾痰因之發能亦可○若
見內熱或飲食難化作酸屬虛



火者加炮姜其功甚速○若肝
木侮脾胃而致虛損者加木芍
○若因脾胃虛寒而致食後飽
悶者加荜藿散是名香砂六君
子湯○避於飲食胃氣自傷不
能運化而昏眩謂之食厥先用
姜鹽湯多探吐之而後加荜藿
木入姜棗煎服○去守加預慧
澤連名衛生湯治脾虛氣弱蘭
門元氣不足不別水穀○加薑
枳名八解散治脾○加荏斤芎
陳守定枯芷入姜棗煎服名之
加枳四君子湯治脾人頭眩者
屬氣虛溫痰也○加葛藿木陳
姜名白朮散一切病後服
之生津止渴順氣下痰○加預
扁枯慧蓮為末棗湯下名曰參
苓白朮散治脾胃虛弱飲食不
進或嘔吐瀉利其大病後補助
脾胃此藥極效○加葛藿木名
白朮散治積痛和胃生津止渴
類瀉利將欲成慢驚風者服之
效若神加喬○加枯栝細
芎名惺惺散小兒外感風寒鼻
塞痰嗽發熱痘疹變蒸疑似之
脈皆宜服

按益脾助胃之主藥也○夏
月患瀉瀉時眩暈晝夜飲



水三斗餘加藿木葛舌與數
劑常令食而安○卒滯
手足癱瘓言謔蹇澁加童止
陳發名之八味順氣散尚照
加減求數驗

二條通松屋所書肆武村市兵衛刑行

衆方規矩卷上終

衆方規矩卷之中

香砂六君子

治脾胃不思飲食後致飽悶

茯苓 白朮 木香 砂仁 枳實 甘草
各五

右入姜枣煎服傳方六君子○胃

口有寒嘔吐不止去木益加喬

藿名藿香安胃湯○脾胃者食

後到飽瀉去飽寬脈細去守多

木益加芍蒼預入姜梅煎服○

腹痛去參預加木藷○渴加不

梅○小水赤短加通轉○嘔噦



惡心加藿香○夏月加連翹
○冬月加承氣

按此方治因脾胃虛寒而致
損傷者矣不舉治例切所以
得奇效也去守益加木薑子
前所謂香砂養胃湯

四物湯

治血虛發熱或寒熱往來或
嘔發熱頭目不清或煩燥不寐
腎臟脹或胸膈痛一切補血之本
藥也

右煎服○加知母柴胡治肝脾
腎血虛發熱○午後發熱屬血

分加參伽藍○如熱從左邊起
者打火也○實則加游丹○虛

則加參伽藍○按從睛下起者
陰火也加參伽藍雷會門桂○

夜發熱加雷相連冊杜柴○晝
夜俱發熱合小柴胡湯加連丹

○血虛無汗潮熱合葛藜加姜
或女子血虛有汗潮熱者亦

宜之○瘦人中風屬陰虛火熱
加膝苧栢○左半身不遂手足

癱瘓加羌紅瀝姜汁○多思慮
以致血虛五更特帶糞加莎丹

連翹○血虛陰火冲上頭痛加
酒灑冷蘆連丹○臍下虛瀉腹



痛者本方加索練各一各之

四物苦練湯○因挫閃跌撲致

死血流本經而腰痛加嬰紅方

○因房勞而腰痛加雷栢會仲

○鼻衄加側○癩血合五苓散

○下血因寒久不愈加升承棕

灰○血痢加膠朴艾○太便秘

結加嬰虎○小便秘澀加澤通

○血氣痛五心熱加發官○五

心煩熱加苳柴錄酸合○口乾

煩渴加門葛梅○咳嗽加來杏

麻○頭眩加羗細○不思飲食

加秋多蓮○面色萎黃加陳莎

姜○心氣不足恍惚加速酸辰

○虛癆不睡加膏參淡竹葉○

金瘡出血過多加參芪○經水

將來作痛者血實氣滯也或心

腹連腰作痛加連莎嬰紅索牡

茂童○過期不來作痛者血虛

有寒加菴紅莎桂茂通方其○

先期來者血虛有熱加苳莎連

膠栢雷甘艾○過期而來紫黑

成塊者氣鬱血滯加菴紅牡童

滋索其○經水去多久不止發

腫滿者脾經血虛加木苳砂腹

木棟朴軾猪通滋索膝其○經

水月久不行發腫者瘀血滲入

脾經加菴紅牡永桂枳木莎膝



索去中 ○先期而至血紫有塊
 腰痠痛手足冷痺口乾頭眩加
 芩荆蒞苗索續仲卯芩 ○錯經
 妄行於口鼻者火載血上氣之
 亂也加芩丹犀膠芩門陳 ○經
 水行後作痛者氣血虛合四君
 加永炒 ○過期而來色淡者痰
 多加陳守芩甘姜 ○適來適斷
 或有伴來寒熱先服小柴而後
 以此湯和之 ○肥白人經水過
 期者痰多用二陳加星蒼滑芎
 介蒞 ○經水過多及不止者成
 血崩加介伽膠芩丹卯蒞蒞其
 ○骨蒸勞熱加錄雷柴芩 ○姪
 娠胎動不安下血不止加艾膠
 芩 ○風虛眩暈加儿菴 ○發熱
 心煩不得眠加連丹 ○虛寒脉
 微自汗氣短自利加永 ○經水
 過多加芩伽 ○經水滿少加葵
 紅 ○赤白帶下加蒞蒞 ○血虛
 虛冷崩中去血過多加膠艾 ○
 婦人血積血瘦加稜皮桂乾漆
 ○胎漏下血腹痛加膠芩伽砂
 蒞艾火梗 ○子腫者面目虛浮
 加芩澤伽芩丹門材其 ○產後
 發熱加柴芩錄 ○虛渴加參梅
 葛瑞 ○小兒生下遍體皆黃加
 舌兒與母俱服之 ○小兒齒久不生加



預沉其為未擦齒快識下蓋湯

○小兒血熱生瘡遍身腫痒加

芸苓○小兒尾骨節痛者陰虛

加酒瀉或桂火或西蜜為引如

痛不正加乳沒○加棗去芍名

增損四物湯治產後陰虛發熱

或日間明了暮發寒熱○去芍

加參永其入姜亦名增損四物

湯治產後陰陽不和如有惡露

未盡停滯胞絡亦能令人寒熱

但小腹急痛為異產後陰陽不

條寒乍熱去芍去芍加羌芸苳

細正著牛膏各加減四物湯治

產後血虛氣弱痰癖寒厥背冷

頭痛○如有汗者氣弱頭痛加

芍桂姜○痰癖頭痛加守苓姜

○熱厥頭痛加芷膏蠶○寒厥

頭痛加天雄附姜○加陳今丹

令定各等參茸各減入姜棗是

亦名加減四物湯治癩人頭眩

若屬血虛痰火也○四物加苳

藥破入姜棗各調氣養血湯專

治婦人室女血氣不和胎前產

後諸病○氣痛加吳○痰盛加

二陳湯此方切蓋婦女以血為

至殊不知因氣不調然後血脉

不順故生諸病

按補益血虛之主藥也予連



年血虛發熱挫跌撲月水
調理鼻衄下血等照加減取
奇効且四物苦練增損四物
調氣養血等湯切得數効猶
有加減之法也

四物調經湯

治婦女或十五六歲經脈不行
日夜生寒熱手足麻痺飲食不
進頭痛惡心嘔吐腹中結塊
動痛者此誤食生冷傷感而致
也

茯苓 芍藥 熟地 當歸
各八分 各八分 各八分 各八分

右入姜葱水煎服○遍身痛加
羌活○咳嗽加杏仁○肚痛加
乾漆○瘧加果慳○泄瀉去枳
加術

按此方全愈證治三五人也
其外調經水則與調氣養血
湯而得數効

八物湯

治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發
熱或煩燥作渴或寒熱昏憒或
胸膈不利大便不實或飲食少
忘小腹脹痛或口舌生瘡或齒
齦腫潰或便血吐血盜汗自汗



等

參 伽 令 琴 燈 琴

各一各 其五分

右入姜枣煎服○氣弱臍痛脉
 細緊或弦多從勞役怒氣得之
 加蜜童或加官○孕婦由由氣
 怯弱不能塞胎胎屢其胞胞繫
 了於而小便不通謂之轉胞合
 二陳煎湯探吐之所以升提其
 氣上竅通而下竅自利也○產
 後子腸不收加升芩以酒炒蒸
 為君○小兒解懸者用八珍若
 有熱加連煎服更以麻繫束及
 以白飲未代之

按四君四物二合之并故蒸
 氣血兩虛者勿用之○心中
 惕惕然而跳動謂之怔忡加
 酸連門煎湯調辰末服得蒜
 勃○產婦大便七日不通加
 檳桃而得卒効○一婦滯泄
 帶血懈懈不食去苦加木而
 二十餘貼得安全

附十全大補湯

治氣血俱虛發熱惡寒自汗
 汗肢麻倦怠或頭痛眩暈口乾
 便溲久病虛損遺精白濁二便
 見血小腹作痛小便短少大便
 乾澀或咳而不利虛勞諸虛不



足五勞七傷飲食不進

○八珍湯加熟地各一斤

右煎服○氣血俱虛陰陽並損

加連○發熱加柴○嗽加會○

痰加守○汗加麻○虛寒甚加

附和○骨蒸倍加柴○氣弱加

參○惡寒加桂○脈熱加錄○

虛勞發熱加柴錄○不時而

熱或無定處或從脚心起此無

機虛火也加會門○虛弱之人

遍身痛倍桂加守○久病虛損

眼自昏翳見物不明久服無內

外二障之患加參附姜棗○

產後虛勞四肢煩疼時發寒熱

不思飲食加續會門姜棗○凡

瘧病有出汗多變瘧有因去血

過多元氣虧極或外邪相搏以

致牙關緊急四肢痙強或陰火

內動或腰背反張肢麻搖擗若

有汗而不惡寒者曰瘧瘧若無

汗而惡寒者曰剛瘧由去血過

多筋無所養故傷寒汗下過多

濃瀉膿血太泄多患之乃敗症

也急以此湯治之姪不應急加

附

按此湯治諸病屬氣血兩虛

按寒者也○骨蒸勞熱加錄

平分是他家之秘也○男婦



氣血虛弱而眩暈加陳守定
○食積痢或時赤痢或時水
瀉或完穀俱出加漣曲澤宇
膠礞芫美○一切瘧病欲死
者刺項髮際正中而出血且
其上灸三三壯而麤尚可用
此湯殊傷寒汗下過多後或
全瘡產後去血過多後或諸
瘡膿血太泄後間成瘰癧時
時以此湯得救矣○產後諸
虛百損五勞七傷自汗盜汗
諸熱亦然○手足麻痺或疼
痛去膠加陳守芫膝羌附○
夢遺精瀝屬氣血虛損加山

治一切瘵飲化為百病

二陳湯五

陳守各五冬苓三冬甘草
右入姜煎服○偏頭痛在右加
芎芷芸薹升在左合四物湯加
荆蒟細蔓柴冷○項痛加芎本
升柴蔓細蒟○痰在腰膝下
腫痛加蒼離通栢解膝○痰在
胸腹中作痛或痞滿加伽曲芽
砂○痰在脇下作痛或漉漉有
聲加柴青芎芍○痰在經絡中



或胸背手足臂膊作痛者在上
 加芸菴葳○在下加離膝通○
 冬月加烏附行經○風痰壅盛
 喘急咳嗽不寧加芸菴星枳皂
 ○熱痰為病腹脹喘滿加芩連
 丹婁滑膏瀝○濕痰身重倦憊
 加蒼伽星○寒痰加永附漏益
 ○氣痰加蜜枳砂積蕤苳○燥
 痰加薑杏貝會○陰虛咯血痰
 嗽加天麥二時龍栢貝欬芩○
 氣虛有痰加參伽○血虛有痰
 加斤天○帶血者加芩芍○咳
 嗽白痰者肺之風寒也風痰加
 星檉芸實○寒痰加永官附○
 食積痰加曲菝實連○痰飲
 者痰在胸膈間痛有聲加菝砂
 萋實片芎蒼童白茶○痰涎者
 渾身胸背膈痛加白茶砂蜜苳
 菝實斤泠○濕痰流注者渾身
 有腫塊加萋枳蒼泠菴芸翻斤
 莎砂蜜紅瀝姜汁○脾虛生痰
 加參伽芍實砂桔○酒痰加葛
 枳砂曲芽○飲酒嘔噦吐痰加
 砂梅○痰瀉者或多或少或瀉
 或不瀉脈沉滑加蒼砂預車通
 朴姜梅炮○若瀉不止去甘加
 誼衍○肥人頭痛者氣虛濕痰
 加參朮細芎芷菴桔荆○瘦人



頭痛者血虛痰火加地斤芩芎
細羌桔○腹中水鳴因熱而痰
者痰飲加芩連丹○痛甚加承
炒○腰背重注起痺痛者是痰
加蜜苧乳索砂蒼菴冷斤伸○
風寒濕流注經絡而腰痛加麻
蒼芎芷芸菴○濕痰流注腦內
作痛加星蒼弓姜○癰後飲食
少進四肢無力面色痿黃合四
君子湯加連實姜○開格上焦
痰壅兩手脈盛加星枳實○大
小便不通皆是痰膈中焦氣滯
於下焦加通○痰鬱火邪在下
焦大小便不利加弓升芸柴謂
之升發二陳湯○噎氣胃中有
痰有痰者加秘多蜜益實連枳
蒨○眩暈嘔雜火動其痰加丹
芩連○胃口有熱時作惡心加
連芩姜是得○婦人帶下屬濕
痰者胃中痰積滲下滲入膀胱
加二朮升柴云氣虛合四君
子湯血虛加弓斤

按此方治痰之聖藥也隨證
而照加減以無不洽痰飲也

附 加味二陳湯

治一切癰病○發於痰火則宜
用沉香天麻湯芩 枳 陳
實 桔 丹 守 芩



各一銖五分 辰五分

右入姜煎臨服加瀝姜汁磨木香調辰砂末同服

附加味二陳湯

治痰厥運倒

陳守 苓 斤實 桔 杏 絡一 良

砂 絡七 蜜 官 甘 絡三

右入姜煎服○氣逆加戟○元氣虛弱去實

附枳櫛二陳湯

治涎在心膈上攻起腰背嘔噦

大痛

實 砂 守 陳 菠 絡一

枳 櫛 蒿 索 絡八 蜜 漏

永 淋 絡 廿三分

右入姜煎加瀝磨木香服

附香砂二陳湯

治傷生冷冰桃水栗瀝味魚鱉

一應寒物而胸中痞滿

陳 菠 絡半 苓 一 守

砂 曲 甘 絡六

右入姜煎服此方傷食之主藥尤能消食予連年與此湯取效難勝計者也

按巴上四方切得數莖故別立方鑑備倉卒之搜覽者也

五苓散 六

治汗後中暈煩燥小便不利而



有熱加連梅會此藥○飲濟伏
暑鬱發為癰煩渴小便不利加

附
加味四苓散

火瀉者腹痛一陳瀉一陳後生
如湯後重如瀉瀉下赤色小水
短赤煩渴脉數是也用此湯

丹 陳務甘 每 蒼
右入煎草煎服○飽悶加枳破

去預○腹痛去伽加枳蜜茵

○嘔噦惡心加藿梅蓮破參○
小水短赤去澤加通車○口燥

煩渴去澤蒼加連門蓮梅馨○
瀉多元氣虛脆昏倦去澤蒼加

參芪○夏月暑瀉加藿藪○瀉
多煩燥去蒼澤加連參辰梅○

瀉多不止去澤丹加初參○發
熱脉數加柴苓

按治濕之劑殊禱小水不通
或泄而可與此湯也四苓散

治火瀉熱瀉發熱五苓散治
濕瀉退下濕柴苓湯治癰疾

寒熱皆其功有數多故不舉
治痢而可知者也

胃湯 七

治脾胃不和暑濕傷飲泄瀉腹
痛水穀不化陰陽不分不伏水



一切治泄瀉之總司也

蒼 陳 朴 猪 伽

苓 澤 瀉 連 甘

右入姜棗煎服○氣虛加參○

虛寒加永炒○水瀉加滑○食

積加曲芽查○痰多加守○勝

濕加芸升○暴痢赤白相雜腹

痛種急後重加木枳○久瀉加

升○腹痛加官○黃胖者飲食

無味四肢無力行步倦怠脉瀼

而濡是也減桂加藿守腹查藟

稜莢童○脾胃不和而黃腫去

芍連加桂如小便赤澁加滑

按此方五苓散與平胃散等

衆故傷食之泄瀉專可用焉

若瀉不止加訶○夏月之泄

瀉去桂加芍連子常桂芋菰

用之何者桂大腸之引經也

○夏月雖先瀉下而後澁滯

當用此湯○夏月瀉下身冷

脚乾不欲衣披伏熱在內故

合解毒湯而安○夏月患痛

風按因暑濕而身躄骨節痛

故用此湯而愈○水腫小便

澁少大便結是乃食滯與濕

熱所爲也加枳曲查砂腹菴

入姜燈煎服而安○或語云

此方四五月至八九月專用



乏何難治暑濕之故也

芍藥湯 八

治下痢赤白初起積滯不行裡急後重頻上臍而去則少腹痛

芍仁片 連 芩絡 鹿社

栝 蜜 桂 甘絡五

右煎空心服回春去虎桂加栝

○後重窘迫甚者倍鹿加芒

○瘕滿氣不宜通加實

○下血加栝

○壯盛人加鹿

○虛弱人去鹿

○按用此方而行血則便膿自愈和氣則後重自除

附調和飲 治紅白痢○下痢積久者宜調和

芍仁 栝 蜜 連

芩 絡 一升

右煎空心服○紅痢依本方○

白痢加吳

○赤白痢加芩

陳茂絡一○按治諸痢用通利

藥後未愈直服此方調理而愈

附參歸芍藥湯 治痢久二十日去多不止者

芍半 參 斤 苓 預

陳絡一 砂社甘

右入燈草檳蓮煎服○禁口痢

不食者胃口極熱加連參蓮梅



癩 ○腹痛禪急後重者是熱積
氣滯加蜜板 ○未除者加升少
○痢作痛者熱流下加芩炒 ○
痢後發熱不止或虛啞努力者
俱是血虛倍加斤芍芩 ○積中
有紫血是瘀血加芍紅 ○按
下痢久不止者用此方宜調養氣
血

按三方皆治痢之主藥也初
痢宜芍藥湯日久不止用調
和飲氣血虛弱者參歸芍藥
湯

脾胃虛而膿血不止者胃風
湯以見癩痢兼作者柴芩湯
若求愈則宜用和中湯不有不
愈者也

附和中湯

痢疾百方不應脾胃虛弱而
下如醬油脉弦數或白變紅痢
者專可用此湯也

- 餘大枳 枳 童 葵
- 砂 蜜 永恪 甘少

右煎服 ○此方產前後痢症得
數奇
又方和中湯不效則宜此湯必
有奇效

- 餘三斤 芍絡二 嬰五分



栝 蜜絡 一周 七

右煎服○此二方東井叟之配劑也

一婦新產十餘日後腹發熱微痛大便不通去風加枳芩四五貼而愈又一婦患前證故前劑三貼而下滯血更得平安

連解毒

九 黃連解毒湯也

治大熱不止乾嘔煩渴鏘語喘喉不眠或傷寒汗出下後熱不遑諸般積熱實火者大效

道冬芩 栝 丹絡二

右水煎○腹滿嘔吐或欲作利

者加守 栝 朴 芩 絡 二 姜 片 ○ 三

焦實火內外皆熱煩渴小便赤

口生瘡加翻芍柴絡等○狂亂

喜笑不休者此心火盛先行吐

法而後加守 瀝 飽 藜 姜 汁 ○ 臍

毒下血者必在 藜 後 名 遠 血 加

翻 槐 細 茸 謂 之 八 寶 湯 ○ 婦 人

赤白帶下屬壯盛而有寒熱者

合四物湯加倍連尤效

按清熱之劑也○三十餘歲

婦人崩漏如瀉身熱口渴合

四物湯煎湯與棕灰而安○

又孕婦有先證合四物湯加

升伽而安



白虎湯 十

治傷寒汗吐下後心胸煩躁渴
欲飲水而脈洪大

膏兩 雷一 牙分 梗合

右水煎○熱盛煩渴不止及發
赤斑脈虛加參一名化斑湯○
一方加芍○大便不固熱不退
加蒼○脈尺寸俱長汗大出身
如水石加桂○老幼及虛人昏
昏譫語或小便澀起即無度或
煩而不眠加丹○上焦煩渴而
不欲多食謂之高澹加參仁或
加升相○瘧疾表裡俱熱時時
惡寒在汗而大澀口乾加參

按此方除熱之劑也○夏因
暑熱而遺尿加參柏○一男
熱不甚大便瀉不省人事脈
浮大無力背出斑是死証加
參蒼取驗而後小柴胡湯合
四君子湯而調理則全愈

理中湯 十一

治五臟中寒嘔失音四肢轉
重兼治胃脘停痰冷氣刺痛及
臟毒下寒泄利腹脹大便或黃
或白或黑或有清穀

參 仙炒 棗炒 甘灸

右入姜棗煎服○若為寒氣濕
氣所干者加附名附子理中湯



若中附毒者，甘草乾姜等分，或
黑豆煎湯解之，不可不知也。○
霍亂吐瀉，加童陳，名治中湯。嘔
吐者，治中湯加喬守姜。○泄瀉
加陳，名補中湯。○瀉泄不止
者，補中湯加附。○不喜飲食，米
穀不化，加砂附陳。○霍亂吐
下，心腹痛，手足厥冷，去伽加附。
名四順湯。逆瀉，四。○心膈急痛，
手不可近，加實茶。○渴欲飲水，
加瑞。○霍亂轉筋，加膏。○臍上
築者，腎氣動也，去伽加桂。○悸
多加苓。若寒，加水。○腹痛，去伽
加附。○飲酒過多，及炙煇熱食，
發爲嘔，加芎。○腹滿下利，脉沉
遲，而微，加附。○瘧冷症，加附桂
苓。○胃寒嘔吐，清水冷涎，脉沉
遲，加苓附官薑香守砂姜梅。○
若寒極，手足冷，脉微，吐不出，加
附去官。○噎氣有胃寒者，去參
加蜜，益陳朴菝。○蛇厥者，胃寒
所生，加椒楨。○口舌生瘡，飲食
少，思大便不實，此中氣虛也，手
足冷，腹痛，加附。○躄虛感雨濕
而嘔吐，加童陳守姜。○去芎加
陳守入姜煎服，治胃氣虛寒，作
惡心，亦治船暈。

按此湯治寒之劑也。○乾薑



亂心腹絞痛不吐瀉足冷脈沉欲絕者先用鹽湯探吐而後加麥朴蒼砂菴蜜枳陳桂腹痛額頭黎黑手足收強脈無氣以息者此中寒暴死也加附○臍膈停寒腹痛身怯泄瀉青黑不止加陳麥苓桂梅○若幾極手足冷脈沉細去桂加附○腹痛滿去參加砂朴木嘔噦惡心去桂加喬守○瀉不止加蒼預○虛汗去藿桂加芪○飽悶去桂加朴砂○飲食不節過食生冷腸鳴泄下加重陳砂○急陰

證手足冷指甲青心腹痛囊縮加附陳守喬苓多曲沉入姜棗鹽少煎服如急陰不省人事用鹽填臍中灸艾灸之以醒為度○傷寒自利不渴寒多而嘔或腹痛下利霍亂吐瀉手足厥冷者用附雖諸證皆退而吐不止則百無一生

七氣湯 十二

治七情所傷及勞役飲食不節滿悶短氣

守 五 參 桂 甘 絳

左入姜煎服○七氣心腹刺痛



加索乳各加味七氣湯婦人猶加考斤絡一

附大七氣湯一名四七湯

治七情不節致臟氣不平心腹脹滿又治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮在咽喉間咯不出嚥不下及中脘痞滿上氣喘急

守 芍 芩 細 朴 蘇 仁

右入姜煎服○七情所傷鬱結臟腑氣不和平心腹痞悶加菝葜○七氣鬱結五臟互相刑剋陰陽不和揮霍變亂吐利交作加芍藥陳紅參入姜棗

附補遺七氣湯主方

治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疼痛攻刺脇肋上氣窒塞喘嗽小腹脹大小便不利此方積聚屬寒者宜用也

穉 莖 童 陳 藿 橘 桂 薤 莎 耳

右入姜煎服○心脾痛加麥枳○加菝葜治諸般痞積面色瘵黃肌瘦癯瘦四肢無力皆緣內有蟲積或好食生米或好食壁泥或好食茶炭鹹辣等物者只此一服除根空心服後食頃腹心痛當下○七情相干陰陽不



得并降氣道壅滯攻衝作痰去
積加守姜棗○挾冷腹痛七氣
四肢面色青白加守姜棗

按治七氣及蟲積聚之方也

○一、小女患疰腫痛已潰壞

而血多下俄發心痛欲死加

味七氣湯二貼而安○心痛

甚者大七氣湯加梅沉枳切

得竒效○胸支凶蟲而瘦不

食顏色青者指迷七氣湯加

枳而安○常有積之人患癰

寒熱往來腹皮堅張無汗數

方不應指迷七氣湯加永麻

二貼而安○積塊屬寒者宜

指迷七氣湯若屬熱者宜用

柴平湯時時取卒功

加味四七湯十三

治七情之氣結成痰氣狀如梅

核或如破絮在咽喉之間路不

用嚙不下或中脘痞滿氣不舒

快或痰涎壅盛上氣喘急或因

痰飲惡心嘔吐此藥最妙功不

盡述但婦人女子患此最多

苓 枳 蘘 粳 守 陳

童 寶 砂 麩 曲 絡 一

錢 枳 益 絡 五

右入姜煎服

按主七情鬱結生痰在咽喉



間吐不出吞不下氣不快者
善消痰飲之藥也○婦人上
氣喘急胸膈痞悶嘔吐白沫
與此湯而安○欬而痰涎在
喉嗑不下得奇効

承心氣飲 十四

治男子婦人一切氣不和多因
憂愁思慮忿怒傷神或臨食憂
戚或事不隨意使抑鬱之氣滯
滯不散停於胸膈之間不能流
暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞
不通噎氣吞酸嘔噦惡心頭目
昏眩四肢倦怠面色痿黃口舌
乾苦飲食減少且漸癯瘦或大
腸虛秘或因病之後胸中虛痞
不思飲食並皆治之

蘇仁童 陳 腹 藥 卷
各五苓 守 芍 通 官
絡三廿二

右入姜棗燈煎食遠服○加枳
椇蒞治氣百病最能辨陰陽
調順三焦其功難以盡述○下
方去芍藥加枯枳木枳蒞莢藿
於憂思鬱怒諸氣痞滿○水氣
面目浮腫加猪澤車瓜門葶○
氣塊加莢○性急加柴○多怒
加苓○食少加砂曲○咳嗽加
桔宇○胸膈痞悶加實蒞○三



焦不和加參○氣閉加藷○氣滯腰加瓜枳○上焦熱盛加
芩○下焦熱盛加丹○翻胃加
沉

按此方散氣降氣之劑故專治氣鬱之主方也○憂鬱得嗽加枳會○因七情而目浮腫腹脹肢腫加猪澤瓜○七情氣結于中心腹疼痛不可忍加枳實少○氣逆上而腰足下焦冷蒼桔湯不効故與此湯切得奇効是乃氣鬱故也○酒浙寒熱盜汗頭瘡咳嗽五心煩熱常心不快至暮虛熱夜不寢脉弦而數似勞證滋陰降火湯不効謂是牢人氣鬱故去羌莖半蘇加枳枳而安○因氣惱成腫氣脹滿此方有數奇○氣不順如痛風一身痛此湯切得奇妙

寬中湯 十五

治七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆遂成五臟之病一切冷氣並皆治之

沙 朴各一 双童 陳 喬
砂 絡 四 多 紅 甘 紅 蜜 紅
右為末姜鹽湯點服○七氣沉



滯飲食不下，氣滿膨脹，宜此湯。

按治七情鬱結之方也。○好

酒之老僧頭重，胸膈痞滿，不

食，厭食則欲嘔，數方不應，加

連翹煎服。○少女十一歲從

六月初至七月下，四腹痛時

止時發，今痛甚，出聲響，降五

日絕穀，大便結如咽，有芒加

枳朮為煎服，一貽而痛減，三

日而向食，氣五日而大便通

得安全。○女子十七八歲因

氣惱而吐血，心腹刺痛，堅如

石，冷如冰，雪經水四五箇月

不通，脈沉緊而數，無醫束手，

故予加蘇葵承煎服，得奇妙。

順和湯 十六

治嘔吐翻胃，噯雜吞酸，痞悶噫

氣，臍心腹刺痛，惡心吐痰水。

陳菴 荜 丹絡一 伽八 苓

守絡七 連 曲絡六 實五

砂三 其八

右入姜長流水煎入，瀝姜汁重

便溫服。○氣虛加參芪。○血虛

加芍斤。○氣燥或氣不舒暢加

葵蜜。○胸膈飽悶加藜。○心下

嘈雜醋心加吳倍連伽。○嘔吐

不止加養

按順氣和中之劑，善治瀉痛。



避上氣消食積，殊以主胸中
有濕熱鬱痰而煩悶嘔吐，或
嘈雜吞酸者也。○飲酒之人
食滯穢物，腹痛吐瀉不止，去
寬加養永得奇效。○夏月胸
痛吐血，是氣惱之人，故倍連
加蜜而安。○小兒七八歲因
咳而面赤，痰如線而不絕，此
湯二三貼而愈。○一婦人送
干夫而面赤，胸塞酒浙寒熱
時妄語有乾嘔，加柴苓而如
故。○常飲酒從去秋吃逆，至
今春不止，且胸痛痰支不食，
惡寒今驚水穀不通而迎干，
言酒毒而此湯三四貼得大
驗，其後依躰倦去實加參而
愈。○瘧間日發不食，口苦乾
嘔熱多寒少，他療不效，加柴
苓珍板一貼而瀉。○七十餘
歲，尼飲食俱以卒吐甚，胸痛
脈沉細，加喬蜜而得安全。

防風通聖散

十七

治中風一切風熱，大便閉結小
便赤澀，頭面生瘡，眼目赤痛，或
熱極生風，舌強口噤，或鼻生紫
赤，風刺癢疹，而為肺風，或為風
厲而世呼為大風，或勝風而為
痔漏，或腸鬱而為諸熱，謔妄驚



狂眩皆治之

芸 芎 斤 芍 彪 芒

翹 藜 麻 荆 伽 丹

降 半 鬱 楮 本 醉 滑 兩

一方去芒加膝參守

右入姜煎○自利去芒虎○自

升去麻○飲酒中風身熱頭痛

如破加葱白○咳嗽喘急加守

桔莖○耳鳴因酒過加柴枳桔

重星劑○癩疹通治如身疹加

蒼差○痰嗽加守○一切大風

癩狂加嬰地牡○兩耳聾者厚

味動胃火加酒煨虎○膽移熱

於腦則辛頰鼻淵加荷蓮○頭

癩偏腫連一白如半壺其脉洪

大此風乘陽明經氣血俱多風

腫去芒虎加姜葱豉煎服取汗

以草莖刺鼻中出血其腫立消

○冷風熱瘡疥癬久不愈○疥

頭瘡用本方為末酒浸焙乾凡

三次食後白湯調服日三服至

頭有汗効○小兒身常發熱風

斑及脚指紅腫去芒虎加加連

為末服

按此方雖古法用表裡客熱

三焦實火而其實火用黃連

解毒湯腸胃實熱用大承氣

湯風熱症專用此湯○或語



云春夏專用通聖散，秋冬專用五積散，是乃時令表裡之方也。○狂亂症解毒湯不效，則用此湯。此湯若不效，則備急圓可也。○打撲者，倍斤虎加紅沒。○疥癬楊梅癰毒，良久者，用此湯，間有驗。

烏藥順氣散 十八

治卒中風手足不遂，言語蹇澀，四肢骨節疼痛，肩膊麻痛，筋脉拘攣，及脚氣步履艱辛，婦人血風老人冷氣。

麻 蘇 陳 絡 二 豨 蚕
枳 桔 絡 一 穉 炮 甘 錄

右入姜棗煎服。○寒熱頭痛，加葱白。○身軀不能挪轉，為未濕酒調下。○癰疽之成，瘡薄苛煎湯調下。○中風一身俱麻，加參伽斤門。○久癱瘓去麻，加定芸。○星蜜斤。○口眼喎斜，加連菴。○荳荳歷姜汁。○遍身痛，加斤官乳沒。○臂痛，加菴荳官荳。○背心痛，合行氣香蘇散。加蒼守荳。○脚膝浮腫，加膝搗佳。○腰痛，加膝伸齒。○眼眩，加細荳。○四肢冷痺，加附官。○婦人血風，加荳荳荳。○胸膈脹滿，加荳荳。○虛疰去麻，加荳。○潮熱



去水加茶○二三年不能行食
 獨添寄生湯○柳攀加瓜解○
 濕氣加葶加栝○心腹刺痛加
 面○手足不能起床加續斷○
 陰積浮腫合五積散○臂痛因
 風者或乳婦以臂枕兒傷於風
 寒而致臂痛者宜此湯○白虎
 歷節起注骨節疼痛加瓜沒於
 ○四肢冷痛加附官

按卒中風先用八味順氣散
 六七匙以順正氣次與此湯
 以可順表氣○中風口眼
 斜或麻痺及背麻痺不仁或
 脚膝痿弱或言語蹇澀皆宜

此湯○臂痛冷起手甚艱五
 積散合九效湯未效則此湯
 加羌瓜而安○乳婦以臂枕
 兒則其臂麻痺不仁疼痛若
 因風者宜此湯若因寒者宜
 五積散

八味順氣散 十九

治中風先服此藥以順其氣次
 用治風之藥

伽 苓 薑 芷 陳 葵
 參 苓 甘 木

右煎服○或加犀蜜以攻痰氣
 ○或痰盛加守仁姜桂○氣厥
 者與中風相似何以別之風中



身濕氣中身冷先以此湯

按有四君子湯補脾胃中氣藥也茲去手陽明經風痰通腎胃間氣陳理肺氣童泄肝氣若風在手陽明而肝肺腎胃之氣實者專可用之○卒倒不知人事痰涎壅盛癱瘓不仁舌強不語與此湯開來驗○卒中風醒後七氣佛替而手足厥或癱瘓痺痛者亦聞得奇効○或語云一切鬱病氣弱者效也又云諸病共有少眩暈者用之

導痰湯 三十

治風濕痰一切痰涎壅盛或胸膈留飲痰塞不通

守細 星 實 苓 陳各
木 甘 祥

右入姜煎服○如久嗽肺燥熱去牛加會枳杏○憎寒壯熱頭目昏沉迷暈上氣喘急口出涎沫證類傷寒此因七情內傷以致痰迷心竅神不守舍狀如燈灺加連翹桔梗參伽各一入姜棗煎加瀝姜汁服名之清熱導痰湯○按清熱導痰湯痰迷心竅不省人事一服立省真神方也○一方清熱導痰湯去棗



類極參加斤蜜格五名加減導
痰湯治中風痰涎壅盛不能言
語牙關緊急有熱者也

按卒中風先此湯或八味順
氣散烏藥順氣散選用而後
尋治經絡臑腑左右之方而
當療○痰嗽喘急咯吐不成

加桑軼而安

戰降氣

三

蘇于降氣湯也

治虛陽上攻上盛下虛痰涎壅
盛

軼

守格五桂

陳格

西

朴

其格三

右入姜枣煎服○治虛陽上攻

喘促咳嗽○治鼻衄不止

按治虛陽上攻喘促咳嗽足
冷者若足不冷者無十分之
功○水腫脹滿痰喘氣急欲
絕者間與此湯得奇効若雖
得奇而心脾困乏者不治也

小續命湯

三

治卒暴中風不省人事半身不
遂口眼喎斜手足顛擗語言蹇
澀肢麻痺精神昏亂頭目眩
暈痰涎壅盛筋脉拘攣不得轉
側及脚氣緩弱不能動履屈伸
諸風服之皆驗東垣曰中風自
汗者不可重發其汗故此藥亦



不可輕用也

芸半 麻 離 桂 苓

附半 芍 芎 參 絡 一

附 井 絡 半

右入姜棗煎服○精神恍惚加

補遂○骨節痛有熱倍芍去附

○心煩驚悸加犀○骨節痛有

寒濕倍加桂附○嘔逆腹脹倍

參加牛○燥悶大便澀去附倍

芍入瀝○臍寒下痢去離苓倍

附加木○自汗去麻杏加木○

脚膝酸加膝解○身疼加九○

腰痛加嬰仲○失音倍杏○中

風無汗惡寒加倍麻芸杏○中

風有汗惡風倍加枝芍杏○中

風身熱無汗不惡寒加雷膏去

附○中風身熱有汗惡風加葛

官苓○中風無汗身涼倍加附

加永○中風有汗無熱倍加桂

附其○中風破節攣痛不仁加

羌翹○治脚氣二症之通用也

○產後中風脚氣最爲要藥然

手足攣攣者當去附

按不可用多汗者大抵身冷

或四肢厥冷而拘急不仁者

宜○一婦二十餘歲產後三

十有奇日腰足冷腹痛甚膝

脛不伸脈沉遲加附得奇效



天秦龍湯 三

治中風手足不遂舌強不能言
用之養血則筋自榮

龍 羌 獨 芩 芷 伽
膏 芩 地 牛 芍 絡 二
苓 知 苒 細 甘 絡 半

右煎服○天陰雨加生姜○春
夏加雷○心下痞滿加實

○治血弱陰虛不能養筋筋燥
而手足不能運動指爪乾燥屬
風熱甚者

按此方榮血養筋故脉浮大
數而四肢麻木肌肉瞶動則
三歲內當發中風是其為養

生專用此若脉微細者回春
養榮湯可也○俄手足痿腰
不立舌軟不能言者不分左
右專用之也

大防風湯 三

去風順氣活血壯筋又治痢後
脚膝緩痛不能行履名曰痢風
或兩脚腫痛足脛枯名曰鶴
膝風一切麻痺痿軟風濕按虛
之候服之其效如神

伽 半 芩 芸 斤 莖
芍 伸 絡 一 芍 附 絡 七
羌 參 膝 甘 絡

右入姜棗煎服



按治癆瘵之聖藥也此方可治不足之痿痺不可用有餘之風痺前方有膏此方有附當著於心二方也○腰不立身痺痛或痢後鶴膝風專用之而可也

加減除濕湯 三五

治右半身不遂手足癱瘓筋骨疼痛

佛二 蘇苓 斤 赤芍 陳
守 蒼 連 泮 葵
枳 羌 絡 一 芷 欵 參 芍
桔 芩 甘 絡 八
右入姜煎服○身痛加姜黃○

足痛加膝離散

按治氣虛與濕痰兼以久手足癱瘓者也不連年試此方一應癱瘓不相應矣久守專要也次方亦然

加減燥湯 三六

治左半身不遂手足癱瘓咽喉欠噎噴口眼斜頭目眩暈痰火熾盛筋骨時痛頭痛心
游 仁 斤 蘇 芍 伽 苓 星
守 定 絡 陳 塩 地 芩 酸
泠 膝 發 羌 嬰 芸 桂
絡 六 紅 甘 絡 四 酒 三
右水煎入瀝姜汁服○手不遂



倍加芩桂。○足不遂，倍加栝膠。
按治因血虛與瘀血而久，手足
足癱瘓者，也若久，左右手足
皆癱瘓者，血氣兩虛，宜加味
十全大補湯，功驗。

芎藭散 三十一

治腰腿疼，手足不能屈伸，半身
不遂，口眼喎斜，風氣中風，中氣
用風藥而十無一愈，即服之，見
效。

伽羅參 定絡參 泉 菖
童 甘遂 藜 瓜 各三分

右入姜棗煎服。○心脾疼，加苓
守絡三陳，蜜卷絡一入姜煎服。

半日效。

按中風症，風藥不效，則此湯
合二陳湯，數得奇效。又腰腿
痛者，亦得，尚可有加減消息
也。

陳經活絡湯 三十六

治遍身走痛如刺，左足痛尤甚。
左屬血多，因酒色損傷，脈空
虛，被風寒濕熱感於內，熱包於
寒，則痛傷筋絡，是以晝輕夜重。
宜以陳經活絡，血行濕化，此非白虎
歷節風也。

涂粉 游蘇地 蒼 膝 陳
嬰 歲絲 游瓜 苓 芍 離



卷 芸 芷 苓 六 甘 芎

右入姜煎服○痰加星守苓一

○上身及臂痛加桂枝○下身

並足痛加瓜通栢屋徑○氣虛

加參伽板苓七○血虛倍四物

湯加紅糸

按治痛風屬血虛者故遍身

走痛眼輕夜重○懷娠婦人

潮熱咳嗽吐痰盜汗脚足注

痛脉細數滋陰降火湯不效

故此湯去膝嬰得奇效○傷

酒食邪乘經絡虛為痛風與

此湯而安○中風之人周身

或手足痛用上下加味而得

奇驗

御滋寄生湯

治腎氣虛弱冷吐濕地腰背拘

急筋攣骨痛當風取涼避度風

邪滲入脚膝為偏枯冷痺緩弱

疼痛牽引脚重行步難艱並白

虎歷節風痛○虫濕而偏枯冷

痺者腎氣虛也

搗 劑 代 丸 續 膠 仲 丸

細 桂 苒 涉 苓 參

斤 半 芸 各 等 甘 葦 半

右入姜煎空心服○夫腰背者

皆由腎氣虛弱冷濕地當風

得之不速治喜流脚膝為偏枯



冷痺緩弱疼痛或腰痛攣脚重
痺宜急服此○治肝腎虛風濕
內攻兩腦緩縱攣痺弱不仁
足膝攣重又治白虎歷節風神
効

是腰痛之主方也按內虛而
為中濕脚氣痛風腰痛此之
四症並治兼以癱瘓中風亦
取驗

清濕化痰湯

治周身四肢骨節赤注疼痛牽
引腦背亦作寒熱喘咳煩悶或
作腫塊痛難轉側或四肢麻痺
不仁或昔心一點如米冷脈滑

乃是濕痰流注經絡關節不化
故也

星 田 陳 苓 蒼 卷

泠 芷 酸 豨 蠶 分 身 三

右煎入瀝姜汁服○頭頂痛加

芍藥○手臂痛加桂○脚痛加

膝栢離游瓜○骨熱痛甚及有

腫塊作痛者名曰痰塊加乳沒

硝海石

按治遍身赤注痛屬濕痰者故
因痰而咳嗽或腦痛或肩痛
或胸痛皆治○一男有咳痰
而昔心一點如米必與此湯
得卒効



清心抑膽湯 三王

治癩屬氣血虛而兼痰火者平肝解鬱清火化痰除眩暈諸癩之疾

沂 苧 佛 苓 陳 守
實 磁 藜 連 菝 絲 門
苜 參 遠 格 六 甘 絲 門

右入姜煎服

按氣血虛而痰火以心胆故為眩暈為癩在此方主之○百不如心故詩問真偽與人而高聲語或忿怒或罵詈與此湯得數荷○產後血暈心

不實此湯而安

滄梧天麻湯 三王

治因恐懼發癩癩痛癢痰涎有聲且多自睛強項背一時許脉沉微而急方醒後見帶衣人即發多服犀牛腦麝鑿之藥已四年餘此證尚在又添行步動作神思如痴先灸兩膝各二十七壯次服此藥

羌 伍 搖 細 定 共 守 附
絡 三 沉 益 小 烏 絡 二 斤
香 甘 絡 半

右入姜煎服

按救癩癰環證之劑○下人



足厥冷則有小腹蓋上心膈
物而怔忡或膈塞而心中沉
困煩悶如欲絕或食遲則無
力生眩暈心如乘舟連久與
此湯而安○男子下血或痢
婦人產後脫血多失血後有
此證四物湯不効則與此湯
而可若蟲出加練核

清心化痰湯

治精神不守喜笑不常言語
亂妄見妄言登高罵詈

星 守 際 苓 連 沂
地 苒 參 酸炒薑格一
甘仁

右入姜煎服

按治一切癲疾之主方也



衆方規矩卷之下

逍遙散

治血虛勞倦五心煩熱肢麻癱
頭自昏重心忪癩赤口燥咽乾
發熱盜汗穢食嗜臥寒熱如瘧
陰虛勞嗽肌熱羸瘦漸成骨蒸
斤 芩 苓 朮 各一

甘草半

右入姜煎服○五心煩熱加門
籛○經閉加嬰紅○腹痛加索
○胸熱加連冊○氣惱脚痞
加寶童菝○手擅掉加芸荊葑
○咳嗽加會苑○吐痰加守貝



○飲食不消加查曲○發渴

加門瑞○心慌心跳加酸遠○

久瀉加承煖○遍身痛加芸菴

莠○吐血加膠蚌牡○自汗加

酸○左腹血塊加稜莪嬰紅

○右腹氣塊加蜜楨○血虛煩

熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮

熱加苛少雷錄或加苓○心煩

加門羚○嗽加梅欬會○產後

血虛煩熱加苓○婦人患癩疾

歌嚼無時踰垣上屋乃榮血迷

於心絕所致加嬰遠紅於地○

若有熱者合小柴胡湯加地辰

○氣血兩虛無汗潮熱加苛○

子午潮熱加苓連門錄九

轉煖○婦人肝脾血虛發熱潮熱

或自汗盜汗或頭痛目澁或怔

惛不寧煖口乾或月經不調

或肚腹作痛或小腹重墜水道

澁痛或腫痛出膿內熱作渴加

煖姜片苛少煎服○加牡形各

加味逍遙散

按宜厚勞熱嗽有汗者兼以

男子五心煩熱体瘦骨蒸婦

人癩狂月經不調照加戒問

治之○十六歲婦初產過二

七日後面赤肥躄發熱心跳

不食頃刻睡俄驚聲戰兩手



善上擅揮每夜十四五度許
他醫束手於起加鐵陳瀝酸
而安其後右手腿痺痛加蒼
桔槔瓜蒌冷而全愈○壯婦
怯窮瘡發間日數方不應於
是詳問則久月信不來有盜
汗故加錄丹壯得奇效○產
後寒熱往來若此方不應則
與四君子湯間得奇效是陽
生而陰長是也

柴胡抑肝湯

治寡居獨陰無陽色慾心崩而
多不遂是以惡寒發熱全類瘧
者

柴胡 赤芍 各二
芍藥 各半 童便 二
枳實 各半 牡蠣 一
黃芩 各半 甘草 半
地黃 各五

右煎服

按寡婦寒熱往來似瘧或顏
色時赤時青五心煩熱如勞
瘵間與此湯而安此症尼僧
並官女多

溫膽湯

治心虛膽怯顛事易驚夜夢不
寐異像致心驚氣鬱生痰涎或
短氣悸之自汗飲食無味或傷
寒一切病後虛煩不得眠

子 陳 苓 實 各二
枳 各一



右入姜枣煎服

一方 治膽虛痰熱驚悸不眠

去芍加姜各四分煎服

一方 驚悸屬痰火大而兼氣虛者宜清痰火以補虛也治

痰火而驚悸不眠

參 伽 神 沂 澁

酸炒 門 守 實 澁 茹

冊 各等 辰 五分 早 三

右入姜片一匙梅一瀝煎調辰

末而服

加味温膽湯

治病後虛煩不得睡卧及心膽

虛怯 歸重 易驚 短氣 悸 止

守 三 各 陳 二 各 茹 實 各 半

苓 甘 一 各 一 分 遠 慈 參

枳 酸 炒 各 一 分

右入姜枣煎服

按病後虛煩不眠者選先方

得數奇○一人與主君為口

論開戶一年餘心熱煩滿痰

火心攻腹脹嘔逆夜不能寢

他醫皆言陰虛火動而治不

應予謂氣鬱生痰而然加味

温膽湯加連而安○姓婦心

驚煩思不眠温膽湯加參門

柴而安

分氣補心湯

四



心氣鬱結而四肢浮腫上氣喘急

腹炒莎 苓 桔 絡一 通

芎 西 童 枳 廿各七 分半

細 蜜各五 分

右入姜東煎服

按主氣鬱腫脹之方也○咳甚而頭痛面自四肢浮腫腹脹加桑而安

分消湯 五

凡水腫者宜健脾去濕利水
味等分而治中滿成鼓脹兼治脾虛發腫滿飽悶

蒼 伽 苓 陳 朴 實

各一 莎 櫛 澤 腹各八

砂 七 蜜 三 分 另

右入姜燈煎服○氣急加沉○

腫脹加藪○胸痛而點是氣散

去伽加童○腸滿小腸脹痛身

上有血絲縷是血鼓去伽苓加

斤芍紅牡○噎氣作酸飽悶腹

脹是食鼓去參苓加查曲芽藪

○惡寒手足厥冷瀉去清水是

水脹加官○胸腹脹滿有塊如

鼓者是痞散成鼓去伽苓楮澤

加查曲守童近藪○是下

臑氣急去伽加藪草桑○發熱

去莎加丹連○泄瀉去枳加芍



小水不通去米加通滑○飲食停滯去伽加查曲○惡寒手足厥冷脉沉細加官必腰以上腫加藿○腰以下腫去伽加膝栢○胸腹腫脹飽悶去伽加藿按水腫脹滿之主方也以平胃和脾胃以四苓通小便以實腹消腫服以苡砂除食後之飽悶以蜜運氣若氣下腫加升柴朝急屬氣虛加參暮急屬血虛加連介芍芍朝暮急者氣血俱虛宜双補之猶因加減有數奇○小兒面目身浮腫此方一二貼而如

補中治濕湯六

朝寬暮急血虛甚寬朝急氣虛朝暮急氣血俱虛滋腫脹大法宜補中行濕利小便以參朮為君蒼陳苓為臣苓朮為使以芩朮木火加芩以消腹脹氣不運加蜜翁氣下陷加升柴提之血虛加補血藥痰盛加利痰藥隨證加減用之無不効者

參 加二分 小糖 苓 陳
門 斤 通各九 苓 六分
升 各三
右煎服



按纂要正傳等有論無分兩
一溪髮發開而去其木柴加
煎著分兩以治脾胃虛感濕
爲腫脹今世醫以是治腫脹
而不効矣愚能治之蓋有前
謂虛人病後腫脹或虛症脚
氣或產後腫脹皆能有効迨
夏一女產後患腫脹且每曉
痰支嘔驚醒衆士束手愚謹
血大下而血氣虛故此湯三
十餘貼而全愈

赤小豆湯 七

治年少血熱遂生瘡疥變爲腫
滿或癰或渴

赤豆炒斤 薺 澤 翹

赤芍 附 機 梨各等分

右入姜煎食遠服○熱甚加犀

○一方有澤漆

按治血熱腫滿之主方也○

當世之小瘡多生手足至遍

佈太弊或痛故以熱湯洗之

則變爲腫滿喘呼氣急煩悶

小水赤澀或太府結燥加腹

陳苓姜羌若大便結加樞其

得効難勝計○產後遍身浮

腫喘嗽氣急小便澀必去翹

加芎腹陳苓姜七八貼而愈

○或諸云瘧後有此症加犀



而安

五皮湯

治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急

瘦皮 苓皮 姜皮 五加

地骨各等分

右煎服○一升去五加地骨用

陳桑

按治風濕腫滿之方也○熱病後俄面自四肢浮腫短氣喘促用七味而頓愈

十六味流氣飲

治無名惡瘡癰疽或爛

斤 芎 芩 芷 桂 參

蘇 蜜 葵 朴 枳 枳

蘇 葵 枳 枳

右煎服○乳巖加蜜○瘡後餘毒氣滯於陰陽脾經則癰發四肢手脚並膝膺而腫痛宜此方若氣血虛而自利加附太便實加鹿

加鹿

按此方善消無名腫毒○瘡癰或手足凸腫其色赤雖經二三年而黃汁不膿世俗謂之氣腫此湯主之

腫○乳巖中有如小石物而痛名乳核或作妳岩而出膿



血甚痛加童時人有大驗○
 一人患癰癤寒熱往來與此
 湯而安○一人右目下有結
 核擗之即自膿出背與鼻與
 此湯三箇月而愈○壽法印
 云婦人乳房腫痛太惡寒戰
 懷世俗謂之乳風此方有數
 功

木香流氣飲 十

治憂患太過諸氣痞塞怔忡鬱
 鬱脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹
 急或肩背腰脇刺痛嘔吐不食
 臃腫脹面自癰淨四肢腫滿
 口苦咽乾大便閉小便澀

- 陳一分 枳 童 蘇 蔞
- 甘各八 通各四 桂 腹 莪
- 丁香皮 枳 藜 門 蜜
- 各三 藿 藎各二 參 伽
- 阿膠 守 藤 各一

枳

右入姜枣煎服○去苜蓿加沉
 枳殼名二十四味流氣飲治腹
 中氣滯痞悶不快胸膈走痛者
 蠱腫加芩○頭面腫加葱○癰
 腹腫加實○臍至脚腫加桑○
 腫滿加五○厥壅有眩暈本方
 加苜蓿葱
 按治氣鬱腫滿初起也水腫
 有積聚或水腫脹滿二便不



通或肩背胸脇為津癰或腹
脇不食喘急咳嗽而後為水
腫二便共澀或脚氣有妙術
或胸膈痞悶怔忡而腹脹或
氣逆上而耳聾眩暈皆此方
主之也他家專積聚用之○
氣滯腰痛不可轉側服之立
效

木香調氣散

十一

治氣鬱其症腹脇脹滿刺痛不
舒脉沉

芩 蒼 各一
薤 苳 各三
枳 殼 各一
木 香 各一
砂 各五

右入姜煎磨木香服

按治男婦因氣鬱而胸脇痛胸
塞氣下墜不順也若有胸癰
者先可用此湯有數奇效也

廣木瀉堅湯

十二

治中滿腹脹內有積塊如石形
如盤大坐臥不安二便澀滯上
氣喘促通身虛腫

守 七 斤 漏 苓 益
連 各 五 柴 童 陳 曲
澤 各 三 莪 升 紅
吳 各 二

右入姜煎服○渴加薑

按用有積塊而生腫脹甚矣



殊此湯用熱脹而可也若冷
脹當用大七氣湯

升陽補氣湯 十三

治飲食不時飽勞復胃氣不
足脾氣下陷氣短無力不能寒
熱早飯後轉增昏悶癩要眠
怠憊四肢不快懶倦動作五心
煩熱

朴三分 升 卷 檉多 芸 的
澤 苒各五分 地七分 柴

一各
二分

右入姜束煎服○腹脹及窄狹
倍朴○腹硬加礞三分

按此方治食後頭痛少有寒

熱四肢怠憊氣不快欲睡眠
者是乃脾胃虛弱故也

五香湯 十四

治毒氣入腹托裏若有異證於
內加煨

麝 蠶 沉 乳各一麝三

右煎空心服○若嘔去麝加藿
○渴加參一兩 ○一方本方去

香加藿翹各一兩 名小五香湯

附 五香連翹湯

治一切惡瘡結核癰腫疔瘡

瀉三兩 翹 扇 升 寄無水
搗 通 乳各三分 青 木



牛各一 麝一分

右煎空心服利下惡物為度

附加味五香湯私方

治瘡癤無名腫毒擊小兒用之

麝 蜜 乳 香 麝 升

葛 翹各一 通 虎各五

右煎服○小兒體弱此湯拂出

熱湯而服

按大人小兒瘡毒入腹則托

裏之方也毒法印和五香加

麝童生而常與小兒即盛脾

胃止吐逆清心火治蟲積癩

瘡癬痘疹

養氣六方 十五

桃仁養氣湯 治瘀血分腹急

痛太便秘不利小便自利或譫語

口乾遍身黃或血結胸中手不

近腹或寒熱昏澁其人如狂

虎 炒一 麝 五 廿 二 桂 各

右入姜煎五匙服

三一養氣湯 治消渴胃中有

熱

虎 均 朴 實 廿

右煎服

調胃養氣湯 治太陽陽明不

惡寒反惡熱邪在中焦作滿不

便秘譫語嘔噦

虎 六 各 廿 二 芒 各



右止三味水煎入芒再煎一沸服

小養氣湯 治六七日大便不通潮熱譫語腹脹滿悶而喘○下痢赤黃內煩喜飲冷水小便不稠者先用三服瀉滌而後調治之

虎 二 朴 實 各 一

右煎服以利為度

大養氣湯 治胃實譫語五六日不大便腹滿煩渴舌乾口燥目瞤發熱脉沉實

虎 七 半 朴 實 各 一 芒 半

右先煎實朴去粗內虎再煎去

粗細芒更煎一二沸服以利為度○瘧疾寒熱轉大者從卯至午發宜柴胡湯從午至酉發者邪在內宜大養氣湯從酉至子或至寅發者邪在血宜桃仁養氣湯下之微利後更以小柴胡湯撤其邪可也

加味養氣湯 治瘀血內停胸

腹脹痛或大便不通

虎 芒 各 二 實 朴 斤

紅 各 一 甘 五 分

右酒水各半煎服病急者不用換養氣之類可用壯盛人不可用虛弱人若不辨虛實則



誤多○驚癆癩下風而與之
則得卒癩

京騰散 十六

治表未解，汗入裏，下證未全，慄
慄不眠，三焦實，火煩渴，口舌生
瘡，謔妄，便溺閉結，發斑，黑睛，或
治上焦熱甚，陽明少陽之氣，中
血藥也。

翹四丹 鹿 荷 苓 各二

芒 各五分

右水煎○或入竹葉生蜜少煎
食後服，加姜亦可，或作末服○
東垣加桔治諸般熱退六經
實火○肺金飛熱嗽痰加守○

咽喉腫痛涎嗽加桔荊○咳而

嘔加守姜○鼻衄嘔血加斤芍

芩○淋瀝加滑苓○風眩加芎

藎膏○酒毒加葛連名清心湯

用蜜竹葉同煎○斑疹加葛荊

赤芍芎芸桔○陽毒發斑加斤

○咳嗽加桑杏桔○結胸心下

滿加桔枳○謔語發狂踰牆赴

井背陽熱極盛加連栢赤芍○

眼生翳障赤澁流淚加菊賊棗

○本方合四物湯名和散能

益血泄熱

按除積熱實火之劑○一婦

謔言發狂晝夜不眠不能

閉



飲食與則食不與則不食
大便秘脉細緊而數四物湯
加連四十餘劑而愈

十味香薷飲 十七

治伏暑身體倦怠神昏頭暈吐
利

薷多參 陳 伽 苓 莖
瓜 朴 扁 甘 各半

右煎服○暑嵐去莖加羌一名

○脉虛弱加參此三味各

○心煩加連翹○胸脹加枳椇

○夾痰加星守○嘔吐加藿姜

汁少○渴加葛藟○有搖擻加

卷

換伏暑遊散之劑○夏月休
倦頭目昏暈腹痛瀉下甚得
數劑○夏月煩熱頭身痛小
水赤去參莖加連羌而安○
夏月身體四肢倦怠晝夜汗
出如浴喘乾心煩加連翹而
安

清暑益氣湯 十八

治長夏濕熱蒸入四肢困倦精
神短少懶于動作胸滿氣促肢
節疼痛或氣高而喘身熱而煩
心下膨悶小便赤而數大便瀼
而頻或病或渴不思飲食自汗
體重



葛 蜜 蒼 膠 各 一 參 仰
 曲 陳 澤 葛 各 五 斤
 門 瀝 蠶 耳 各 三 錢
 粒 九

右煎服○汗多倍其○飽悶加
 砂多○惡心加梅蓮○噎加
 茹○煩燥加辰酸○小水短
 赤加通丹○胃脘不開不思飲
 食加朴多益砂蓮○腰痛加伸
 苗紙○腰酸無力加膝伸○皮
 焦加錄○頭目眩暈加耳○虛
 汗加酸○夢遺加預蛻辰○口
 苦舌乾加丹梅葛

按清暑益氣之劑○一女子

十七八歲夏末羸癯骨立四
 肢倦怠食少肚熱聲啞嗜睡
 形如虛怯脉細緊而數他療
 不效加錄連三下餘貼而為全
 人○一男半歲患頭痛甚
 而晝夜不寢少中頭於枕則
 氣上於氣衝而欲絕故常不
 能睡備藥息捧兩手抱頭他
 治不效予六月初試脉細數
 無力加芎細本酸五六十貼
 而全愈○又一男大腸頭破
 四形如錠甚腫痛下血時六
 月中能加冷桑杏英得音妙
 其後再三發每發皆得



滋陰降火湯不效是以與此湯則能退痰除虛熱得奇效
○一老僧不食只煮湯茶而熱先與香葛湯順和散大半愈然未退故用此湯而全安

此藥實湯

治痰結咯吐不出胸膈作痛不能轉側或痰結胸膈滿悶作寒熱氣急並痰迷心竅不能言○痰喘者喘動便有痰聲○食積嗽者痰嗽如膠咳嗽胸膈結痛者痰結早晨嗽者胃中食積上半日嗽者胃中伏火皆治之

薑 實 桔 苓 貝 陳

各五分
分
右入姜煎加瀝姜汁少服○痰

米不語去蜜加葛○氣喘加桑軼○痰結胸膈久不治成膈癥去桔苓加饒童苗○痰熱加柴○痰火發瘧加門參軼

按治實症咳嗽痰喘之妙方也○咳嗽胸膈引痛加餅而宏若誤而久不治則成膿血而膈生癥也○大抵午前咳嗽宜此湯午後嗽可用滋陰降火湯

東垣加減瀉白散

治陰氣在下陽氣在上欬嗽嘔吐喘急

桑一錄七參 龜 陳 童

各五苓三

右入粳米十煎服

按治虛症久嗽之方也用滋陰降火湯而肺氣弥虛則與此湯有奇効○婦人久嗽不已有咳血而不食脉無力雖清咳湯之證在失血門而肺無火邪故用此湯而全愈○此症與瓜蒌枳實湯則却為吐血慎之

加減瀉白散 世三

治欬而口乾煩熱胸膈不利氣喘促

桑一錄 雷 陳 桔各五

童 細 苓 甘各二

右煎服

按大抵治喘嗽之方也○感胃發執退後咳痰久不止不食尿澀無汗得奇効○久勞咳痰久不止而後成龜胸龜背聲嘎盜汗足冷大便結脉細數與七十餘貽而胸背如常喘止○常患喘之人因氣鬱發尿赤脉浮數加菴杏枳荅而安



老人氣虛作淋加參芪升
按治諸淋之主藥也○久患
淋病項陰蠱腫膿出足常令
加地膝栢力壯翹翁去苓而
安○淋病膿出澁痛朶黃脉
選去苓加地通翹膝力灯

八正散 共六

治心經蘊熱臟腑閉結小便赤
澁降脾不通及熱淋血淋如酒
後恣慾而得者則小便將出而
痛既出而澀以此藥主之

虎 嬰 通 滑 藟 卅
車 甘

右入灯煎空心服○治下集積

熱二便閉澁多澀嘔乾口舌生
瘡腫痛

按二便通利之主藥也○十
人入熱湯則不通澁冷水則
能通身熱為脉沉實與此湯
而安○產後六日患淋病胸
脇痛身熱咽乾合四物湯而
得幸效一男夜必足心熱小
便澁頭中鳴加赤芍斤弓芷
蒞入姜而安

清心蓮子飲 共七

治心中煩燥思慮憂愁擗鬱小
便赤濁或有沙漠夜夢遺精遺
瀝澁痛便赤或酒色過度上盛



下虛心火上炎肺金受尅故口
苦啞乾澀成淋瀝四肢倦怠男
子五淋婦人赤白五心煩熱此
藥溫平清心養神秘精大有奇
効

蓮參各二 芪蜜赤苓各

冬門錄 苓 車各一

茸各一

右入知心五根姜三片煎服○上盛

下虛加酒瀝各一○發熱加柴

荷各一○一方有柴半一冬治熱

在氣分口乾小便白濁夜間安

靜盡則發熱又治口舌生瘡或

口苦啞乾燥作渴小便赤澀或

下瀉不止或莖中作痛○熱治

心虛有熱而瀉瀉之主方也○

不因老壯氣弱常有餘瀝服此

湯久皆驗

滋榮養衛湯 廿八

治身體虛瘦夜常遺尿失禁及

小便頻數

伽 蘇 沂 潯 芪 蜜 各

參 八 益 山 菜 酸 炒 各

甘 分 四

右水煎溫服

附參耆湯

治氣虛遺尿失禁

參 陳 芪 蜜 苓 沂 辛



伽各一 益八 升 桂 各
分 廿三

右入姜枣煎空心服○年老之人虛寒遺瀉者加附

一按二方治遺尿之主藥也○

二十餘歲女子行立坐臥不

知瀉出殊寢數驚悸脉細緊

參耆湯加附三十餘脈而愈

灸開元○去益升桂加芍酸

炒各一梅入東浮麥煎

服治自汗之聖藥也

當歸六黃湯 廿九

治盜汗屬陰虛者

斤 芪 各一 地 半 栝

苓 連 各七

右煎服

附 當歸地黃湯

治盜汗屬氣血兩虛者

斤 芎 地 芍 伽 苓

芪 蜜 各 栝 雷 陳 各 八

參 五 廿三 分

右入東浮麥煎服

按二方治盜汗之聖藥也○

氣虛有自汗宜用醫王陰虛

火動自汗盜汗俱宜用六黃

湯殊以滋陰降火湯證熱甚

者得奇驗○斤芎湯即飲

全大補湯滋陰降火湯等故



氣血兩虛，盜汗甚，以驗。

清暈化痰湯

治諸般眩暈

陳守 苓 各一 實 各一

冷 芎 各八 芷 各七

星 芸 細 各六 其 各三

右入姜煎服。○氣虛加木 各一 參

○血虛倍芎加斤。○有熱加

連 分六

按治眩暈之總司也。○予常

療痰火逆上，胸中煩熱，頭重

足輕，太陽經強，脈弦數，去弓

芷，細加，攝定，連卅而安。又心

懶懶，目暈，吐逆，亦可。

半夏自木天麻湯

治眩暈，眼昏，頭旋，惡心，煩悶，氣

短，促上喘，無力，以言，心神顛倒

目不敢開，如在風雲中，發厥，頭

痛，身重如山，四肢厥冷，不得安

臥，此乃胃氣虛損，傷痰而致也。

陳守 藜 各半 伽 曲

各五 芩 參 苓 精 定

澤 各三 永 炒 二 酒 一分

右煎食前服。

按治頭痛眩暈，四肢厥冷之

方也。○腎虛而上熱下冷，常

頭痛，惡心，嘔吐，心下痞滿，與

此湯而安。



驅風觸痛湯

世二

治諸般頭痛

門冬 一分

羌活 一

精斤 芎

芷 一

本 五分

甘 各三

右入姜煎服 ○一左去本加菊

○左痛加紫地 各一 紅游 各七

○右痛加苾 各一 葛 八 ○正額上

眉稜骨痛甚者食積痰壅用定

分守查枳 各一 ○當頭顛痛加

瀉 本 五分 ○風入腦髓而痛加

荆瓜 各一 ○氣血兩虛有自

汗加苾 各一 參伽地 各一

按治頭痛之總司也

清熱解鬱湯

世三

治心穢即肝熱痛多因氣鬱日

久蘊積成熱而作痛也

丹 二 芎 枳 各一 精

連 各七 陳 承 各五分 甘

右入姜煎服後戒飲食大半

日或加苾 亦可

按此心痛之捷法也

椒梅湯

世四

治心或腹時痛時止面自唇紅

者是胃口有蟲作痛也

梅 椒 枳 實 蜜 莎

砂 鈴 朴 承 甘



右入姜煎服

按治因蟲而心腹痛之方也

疎肝飲 世五

治左脇下痛肝積屬血或怒氣所傷或跌撲閃挫所致或為痛

連 吳煨 二各 柴 斤各半 童

嬰 根各一 芍 芍各七

紅 分五

右煎食遠服

按治脇痛之主方也若右脇

下痛者肝邪入肺故加姜黃

桂陳其生薑

通氣防風湯 世六

治脊背痛不可轉顧者此手太

陽經氣鬱而不行以風藥散之

脊痛項強腰似折項似掣此足

太陽經不通行

羌 獨 各 梔 各 芎

甘 各五 分 藪 三 分

右煎服○如身重腰沉然經

中有寒濕加離 五 分 輕者附 五 分 重

者川烏 五 分

按治因氣鬱而履背脊痛之

方也

羌活湯 世七

治遍身骨節痛者是皆血氣風

濕痰火也

羌 蒼 冷 斤 苓 芍



守 莎 各一
蜜 別 陳 各七
分
其 三
分

右入姜煎服○風痛加芸○濕痛加蒼○熱痠痛加冷薑實歷○血虛痛加地○上痛加芷○下痛加栢蔎○痛甚加乳○發熱加柴○小水短瀦加通

加味八仙湯

治手足麻木或疼痛

沂 洋 苓 各一
各八 芎 守 各七
分 分
膝 各六 羌 各五
分 分
柴 各四 枝 各三

右入姜煎服

按治麻木之主方也 因濕痰而手足麻痛者氣虛也宜用此湯者軟痺○一男上体麻殊舌癢不知酒味此方得妙術○予母七十餘歲咳嗽後舌痺不知飲食味此湯三貼而愈

清熱除濕湯 卅九

治濕熱鬱蒸於脾作五癰

連 苓 丹 茵 檳 澤 蒼 童 游

右煎服○穀疽加稜莪陳砂曲○身熱加柴○小水短赤加栢



○大便實加虎
○胸膈飽悶加
龍苓
○飲酒人加薑葛
○虛弱
人加參

按治驚癇之主方也

清火安神湯 四十一

治驚悸怔忡心神恍惚

斤二分
地 酸
苓 連 分 八
門 年 一 芍
遠 分 七
其 分 二

石入姜煎服

按治怔忡之主方也

清鬱痰湯 四十二

治鬱氣吞酸乃胃中有熱膈上
有痰冷入嘔吐清水等症

陳 守 苓 連 丹 蒼
苜 蔞 砂 曲 查 蜜
其

右入姜煎服

按治吞酸之主方也

消痞湯 四十三

治中氣虛弱不能運化為痞者
飲食痰積不能旋化為痞者濕
熱太甚為痞者

參 朮 苓 陳 守 朴
實 連 砂 澤

右入姜煎服

按治痞滿之主方也

加味犀角地黃湯 四十四



治上焦火盛口舌生瘡發熱或
血熱妄行或吐衄或下血及不
嗽血自來者

犀 牡 各二
赤芍 半
連 芩
地 二各
半

各一

右煎服○如吐血成塊加麝香
嬰女十 ○衄血加丹膠 ○咯血加

丹門栢離斤 ○唾血加丹門栢
雷斤半 ○下血加邱 ○吐血加

天膠

按第一吐血之主方也○衄
血去犀玃加升側荊得奇効
○丁婦人月水火來而止

朝輒吐血加栢肝端而安

秦九越滲湯

治痔漏成瘻下血不在其癢

羌 二各
麻 柴 各五
細 紅 烙

右煎服

附秦九防風湯

治痔漏每自大便時發疼痛如
無疼痛者非痔漏此藥主之

羌 苳 斤 伽 各一
澤 各六 酒 五 虎 陳 各三
柴 升 各三 嬰 各十
火 紅



右煎空心服之避風寒

附主方

治痔瘡腫痛

連 芩 柏 翹 荷 丹

槐 各一 龍 鹿 各半

右煎空心服

附乾葛湯

專治酒痔

葛 枳 守 苓 牡 杏

芩 各等分

右每三冬入黑豆百粒姜五片梅一

煎服

按治痔漏則宜選四方而用

必有數効矣○痔漏痛甚

乾不食大便結脈弦數與

共湯而安○飲酒之人痔突

出而痛甚下血與乾葛湯得

卒効

洗肝明痔散

治一切風熱中眼自而赤腫痛

沂 芎 荷 牡 連 芩

丹 膏 翹 共 荊 荷

羌 蔓 薺 葵 桔

鞞 各 廿

右煎食後服○痛不可忍加

烏○有翳障去芎加蒺藜○風

熱肝火甚去芎加游柴○大便

實加虎骨



換治眼暴赤痛之方也○一
男左眼皆大赤視黑白不分
明此湯得率效○熱痛赤腫
小柴胡湯加虎斤黑豆生不
濕更加苦○暴眼赤初發用
升麻葛根湯加蟬與三貼如
未退用敗毒散加虎尚不退
用五疇寬中湯酒調下

滋腎明目湯 四六

治勞神腎虛血少眼痛○久病
昏瞶者腎經真陰之微也如昏
瞶不欲視物內障見黑花瞳子
散皆血少勞神腎虛也
斤 芎 芍 地 半 各一

桔 參 卅 連 苳 黃

菊 廿 各半 細茶 撮

燈心 團

右煎食後服○執甚加游柴○
腎虛加栝雷○風熱壅盛加芸
荊○風熱紅腫加翹芩○酒毒
加連○翳膜加賊
按治眼久昏暗之方也

遍明神氣湯 四七

治虛火上升，痰氣鬱於耳中或
翳或鳴痰火熾盛憂鬱痞滿咽
喉不利煩躁不安

貝 三 陳 塩 酒 丹 慈 各二

精 仰 侯 牠 枳 連



冷各一 芎八分 蜜 甘各五
右入姜煎加糖服

按氣閉耳聾之方也

通竅飲

治鼻不聞香臭

細芷 共 菴 斤 芎
守 桔 陳 苓 各一 荷

三

右煎食後服

按此方因肺經有風熱而治
之若面白肺虛用醫王加門
丹而可

加味清胃散

治胃火血燥唇燥或為齒齦

或牙齦潰爛作痛

膏 地 牡 芥 連 升
共 煎 各等

右煎類類喉嚨齒齦浮腫痛不
可忍是胃中有濕熱加升
按治牙齒痛之主方也

清涼散

治一切實火咽喉腫痛

桔 二 冊 翹 芩 芸 枳
連 斤 地 甘 各一 荷

半

右入燈心細茶煎服加山豆
根尤效○咽喉乾燥加參
○咽喉發熱加柴○咽喉腫



痛加力多○痰火盛加扇婁瀝
○嘔痛生瘡加力多○極熱大
便實去積加虎○虛火泛上嘔
痛生瘡喉不清蒸加栝雷

按治喉病之主方也

榮衛返魂湯

治流注癰疽發背傷折非此不
能効至於救壞病活死肌與患
於味前之前拔於既愈之後
此藥大能順氣生血故也寔真
神似妙劑

龍不化 斤 通 煎 芷
齒 錢 枳 苈

右酒水各半煎喉流注加獨病

在上食後服病在下食前服○
如有潮熱則裡有寒邪味盡散
加升蘇如此而熱不退加葛○
頭痛加芎姜○氣血盛者減斤
○胃寒生痰加守○熱鬱而成
風痰加桔姜○腦瘧發背在上
者或老人虛弱者並去翁○如
有瀉者不可用宜瀉止而後用
之

按治癰疽之主藥也

升麻和氣飲

治瘡疥發於四肢痛痒不常甚
至增寒發熱陰下濕痒虛人宜
服此



升葛 芷 陳精 桔
半各一 斤 苓 守 枳
承 兪 各九 芍 七

右入姜燈草煎服

按治癰疽之方也

導滯湯 五三

治打撲損傷內有瘀血為痛為腫

芩 各二 芩 枳 桂
各一 近 桃 十二 紅 三
各半 近 桃 分 紅 分

右水煎服加酒蒸大黃一尤效

○治被入打死或踢死灸百會

穴 立 三 立 三 立 三

按治跌傷之主方也

解毒七方 五四

薺菜湯 解諸藥毒浪蟲毒

黑豆 芫 甘 各等

右每七冬水二盞煎八分溫服

升麻湯 治桃生毒助下忽腫

起而生癰瘡狀須刻間大如

穉此即桃生毒也升麻為末

取冷水調二三冬連服之若

洞泄加葱數莖根鬚其腫即

消宜煎平胃散調補兼進白

粥 解砒毒 此毒於肉飯中得之

則易治飲酒中得之難治若

胸作痛則此之若腹作痛則



急瀉之徐服參苓白朮散無
恙

巴豆毒 其證口渴臉赤五心
煩熱利不止永炮連炒等分
為末每三冬凉水調服又寒
水石磨水服

斑毒 用澤蘭葉按汁飲之
乾者為末白湯下

野菌毒 用甘草不拘多少以
麻油一盞煎數沸冷服

河豚魚毒 愈卒無藥急以清
油多灌之使毒物盡吐出為
愈或以白礬為末調湯服
按右方雖未試而備倉卒之

搜覽者乎

紫蘇和氣飲

凡胎前一切諸病宜加減而用
蘇 沂 芎 芩 陳 腹
莎 井

右入姜葱煎服○一方加參氣
虛者亦可○妊娠胎氣不和
上心腹脹痛加蜜○嘔吐不止
是惡阻也加苓加守砂藿曲喬
○胎漏下血加芎井加文砂艾
糯米○如胎漏下血心腹脹痛
者先以芎歸各五酒煎入童便
一服立止○胎氣不固常慣不
產預服此以固胎尤加芎井艾



砂寄伽糯米○臨事胎動不安
及下血欲墜者加芩參伽苓文
并砂○咳嗽吐痰加乘杏貝○
泄瀉加木苓○癰加枳果青良
守苓葛○胎痛加并索文○姪
七八箇月前後面目浮腫加芩
苓澤木苓丹門朴○口噤不省
人事言語錯亂加并守苓門遠
菖茹○心痛加索乳○腰痛不
可忍加紙茴仲○白濁白帶加
芩守苓精蠟龍骨○小便淋瀝
不通加翁車滑○大便閉澀加
地連枳○姪至九箇月加枳文
伽砂名連生散○臨產驚恐氣

結連白不下加枳○孕後覺氣
不舒或腹微痛或腰作痛或飲
食不美或胎動下血及五六箇
月內常服數劑甚妙加芩文伽
砂參并

按胎前諸病大抵字際字禁字忌字藥
則宜隨諸症字施字治療也必不
拘于此可考諸方者也

催生九方 至六

衛生湯 候產母腹痛腰痛見
胞漿水下字方服

嬰字 耨字 牡字 官字 苓字 各一
右水煎熱服

催生飲 下胎字衛生立應



斤 芎 腹 枳 芷 各等

右水煎温服

催生散 治難產並胞衣不下

止 里 百草霜 滑 各等

右為末煎芎歸湯下二三各一

五加茸 半

芎歸湯 治臨產難生胞衣不

下及子死腹中惡露不止腹中

血刺疔痛一切胎前產後危急

口噤垂死等證 子三三三三三三三

沂 一 芎 七

右分四貼每貼用水一盞煎水

將乾投酒一盞半煎五七沸温

服如口噤擗開灌之人行五里

詳再灌盡四貼便甯立 在神驗

胞衣散 治胞衣不下

滑 四 膠 通 各 三 葵 二 半

近 二 加 枳 三

右煎服

丁五去衣加鬱 胎衣不出腹

臍堅臍急痛即綴入服此胞

即爛下死胎

立効湯 治胞衣不出

膝 八 葵 一

右水煎東荆 常加滑 各等

生神散 治產前後氣沉眩暈

瀉 一 大 參 中 三 茸 小 一

右為末白湯下



生氣散 治產後氣逆上
百草霜一匙些少自湯下
按催生立効等湯宜放銘又
芎歸生神生氣等湯宜續銘
是當瀉之口授心傳也

補虛 辛七

產後補虛用參朮陳近芎其
如發熱輕則加芎淡滲之其熱
自除重則加朮又云新產不可
用芎以其酸寒伐發生之氣
只以芎易芎如腹痛者用芎
而不妨

按新產補虛之聖藥也新產
後惡寒發熱眼瞤不知人事

汗如浴脉澀加朮而煎熟生
神散則漸隨服而愈

芎歸調血飲 辛八

治產後諸疾宜加減而用之

沂 芎 芎 芎 芎 芎 芎

陳 侯 甘 炒

右入姜朮水煎溫服初產臨服

鍾好酒半鍾同服是加重便一

能行瘀血退熱如神○產後昏

儂不語加荊○口苦咽乾加門

○養氣惱加蜜炒○發熱不止

加朮炒○生腸不止加芎參○

咳嗽加會杏○兩脇痛加童桂

○吐痰加守貝○嘔吐不止加

砂寧去芎○盜汗自汗加芎酸



炒○泄瀉不止加莖永炒去苦
○瘀血不行心腹兒枕癰加官
瀝會牡去伽○去血過多頭暈
暗加荊參永炒○胸膈脹悶加
砂實查朴○惡露不行加貞牡
入童便和酒服○小產後心腹
痛去伽苓加索牡嬰紅童蘭○
驚悸怔忡加遠門酸
按產後諸疾先為加減消息
而可用之若不驗則可考諸
方矣

消癖湯 平九

治小兒癖疾發熱口乾尿赤
參 朮 苓 守 柴 苓

楮 澤 胡 蘆 門 穉
莖 鱉 耳

右姜枣煎服則立效
如癖病日久元氣虧損此方不
効宜多服醫王義正積自除
按小兒癖積之主方也

消食散 六十一

治小兒傷食腹痛或脹滿或宿
食不消面色黃目無睛此藥能
調和胃氣乳哺消化
青 耳 鱉 礞 枳 伽 陳

右入姜煎服○受寒作痛加藿
吳○有熱加苓



換兒傷食之主方也

鎮驚散

治驚風搖搐痰嗽喘熱

壁 芸 蟬 翳 茸

右入姜煎服

按急驚之主方也初發時予

與九文加定蠶絲而取驗多

醋脾散

治小兒吐瀉不止作慢驚風脾

困昏泄瀉不食

參 伽 苓 蜜 全 蝎

定 喬 自附 茸

右姜末煎服

按慢驚之主方也

消痺飲

治小兒疳疾身熱面黃肚大青筋

參 伽 苓 胡連 曲

連 青 陳 砂 茸

右水煎服○傷食加查○有蟲

加麩

按諸疳通治之方也

養老

形溪之母年踰七十能養多痰飲

大府燥結小水短少故制一方

參 伽 君 膝 苁 臣 陳 苓

春加芎夏加會芩門冬加歸身



倍生薑一且或一貼或二貼進
此藥則小水長如備是欲病捷
法也

按予之父年八旬二便不瀝
以醫王煎與六味丸而安見
于醫爾以來與此湯至今無
病是乃延壽妙方也

醫方數百千萬愚屢依每柱而
有切方漸掇披一百二十以爲
衆方規矩蓋診脉察證則先與
此一方而後考諸書施深治宜
秘沉痾矣

寬永丙子春正月

延寶改元九月吉日刊行



Handwritten notes in the left margin, including the number '22' and some illegible characters.

Handwritten signature or mark at the bottom of the left page.



倍生美，一月或一貼或二貼進
此藥則小水長，如備是欲病捷
法也

按予之父年八旬二便不通
以醫王煎與六味丸而安
于醫 醫王煎以來與此湯至空無
病是乃延壽妙方也

醫方數百千萬，愚屢依經桂而
有切方，漸採摭二百二十以爲
衆方規矩，蓋診脉察證，則先與
此一方，而後考諸書，施深治宜
秘沉痾矣

寬永丙子春正月

延寶改元九月吉日刊行

