

繪下三誌



春林軒燈下醫訣目錄

疔疽
瓜藤疔
紅糸疔
鬚疔
急喉痺
喉疔
灸瘰
肉疔
髮疔
虫疔

腦疽
火爛疔
脫疽
咽喉結毒
單喉風
時毒
陰瘰
粉疔
骨疔
痰疔

疔瘡
紫焰疔
瘰癧
纏喉風
單喉風
血瘰
血瘰
脂疔
石疔
肺疔

甲疽 跌撲 疥風 癩唇 痰泡 口疳 舌疳 齒漏 骨槽風 腋瘡 穿窠疽 鶴口疽

龍泉疽 大疔風 脇瘡 牙槽風 附牙瘡 梅毒舌瘡 重舌 吻瘡 落唇 白駝風 杖瘡 嵌甲疽

石楠疽 齶花瘡 鼻痔 宣露風 上齶漏 舌疔 木舌 滯頤 腦漏 破傷風 湯瘡 疔瘡

火傷

流注 乳岩 乳癰 多骨疽 疔毒 魚痔 梅毒 石精瘡 淋漏 楊梅瘡 陰痔 疔瘡

敗血流注 乳核 乳癰 雀聾風 痔漏 脈痔 膿便毒 囊瘡 石淋 治毒 傷寒發頤 瘰癧

乳癰 乳癰 附疔疽 腸瘡 腸痔 透腸痔 腐肉便毒 懸瘡 腎瘡 婦人陰瘡 痢后風 小腹瘡

瘡癬 牙疔出血 驚掌風 凍瘡 肺風 荏班 耳癢 聾耳 座癩 吹傷 瘰癧 脚了 你痒

天蛇毒 血箭 腎囊風 血風瘡 火丹 粉刺 油風 耳癩 疥癩 風大瘡 鈕叩風 手足破裂

合谷毒 血瘰 疥癬 膿窠瘡 天泡 酒皸鼻 白屑風 漆瘡 濕腫 崩毒 枯筋箭 眼丹

眼痔 仍癬 蟻蝥串 小兒走馬疳 瘡疔 臭田螺 虫蝕瘡 葡萄瘡 中砒毒 委中毒

脈氣 驚拱頭 小兒痘風瘡 胎疳 黃水瘡 牛程瘡 腹痛 誤吞針鏃 河豚毒 失榮

白禿瘡 小兒遺毒爛班 小兒赤游丹 瘡癩 大人口破 僵脚 陰虱 疔瘻 喉毒 瘰癧

春林軒燈下医談

瘰癧

毒ノ深キハ燒鑊淺キハ灸也瘰癧ハ一症タリト云ヒ惡症顯
 シタレハ不治也早ク可截割割割ノ如キ者出ルヲ候テ截割ス初
 札裏消毒飲ヲ与疔口割割ノ后毒割キ症ハ伯州散ヲ用煩症ナ
 ハ後次札消也燒鑊ハ一〇ニ二度程燒ケハ腐肉トル者也⊕和
 此ニ割ス杖瘰癧大渴熱癉或ハ泄瀉淋閉スル者ハ準繩ノ竹葉黃
 臣湯惡寒喘寒ニハ十全大補加荊芥于姜此又一等重キハ医王生脉
 不食吐吐ニハ人参理中湯多ハ御種ヲ用ユ或ハ補中加附子于姜至テ
 惡症ニノ瘡ノ四辺紫色ニナリ肉卷込六十補神内鹿茸ヲ加疽ノ微
 ハ不痛ノ粟粒少々牡羊ノ人ニハ不出疽ハ背重者也疽ハタヤスハ

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

色付ス者也色付ケハ紫黑色ニ成者之

疔疽 此モヤハリ瘰アリ治瘰瘰疽ニ從ベレ

疔瘡 十果敗毒散ヲ用ヒ鉞針ニテ破血スベシ中黄ヲ貼ス又面

部ニ瘰スルハ惡症之其内眉ヨリ上ニ瘰スルハ煩也

瓜藤疔 十果敗毒加連壳犀角

火焰疔 瘰疽テ云ハ瘰之口ノ知レヌ者之其内堅リ凝ル起ラ乱

刺ス青蛇ヲ貼ス陰起ニ瘰スル者ハ烟ノ様ニ紫黒ニナル也

紫烟疔 紫黑色ニ成テ里ノ腐ル者之至テ劇症也疔ニ別ルハ

シナシ其内ニ三小泡ヲ瘰ノ末ル之其内火焰疔ハ色赤キ也

紅糸疔。○此如ニ針ス瘰餅ハ上ニ同シ破傷濕ニ紅筋ノ引ラア

リ疔ノ治瘰ニテ宜シ惣テ疔ニハ心ガアル也

脱疽 急症アリ里瘰ニナツテホツクト指カ薄色ニ成テ針ラスレハ

水出ル者之此後症之急症ハ初痛出ルヤ否足カ黒クナル也是ハ

疔症故ニ截割スタトヒ截割スタトハハ截割スルナレハ生肉ヲ截テ

切ル後症ハ十補加鹿茸千金犀角湯瘡口ニハ雞蛋清ヲ左

突ニ煉交貼ス後症ハ手ヲ下サザル也

瘰癧 瘰癧ハ淺ノ瘰ヲ數ヤシ瘰ノ瘰ハ小キ成疔ヨリ夏枯草並

ハ散ラヌ者之真ノ瘰ニ用テ瘰瘰ハ膿出真ノ瘰ハ出ル也

白シ馬刀瘰モ夏古艸並ヲ用テ消散シ真ノ瘰モ治スル者

真ノ瘰疑ノ強キハ苓連ニ陳一等瘰ノ弱キハ檳木白刀並

湯 敬腫潰堅湯海藻ノ二丁香丸合方至之膿后氣抗ヲ見

ハ廿ハ呂飯養榮湯益氣養榮湯梅瘰ニテ骨痛ノ状ヲ示

去腐皮湯葛根木附檳木或ハ大解毒湯端酌丸消毒丸亦

用真ノ瘰瘰潰シ毒ノ深キハ甘汞凡ニ分ヲ用ル等瘰アリ能

カッベシ歴ノ上ニ灸スベシ

鬢疽 至テ惡疽之是モ瘰ノ如ク治療スベシ髮ヲ刺テ禰托スルカヨシ頭ハ先灸治惡シト心得ベシ

咽喉結毒 治方ハ喉癰湯鼻ヘ向ケテ瘰ノ来ルハ加辛夷

瘰ノ止難キハ五宝丹ヲ用ル之毒ヲ推ヘ付ルモノ之然レヨリ

シマリヲナス者也咽ノ上ヘ毒ノ付タルハ喉癰湯毒下ヘ付タル

咽府解毒ヲ用ルテ五宝丹ヲ用レハ益茶禁ス

纏喉風 喉癰是ハ四邊腫レ重キハ下迄モ腫キ也刺破ノ駈風

加石ヲ与ヘシ膿潰前後ハ駈風加石宜シ

急喉痺 結喉大ニ腫ル也駈風加石金鎖ヒニ確砂ヲ加ヘ吹女高ノ

穴ニ灸ス

單喉風 片方腫ル也内藥駈風加石

單驚風 片方ニ生スル也及驚風ハ両方ニ生スニツレニ驚風之

膿ハナキ者也截割スベシ出血スル者也金鎖ヒヲ貼ス初起

肩背ノ凝者駈風加石清咽利膈ノ藥用スベシ

喉癰 至テ難症也癰候ノ傍ニ生ス準繩ニ猛疽ト云堅ク凝テ

及肉スル者也治ノ症也老人ニ出来ル者アリ清咽利膈散

針ノ金鎖ヒヲ貼ス及肉シタルハ截テセツトシテ貼ス

時毒 多ハ首ニ出ルヲ云 瘰癧温時毒別テアレモ笑ハ一種ナリ時毒

モ体ノ弱キヨリ起ルテアリ是モ柴古加石ニテ推ス劇症ハ耳疼

三面迄モ痛ニ便秘スル也頭瘡ノ上ニクルハ萬黄散宜シ初ハ

柴古ニテ首迄ノ腫レヲ散捺ス膿潰スレハ伯州散ヲ与時毒兩

方ハ来ル者アリ劇症ハ首ヨリ起テ肩腋下迄赤ク成来ル患ク

スルト結毒ニ凝似スルテアリ矢張柴古加石ニテ推ス之矢張流注

ノ治療ニテヨシ

血癭 外治スルヲ出来ス自潰スル様ニナリ寸ハ活命久化毒ヲ用
ルヲアリ血癭動アリ癭トハアレモ餘リフタクスルハ見又之堅ク
ノ失榮ノ如シ及危スル也其内ニ故ル也血癭ハ血痛ヨリハ緩ニ
ノ運轉アル之血痛ハ多ク首筋版下上部へ出来ル者也手サハリ
硬ク皮色不変発起ノ動氣アルヲモアリ血癭血痛辨別最若如此
気癭 多ハ咽ニ生ス然レ因ヨリ耳下アリ点半面ニ及フアリ急
症半面ニ及紫黑色アリ又小クナリタリ大ニナリタリスル之此モ膿ニ
成ス者也出水シタリ出血シタリスル也初起急症緩症凡ニ色不変初起
十全湯尚米散海藻玉壺湯急症皮色変セハ仙方活命飲之針
ハ出来又之紫黑色ニナレハ痛モアリ寒熱モアリ膿ニテラス自潰セ
又青之

陰癭

血痛

内癭ノ如シ治療同シ長ク延ルヲアリフテヨリ出来ルヲモアリ
何処へ出来テモ動氣アリ運轉スル也夫故ニ治療易キ様ナ
レニ初心ノ内ハ出来ヌ者也切斷スルナレハ條挿ノ瘻ヲセ之然レ
氏運轉セヌハ難治ノ者也脈尺部カ浮ニナル者也血痛ノ毛ヲアル
ノハ下ヨリモミアケクハ鉄切テハ縫ヒクスルハ血痛癭治
ノ症也如ク黒赤ク成テ来ルハアカサノ如キ色ナリフツクト高
クナリ毛孔ヨリ血カ湧出ルハ條挿三角針ノハラニ刺ラ付ケテ
針ト刺違ヒニスル也其上ト破敵ヲ貽スルハ初起ノ症ト后ノ赤ク成
テ来ル症トヲ能氣ヲ付ケテ見ベシ

肉痛

癭スル知不定堅クノアルカ真ノ肉痛ニハ膜ナシ皮ト離シ
テアルハ一種又中毒ト皮ノ境ノナキアリ何処カラ取テヨキヤラ
知ス運轉スルモア也コツト團子ヲツラ子ク様ニ堅クモアリ瘻

痛

リテ及肉スルモアリ。治后水ノ出ル者アリ。軟肉痛ト云者アリ。是ハ
癭ノ皮ノ延クガ軟肉痛之運轉セカレ。凡分界ノ別シタルアリ。其皮
ノ別シテアルトナキトノ微ハ手ノ甲ヲ撫ルカ如シ。

粉瘤

多ク頸肩ニ發ス。治療初ノ投針ヲサシテ破散シテラサシ。腐
ラセル之或ハコラ開キ膜ヲ引出ス。トモアリ。肉痛トコカウ。アリ
粉瘤ハ運轉スル者之運轉シ難キモアリ。粉瘤ノ中ニ骨サナリテ
アルモアリ。又右ニ膿ニナル者アリ。腐リテ未ハ托肉ナリ。此痛
治シ易シ。小兒耳キハニ出未ルハ粉瘤多シ。

脂瘤

堅キ内ニ軟ナル如アリ。中ノ物薄ク成テ后ニ腐潰ス。アリ
又筋ニ出未ル者ハ先生手ヲ下サス。是非筋瘤トテ筋ニ依テ未シ
俗ニ云。疝氣筋之膏故建中ノ委之。此ハ手ヲ下スハカラス。

髮瘤

此ハ粉瘤之髮ノ生スル如ハ出未モヲ包込故ニ痛ノ上ニ髮ハ着

者也。治療粉瘤ニ同シ。

骨痛

骨ノ枝ノ様ナル者カ下ヨリ出ルアリ。一種一面ニ骨カ高ク
成テ未ルアリ。是ハ散液ヲスキ上ヨリ卷木綿ス。

石痛

此ハ石淋ノ出未ル。理ト同シ。別ニ外ヨリ石ノ入。ニアラヌ。美ハ
粉瘤ノ硬キノ之。癭ス。延不定。多ハ骨ノアル如ハ出未ル之運
轉セルモアリ。運轉セサルモアリ。

虫痛

脂瘤粉瘤ノ腐リタルニ虫ノ口イタル也。

疥癩

疥癩同散ノ合方。吉更白散ニテ吐サスルノ消毒ヲ撰
ル。トアリ。脱癩トナラハ正宗ノ桃膿散。人參補肺湯。準繩ノ
硫黃散。蜜煉ニノ尊服スル之。肺癆ハ吐血スル者。養肺湯。清

肺湯。寧肺ノ美ヲ用。外臺千金ノ方也。

流注。疵カ有テヨリ流注スルナリ陰症陽症瘰癧有リ別ト曰
シテ越水附又熱勢強キハ紫円ニテ下ス伯州散ヲ用ナリ
管カ付テ膿ニテラ又ナシハ托消加及鼻勢ナキ人ハ神内ヲ用ニ
順ニ行ケハ夫ナリニテ良シ内托ヲ服スル内ニ膿ニテラ又水ノ出ル
トアリト補加附子廣東ヲ用ヒハ粘膿ヲトル又膿軟肉ニテ方ヘテ
出ヌトアリ其時ハ注ノ先ニ左突本ニ青蛇ヲ向然ト奥ニ軟肉ニ
ハ青蛇ナリノ注ヲ刺シ青蛇ハ久シクツケ推シ又軟肉ノトシテ微ハ
鮮血出ルナリ軟肉ノ出未ルハ七八分モ愈カケタル時ニ血カ膿ニテ
ルベキニ其血膿ニテラナルハ血ノ巡リ悪キ之故ニ參附ニテ補メ
ケラヌ之是クケカ順也浮萍並ノ目当ハ血ノ凝強ク或ハ紫黑色
ニ成テモアリ管サヘ付子ハ消散ノ方ヲ投ス凝強キ程消散ニ
易シ

浮萍並ノ功勝レタルト云可ラス流注附而疽癰瘰癧破傷
濕一切消散セスト云ナシ此目当ハ腫物凝血ノ強キ程ヨク愈
スルニテモ膿多クテハ消散セヌ也腫物紫黑色ニテ是ヲ推スルニ
堅硬ナルハ是浮萍並ヲ用ル場合也一人破傷腫ニテ踝骨内外ハ腫
シ色紅紫ナルニ此湯ヲ用ヒ内越水烏ヲ服セシメ速ニ愈タリ也如
此症ニ毎度用テ度モ功ヲ奏セサルナリ又餘ノ遠系ハ此湯アリ
テ用ハ彼ニ轉シ移ルトアリ此劑ハカルトナシ
致血流注 此症ハ小産ノニ限テ本産ニテモ月経ニテモ一切血久
ニカノリシ事ヨリ未ル瘰癧ニ症ニ此症ノ目的ハ多ク服ニ生メ色紫
ナリ又腫患知ヲ轉シ朝ニ左ノ服ニ生メ互ニ又右ノ服ニ移ル是
他症ト異ナル也然レ疼痛アリ敗液ニ痛ナシ中黄ヲ貼シ而割ハ
通経導滯湯之膿積ノモ神内托而ハ不用ハ物湯ニ宜シ膿ニテラハ

針スヘシ針ノ后寒戰ヲ発スルコトアリ是師家所謂血氣不和ヨリ来
ル也此時ハ十補加乾附ヲ与フ

敗液流注

初起痛苦ヲ覺ヘス只テ痺ニ知ル皮色不変ムツリ
ト地場一面ニ腫レ上リフラクトシタル者又能推テ見ル底ニ肉
ノ凝タル如ク軟カク處リタル者マ、アリ不痛ト虽強ク推セハ痛
ク其フツトシタルコトハ未夕水也歷年モノ尙スルコトアリ痛スト云
レ必至ス生スルハ所ヲ不変ノ未ル此症謹テ針スベカラズ假令膿成
タリモ不針メ自潰ヲ待ベシ最初神内ヲ自若トメ用テ痛散セ
コトアリ自潰后ハ鷄卵左突ニ縫隨分浅ク刺スヘシ又下利自汗盜
汗乾吐咳嗽等ハ皆脱衣ト心得ベシ

乳癰

此ハ矢張り発背ノ如ク堅クシテ毛孔ヨリチヨチト露ノ如ク
膿出ル也サレバ眞ノ乳癰ト云ハ至テ希ク準繩云小兒乳哺之故其小

兒ノ胃抵ニヨツテ乳孔壅塞ノ内時閉凝結ノ発スト此吐乳也初ハ
湯根加石膏リ未ルハ托流ヲ侵ス又堅キ凝リナクハット凝未ルハ
前ハ巨橋皮湯此症ヲ侵リ未ルハ後ハ巨橋皮可也又一等毒猛
烈ナル症アリ午房子湯ニ宜シ是ヲ散ラズ侵ルハ托流ヲ侵ヘシ備
外術ハ発背ノ如ク切レテ不可也膿管ツケハ能ク探リ隨分下方膿
ノサハケヨキ所ヲサスヘシ此專要ナリ流注トハ達ヒ初テ大キク
用ヘシ平注ニ破敵ヲ付ケテサスベシ多ハ灸スルコトナシサレバ至テ侵
リ強ケレハ灸スルコトモアリ極藥ハ麩散散金黃散宜シ膿管
能ク心ヲ用テ刺スヘシ若シ誤治スルハ乳漏トナリ左スルハ必脱状
ヲ顯ス者何レ補劑ヲ用ベシ小兒哺乳ヨリノ未ル癰大ナルハ
者也是吹乳也橋乘散ヲ服サシメ紫雲ヲ貼ス

乳岩 初起乳岩ノ微ハ左ニ出来ルハ左脈必沈ル者也不然ハ強也沈ルハ

多ク前症ヲ終シ居ナルハ扱アリテ自潰セテ下スル也出表ニ方着
背癰ル希也是又岩ノ凡方也服藥ハ家方ノ仙方散聚湯加夏麻中
痛公英ニ消岩散一瓜ニ四ツツノ夏古草日采ニ采ノ並ナニ送下
下久備術ヲ施メ后ハ金創ノ治術ニ從ニ愈テ后モ能々養生サス
ス心シ入湯ノ節ハ能々瘡痕ヲ探カ宜キ也或ハ腋下ニ生スルノアリ
腋下ハ乳房ト違ヒ取メサシメ六ケ鋪如ク一婦人自潰メ大サ
大腕ノ如ククリ故取テ跡ヲ縫ヒ皮不足メヨラサレ程ノ大患モ愈
タリ

乳核 乳中ニ核ヲ生スルニ岩ト核トノ別ナハ核ハ脈流ラス肩モ凝
ラズ格別大キクナラヌ也岩ハ時々痛ク又推セハ腋下カ乳房カ何カ
引張痛ク又按メ見ルニ底ニ付テ離シ不核ハ時々痛ク腋下肩背
ハ引張痛クナラズ底ニ付テ上ニ服藥ハ清肝解鬱湯ニ神功瓜呂散ニ

三ツ之餘リ自潰セヌ希也若自潰セハ扱取テ縫フニ岩ハ自潰
后モ臭氣強ク出血スル也核ハ臭氣少ナシ出血モセヌ又年六氣
遣ナキ希也

乳癰 乳岩ノ如クニテ軟カク一人大癰ヲ患シテ八寸許リ切開キ手
ヲ入シテ探リ出セシニ事ナク皮ニ付テ出タリ其跡ヲ縫ヒ旬ヲ経テ収固
ス治ハ乳岩ニ等キ也 此症ハ乳ノ上ニ生スルニ非ス乳ノ中ニ出未テ
乳カ延ル也至テ軟カク故ニ癰ノ名ヲ云ク

乳癰 形状癰癰ニ等シ余リ自潰セヌ多ク消散スルニ清肝解鬱
加石羔夏古中ヲ共ヘシ

乳癰 是ハ兒ノ乳癰トハ違ヒ橋皮散ヲ服シ瘡雲ヲ貼ニ此乳
多クニツクト出来テ痒キ希ク橙ケハ水出ル

附帶疽 流注ヨリ一尋堅キ希ク流注ハ色ノ変スルナリ此色付

下ナシ又骨膜ヨリ生スル者故ニ至テ深キ者也流注ハ外襲ヨリ来リ
フツトトシクハ赤ク収服膿頭杯ニ生スル其処ヨリ下ノ方必脱取
スルモノ生ヨリ膿潰スルニ至ル迄一月半或二月半リ収針スルハ
先小豆色ノ出血ノ後膿出是骨膜ヨリ生スル故之流注ハ膿出而血
血スル也其外襲ノ故之何シ此症ハ骨ヨリ生スル故ニ夫ク表肉ハ
死セシモ同然之患知定知ナシ脈系ハ神内ニ宣シ針ノ位モ前方
ヲ用シ后大疔風ヲ共フ患知凸凹結毒状ノ如ナル中ニ圭水附ノ場合
也或ハ烏骨雞壳ヲ燒白湯送下ス

多骨瘡 此症ハ附骨疽ト同症之但骨節多ク出ルヲ以テ各ク骨節
ヲ探ルニ骨節ナシハ探リ当リ貝合カナリト云様十帝スルニ生骨
十ハ膜アハ故ニ音ナク手コク軟カク外術ハ乳岩杯ノ如ク切ルハ患
口ヨリコレメスヲ入レ中ヨリ引切レニ切レ也表ハ切ヌ様ニ中カラ廣

ク切ル之然ノ骨板ヲ以テ骨節ヲ板取兎角上愈セヌ様專要之
又肉ノ上リ兼ルニ雞肉ヲ味常煮ニシ食ハシム雞卵モ宜シ

鶴膝風

雀膝風歷節風痛風同候之痛風ハ一身走痛ノ定ル知ナシ

越水鳥ヲ共フ牽牛ニテ二三口下スベシ歷節風ハ其痛節ニ限ル之
毒節ニ付テ痛ム故ニ患知ヲ不轉痛風ハ歷節ノ初起之歷節風ニテモ
敷液油ルヲアリ痛風歷節ニ移ル寸ハオシモリト腫氣出ル之
圭芍知母湯宜シ敷液滯リ深地ニ至テハ千金ノ犀角湯一等痛
強キハ防己湯深骨ノ痛強キニ至テハ圭水鳥ノ角石宜シ痛風ヨリ
雀膝ニ移リ膿頭ニ痛三付タルハ烏頭湯ニ消毒凡一分疔疾ニ瘡
ハ烏頭湯功ナシト知ズシ一人此症ヲ患圭芍知母湯ノ附子ヲ烏
頭ニ代用影ク疼ヲ免セシ故浮萍加大黃ヲ投メ痛急ニ止ニ敷
液ス復圭芍知母湯ヲ共全愈タリ又一人雀膝風ニテ犀角湯

ヲ用テ患起色付之故紫田ニ分ラ其行流散セリ
腸癌 大腸ニ附シ小腸ニハ付ス多ク惡血大腸ニ留滯ノ成ナリ
初起小塊出来テ塊ハ根カタラス故腹ニ腹微滿小便頻數腹
ヲ按セハ痛ニ免角毒上見違フアアリ患ル方ノ足ツルアアリ
腸回ルニ付ク指コムアアリ外ニ拘挛ナシ大便秘ス初起脈紫ナリ
内ハ膿ナシ洪教ニテハ膿アリ大壯加意故虎杖而散セカシハ使
膿血ス伯州散兼用膿下シハ正宗ノ牡丹皮散ニ伯州散兼用而
ノ膿ナク血ノ三下リ塊而散セカシハ症ノ見誤リ之下ハ愈ル之
塊積リ強キハ外ハ潰エ是ハ難症ニ十補加附子散セハ多ハ死ス
取中故ニ在ラ忌口ハ左突先鋒〇又腸外ノ腸癌アリ此症ハ
大壯ニテ下ラス外ハノ浸腫強シ遂ニ外ハ向ケテ管付之此症ハ
多ク臍ノ不潰必臍ノ両傍或ハ臍下ニ附子糞米ノ自當ニ管付カハ

刺ベシ紐ハ浅クサスヘシ又腸癌ハ運轉ナシ腸外癌ハ運轉
アリ大抵枚ヲモ思様ニ愈ヌモノハ塊枚ケテモ在ハヤハリ浅
クサシ膿ヲ能推出シ托流ニ左突先鋒〇準淺ニ腸外モ細膜
ニ生スト云リ此腸外ノ説モ是ニ本ツリカ且腸内ノ症ハ外ハ潰
ル守ハ臍ハ潰ニ腸外ノ症ハ臍傍ハ潰ニ且腸内ハ生ル守ハ外ハ
出ル理ナシ此症産后ニ多シ又産后敗血流注ノ變症ノ症ト
ノ別々ハ腸癌ハ不物只女シ上下スルアアリ此塊積ヲ轉ル
穢毒 初起見分ケ難シ肛門ノ内張キリク痛ニ種々後重ノ
氣味アリナリ或ハ世ノ位モ大便秘ス夫ヨリ水交リノ血下ル之
内ニテ復シ故遂ニ大膿ニナル叔不大便ノ疝疾ニ疑散スル諸
脈緊臭氣アリト痛ト寒熱往來トヲ自當トス初起ハ大壯膿出
ルハ黃連除濕ヲ患ベシ急症ハ四十日許リニ脱ス老人ハ三十日許リ

スル者之壯歳ノ者ハ二月或ハ百日位モ持コタヘル者アリ不齊
前大壯ニテ尚敬スルハヨシ胆門へ指ヲ入レ探リ見レハ男女辰
ヲス大壯加蓋以是ハ温ノ為ニ直腸ニ流注スル氣呆之膿至テ臭
既スレハ勞快ニ成テ死ス此時医王加赤石脂ヲ與フ凡諸腫物ニ
レハ脈ハ洪數ニナルモノ也

痔漏 初起ニツアリ疣瘡ヨリ漏ニナル之疣瘡ヲ切シハ下ニ孔アリ
探リテ見レハ根ヨリ肛門ノ中へ指程ノ管アリ是ハ膿前ノ後ニ
是実症之時々流注ノ如ク漫腫スルヲアリ頂丸ク痛難堪忍終
ニ管付テ来ルナリ管付ハ針スベシ臭氣甚キ者也此症多ク虚人
ニアリ叔堅腫ニテモ痔漏トナレハ是ハ流膿セヌモノ也此時托而
膿出テヨリハ人禁湯宜シ此症探リヲ通セハ肛門へ通ス何レ
直ニ治癒セヌカヨシ治ヲサシ底ヲ突シ補劑ヲ用ヒ込テヨリ治癒ス

べし臭ノヨリ本管ヲ探リ抜毒紐ヲ指置テ二三日跡ハ破敵
ヲ三四日位刺ヲケハ孔大クナリ本管腐爛ス然レ後探リヲ通シ
糸ヲカケ療治ス是療治ノ支管ハ本管ヲ療治ノ后ニスベシ支管
ニハ抜レ管ナキカ故之又管ノニツアル者アリ何レ管アルハ本管ニ
此因ハ温氣ニ侵サレ温氣ヲニ重皮ノ向ヘ受生スル之探リ探レ得
又一掃入流注陰門へスルアリ此症梅毒ヲ原ル者ニ多シ是ハ夫ナリ
ニノ置キ痔ヲ治スベシ丸スレハ閉門ハ治スル也痔ヲ治スレハ流注
モ治ス又閉門へ向ケテ腫来ルアリ外ヨリ針セヌ皮内ヨリ刺スヘシ
症ハ浅ク孔塞カカ爲ニサス之知此ムレハ腫ハ消スル也又時々腫
ルナリ腫レ度毎ニ針ノ抜ベシ此症ハ麤的丸ヲ用ユ又性寒
寒批盜汗ヤドアリテ脱状ニカアリ脱スル人ハ症ノフナ卷込底ニ軟膏
出未テ生肉ヲアケヌ皮紫色ニナル此ニ雞肉味嚼汁採用ルナリ又

切又先実スハ蓋シ夕飯ニナル不実ハ難治ス

腸痔

俗云脱肛痔之形腸ニ似タル故腸痔ト名ク時々脱血スルアリ是ニ四物湯ニ地榆面青クナレ此症ハ勞ニ答ル氣遣ナレ治ラ施可シ又痔毒ト云者アリ至テ堅シ腫シ中ニアリ此ヲ取ラ子ナラヌ之又出血シ暈倒シ面色青クナルアリ出血ハラクヨリスルハ微ニテモシラ痔ハ白雲ニ血勝ヲ付推込脱肛水綿ヲ可施又蘆水メ止之又怨ラメ止ル又師家ノ秘系ニカナルヲ履ラヌル或ハ脂ニ付端切ル一時ニナスベカラヌ小便閉スル者之閉スレハカテイテラ可用、截断ハ三度位ニ切ベシ実スル者ハ加桑解毒ヒカヌ者ハ調和並角シノ定又ト思ハハ一糸ヲ刺スヘシ大キク急ニ履ラヌハ蜜陀糸ヲ用ス

元痔

即此痔ノ糸ヲカケ可切去殊ニヨルト内ニ漏孔アル者之結々登ヲ可用

虫痔

肛門中濕熱アル故虫スル人多ハ小兒ニアリ金匱外テ蠟中湯与又薑芥スベシ余滯ニ思ラク是全固熱ニ積ス腹氣ノメグリ

脉痔

血痔牡痔酒痔同ニ肛門中破裂ノ出血ス加桑解毒ニ白雲蝸牛油痔油ノ

透腸痔

瘡疹後ニ能登ス瘡后ニ登スルトアリ肛門ノ四辺ノ瘡シ痛シ腹暴滿ノ痛ヲナス痔漏ニ見誤ルトアリ疔ノ治ニ從フヘシ金ニカハル

梅痔

雞冠痔及花痔皆梅痔ノ大解毒ニ輕キハ中黃蜜キハ青蛇蓮花痔ハ痔漏ノ誤リニ毫門凡ヲ掛テ下スベシ頑肉ハ加リ取ベシ

膿便毒

初起凝アツテ早ク膿来ルナリ或ハナリニ腐ルモノノ一皮子

瘻肉便毒

初起堅ク根脚深ク肉充滿セシ寸ハ上皮フクトシ紫

黒色ノ針スレハ凝血テ膿ナシ上皮ヲ鉄ニテ切り破敵ヲ二音
貼シ糸ヲサス愈サハハ沸ヲ用ヒ腐肉ヲ取ベシ糸ノ刺様ハ腐塊
ハ三稜針ヲサシ其口ハ蜜陀糸ヲ二本佐刺三四日置ハ腐ル之腐
ル速モ一時取ベカラス自然ニトル也后ハ破敵ヲ貼スル也
妬精瘡 ツクノトシタル者ハ陰莖ニ時々ムテ引込ム之龍胆瀉
肝ヲ可用並ハ中黄也

囊癰 此症ハ二紛ル一症アリ可考 初起囊ニ腫アツテ痛ム之濕
熱凝滯ノ陰囊ニ流注ス是ハ内托ニ伯州散ヲ可用膿アリハ針
メ左突先鋒杖毒多ク擧凡ニツク者之又小腹ニサシ込死ニ紛ル
ハアリ併シ死ノ様ニ餘症ナキ故知ル也初囊ニ腫アツテ色付ル
ハ退心湯ヲ用此症腐リアリハ腐菜ヲサス擧凡ニアタラヌ様ニハ
多ク及肉ノ者ハ清肝瀉濕湯ニ宜シ格別大ケ敷者ニ飛ス兎角擧凡ニ

灸ヲ付ベシ

癰 會陰ニ生ス其形痛ノ如シ初起熱強シ此症維ヲサシテヨ
シ初癰ノ強キ前ハ大壯ニテ消散スルアリ 淋瀝ノ初起ト見誤ルコト
リ膿后ニハ托而ラ典下シ

淋病 會陰ニ惡毒濁滯リテ漏トナル之癰スル如癰瘰ト同ト故
能因ヲ向テ治療スハシ初起癰ル者ハ大壯加薑蒜虎杖矢疔ノ
内ハ漬メモ良シ

石淋 陰莖ニモアリ會陰ニモアリ 何レモ切斷メ治スベシ莖ニ
本未タルハ切斷メ石ヲ出ス叔尿管ハ瘻ノ如ク管ヲサシ愈テ后枝
之切斷ノ法ハ下ノ方ヲキリニ針三針子リクリ原ニ縫之其筋
ヲニカト巻クク

腎癰 初起而症ノ者ハ癰疔ト異ナラス形粟粒ノ如シ治術延割

癰疽之因之但癰疽ハ多ハ瘰癧リ尻カラズ癰疽ノ治ヲ輕クスル
之正宗ニ下馬癰疽馬癰ト丸右トヨツテ名アレモ畢竟同物ナリ
一種癰疽アリ準繩ニ脱疽トアリ一概ニ癰ト限ルナシ癰モアリ
疽ハ疽ノ治ニ從フベシ

梅楊瘡 綿花瘡砂仁瘡皆同シ初方シ下疳ヲ患テ直ニハツト癰シタ
ルハ大解加土膏皮癰門ニテ下ノヨシ又便毒引テ疔痛ヲ癰シ夫ヨ
リ楊梅瘡ヲ癰スルハ細ヤキ者ニシテ是砂仁瘡ニ此症ヲ癰セシト
ソ不癰故ニ疔痛ヲナスノ上疔皮加遺糧ヲ用ヒ是ニテモ不癰ナ
補湯ニ梅木遺糧兼用ニ三蛇散知酒ニテ送下ス此ニテ癰シタ
十補湯ヲ止メ疔痛ノ治ヲナスベシ上ニ毒アレハ土膏皮加遺糧腰
下ナシハ赤癰陽又肩背廻リ患キニハ葛根水附之此症ハ疔毒
化毒ノ症ナシ端の凡ハ倍飲用ヘシ叔大ニツグクト癰シタルニ師家ニ

テ薑藥ヲ用シモアマリ宜シカラズ様ニ思
三蛇散 白蛇 烏蛇 及鼻

結毒 右三果各等分酒ニテ送下ス此系ヨク癰スル
梅毒酒疾ニ能癰ス所在不定見症不定腫ハアリ不腫モ

アリ種々アリ癰疾ノ如キアリ多ク口眼喎斜手足不遂疔痛ス
ルアリ是癰ニ付故也至テ痛強キ者ニ主水附ニ疔毒一尋痛ニ
強ク毒深キ者ハ前方ニ化毒ニ分又毒脈弱ニツキ雀脈伏ニ成アリ
化毒ヲ共ヘシ若不應ハ天水丸如法天水丸ハ長ク服スル下疳ニ
癰スル故ニ脈弱ニヨリシ症ハ此凡ニ急度治スル下疳ノ若又甚キハ
再癰ニ成モアリ皆結毒ニ此ニハ加灸灸温服兼用疔毒黃鐘打
上部ニ赤ハ心下悸スルナリ故ニ灸灸ヲ用ルノ輕キ症ハ治ス
レモ重キ症ハ大クニキ也多ク薑藥ヲ用之或ハ洗系石硫ヲトキ

スホイトテ洗フ之此症ニ頭痛ヨリ耳聾ニ至ルアリ耳聾ニハ大三
五七故宜シ是亦長ク用難シ又一種瘰癧ノ如ク是ヲ抓破ツテ
生テアリ又瘰癧ノ流注ノ如ク至テ空ク所在不定不腐ニハ生木
烏ニ消毒針ノ膿出テ愈ルモアリ不愈ノ漏ニテアリ切斷シテモアリ又
結毒モ流注ノアチニクニルリト至ル出未ル者アリ治法切斷破
敵或ハ腐リ取リ兼ルテアシハ枚毒又一種虎杖ニテ骨痛スル者アリ
是ニハ云直散杉葉雞肉凡テ此等是脱症之劇劑ハ用難シ瘰癧
テ治ハ奇良附ヲ用之

婦人陰瘡 男子下疳ニ同シ候シ毒ハ下疳程ハナキ者ハ腐リカクル程
ノハ余リナキ者也大解毒ニ中黃後衛治法男子ニ同シ

陰痔 初起赤ク白ハ紫也ニテリテ痛強ク交合出未カク之假令ハ痔
ヲ痛ハ大成ハ糸ヲ切取リ小成ハ切斷ス之然シ出血多ト心持ヘシ又

一種臭気強キアリ蛇床子湯ニテ洗ベシ入湯候シ遂込ト口中臭
シ或ハ滯下毒ニテ臭キアリ

傷寒飛頭 即時毒也 傷寒后霍乱ニ發スル之初起柴葛加石臘ニシハ
枯瀉此症痛強キアリ又頸瘡モ同物之然レモ頭大ニブツト

腫ル

痢后風 痢疾后ニ浮腫ノ手足杯ニ生ス膿ヲモハハ枕ヨシ初起ニ
準繩ノ代令湯多ク此方ニテ治ス骨節疼痛ヲ兼ルニ越木烏

ヲ焚不田ニ愈ク

痼疾 手ノ握リツメ足ノ踏ツメニ生未ル者之色ツカスニ痛アリ頭ハ

突起セヌ者之越木烏ヲ灸フ膿潰シタハ枕而時毒ノ毒ハ

瘰癧 正宗ニ定知分クストアリ多ハ十指ニ生スル者之是瘰癧初メ

肉中赤ク色ツキフウワリトクシ赤ク痛ニ甚キ者之小ナル者ハ

豆或ハ粟粒様大ナル者ハ梅子位之多ハ初メ赤クシヨ白黒ク成者
之其内ニ筋帯積潤スル者也劇症ハ渴シ且謔語アリ治法初起見
付タラハ切テ腐肉ヲ取ベシ腐肉取レヌハ切口ニ瘡ノ如ク臭ク腐
肉尽テ灸ヲ止ム立物大魚腸ヲ共腐肉トシテ台痛強キ者アリ
此ハ凝血強キ故メ正宗ノ乳布止痛散或ハ郭氏定痛托裏散
小腹瘰 正宗ハ暈アツテ瘰ノ様ニ云テアレモ多クハ疔症トモノ之粟
粒ヲ飛ノ白ニ黒色ニナル也此ハ腸ニ近キ故上段成ク切ベシ方ハ
神内十補之灸ハヒツコクスヘカラス脘上二寸ニ灸スルアリ中灸瘰瘰
瘰ト云正宗ニ脘下ニ灸スルヲ腹瘰トアリ矢張小腹瘰也
鶴口瘰 尾翳骨ノ上ニ生スル之初起ハ瘰ノ様ニ出未テ陰伏ト者
也痛シモ不甚シモ深ク腐ル者之瘰形大サクテモ瘰瘰ノ治法初起
ベシ多ク内ノ薄キ疔ニ出未ル者之灸スベシ若年ノ者ハ生ク老人ハ

ハハ死ス正宗ニ漏ニ十九トアレ此ハ痔漏ノ誤リ之治方托内神内十

全内托或ハ十補附子

龍泉瘰 虎鬚毒 竜泉瘰人の中ニ出未ル虎鬚毒ハ瘰ニ灸ス

正宗ニ疔トアルカヤハリ疔也治法前ノ如シ

石榴瘰 ヒジリリ寸ニ灸スルヲ云附台灸トハ別ノ疔治法ハ匠ノ瘰

ヲ指先迄腫来ル也此ハ至テ陽伏ナル者之是ハ瘰之石榴瘰ハ初起

赤ク白黄色ニナル也次第ニ大ニナリ来ル者之正宗ニ灸スベシトア

レト灸ノ瘰ハナキ也故ニ針ノ中黄ヲ貼ス

穿踝瘰 足ノフトラヨリ灸スル者也骨膜ヨリ灸スル者故ニ骨ヲ

ツキトクス者之矢張骨節之初ヨリ紫黑色ニナル者之浮萍並ニ

莖スレ初起越水鳥ニ紫丸又前散セヌ久敷テト盜汗出テ

勞瘰様ニ十九者之疔ヲ淺ク刺スベシ疔出シハ毒支加黄芪

大厥風 補天丸脱疽ノ如ク痛強ク里腹ニシテハ水乃俾ラ果
凡トナレニ三分ソノ用ニ

翻花瘡 正崇ニ一種ノ腫物ノ様ニアリテ諸腫物皆又花ス者
也其内肉痛治毒血瘧根又花シ易キ者也脱血シタレ症ハ瘻從テ

服養スヘシ而心ノ内ニアマリカラスルトソ用シハ出血多シ瓜ヲコク
取カヨシ又竹筴鐵筴ニテコソケレハ生肉能別ツ者也

腋瘻 腋下ノ瘻也フツキタル者モアリ然ル者モアリ針ノ后

托流ノ瘻ク切ニ及ハス
脇瘻 腋下ノ下ハ出赤ル之是ハ陰症ナル者ハ羸瘦ノ勞状ニテ

死スル者アリ輕クシクムヘカラス能ク深ク指可ラス痛強ク針
毛膿ノ出又赤アリ

鼻痔 鼻茸ノ初起赤クヒラクナル者也是ハ公蒂糸ニ流

シテシマウノアリ或ハ齒破ラ吹ベシ流シ大ニナシハ截断スベシ切ロ

ヨリ又出未ス殊ニ齒破ラ吹ベシ方ハ辛夷清涼飲

骨痛風 齒ノ根ヨリ生スル者ハ齒ノ莖セテ居ル如カラ生ス口角

カヌノカ骨痛風ノ徴也膿ニ成リ腐ル也患キ齒アリハ枚ク也先

清陽散火湯ニテ帛拭ラ解ノ后齒ヲスリ也輕キハ指ニテアケルハ

萬カニテアケル也齒ヲ枚齒ニ齒骨カ付之齒ヲ枚タル所ハ

取テ燒錢ヲアテル也又又ノ灸ヲスル燒錢ヲアテルモヨシ

骨ニ齒リアラハ早ク燒ベシ

牙槽風 上腭ニ出未ル者也外ハ腐潰スル症ハ外ハ枚ク之毒ノ

強キハ外腮ノ骨迄付者又額骨迄付症モアリ痼疾ナルハ毒

木附翁的凡兼用牙痛風ハ齒ノ根ニ腫物出未テヤケル候ニ

痛ト一ヶ條ニアリ疑ニ干故此ニ識ス

宣露風

俗云齒中ノ清胃散老犀或ハ甘露飲蓄微露ニテ時々洗フ之金鎖七或ハ白龍散ヲ付ク格別痛ナリ齒キレ脱セシハ抜ル者也膿血共ニ抜ルナリ

齒漏

宣露風ト毒ハ也宣露風ノ様ニ散漫セヌ之聚骨抜ル者ニタトハハ齒齦岸ノ流注見シタル様ナル者之清胃散ハ膿血シ出ルカ軟肉ニテハ又ケヒレヤコレヲ燒酎ニテトキスホイトニテ洗ウ之此方ハ師家ノ方ニ非ス

附牙癰

親知ラスノ処ハ癰ス多ハ及肉ス齒ノ外ハ生ス初起赤ク凝テクル寸ハ血ヲトル也加果清胃散ニ老犀及肉ニセツトシテ貼ス膏ル之初起頂ヲ生スル寸ハ利剪刀ヲ以テ截割スト未成及肉スレハ不治也

上齶漏

上齶癰ノ膏リ抜タルヲ云之

舌疽

医宗金鑑云初起ハ舌ノ中ノ向テ堅ク成之漸々腫レテ潰ハ一度膿血シ出ル之瘡口ヲ閉キ遂ニ及肉ヲ出ス者之矣此ハ骨肉ノ上ニ核ノ聚ヲ敷テ其上ヲ燒鑊ニテ燒之又ハ昆布ヲシク也蟾蜍ヲ水ニテトキ燒鑊ヲ當テ跡ハ付ル也竹茹魚連陽或ハ筆尾ノ甘露飲又肉ノ処セツトシテ膏ラス一モアリ蓄微露ニ洗ヒ苦實散ヲ搗塗ベシ甘草丸ヲ用ユ初起塊ヲ結フ寸正中ヲ針ニテサス之凝血而散スル一モアリ一切毒粉散ヲ以テ塗ス多ハ不治之準繩ノ牛黃散ヲ用テ可也竹葉ニテ服スル之

微毒舌疽

治毒ヨリ発スル症ハ同シ一多ク及花セヌニ膏リ込希ナリ初メ膏リ込テ后ニ及肉スル者之治洗薑付茶等真ノ舌疽ニ女毛異ナリナシ其内梅毒ノ量差ヲ用ル一モアリ異ナリ一舌強ラズ臭気多ク或ハ舌疽程脱スル一ナシ甘草丸咽症解毒或ハ

五宝丹消毒丸凡用ル下アリ

舌痛 多ク切取レシ肉痛之治無名異血勝ヲ雞卵ニ煉付ル

或ハ蟾蜍ヲ塗ル出血スル者之初ハ膏ハ手ヲ下ス可ラス

口痔 無定処鉄ニテ切リ去リ金鎖ヒラシク

重舌 切去リ后正宗ノ黃連湯ニ湯金鎖ヒ隨分本ヨリ切ル之及

肉セ又膏シ

木舌 舌厚クナリ痺シ強ハル也故ニ言語ワカラス此症舌下ニ青紫

始アリ針刺シ血ヲ放之竹茹黃連湯

痰泡 初起舌下ハ腫ル消長ノアゴノ下ハ及フ者之舌下ニ腫ル

寸ハ舌下ニテ放ク舌下テ放テモ又消ル故ニ腫下ニテ舌迄下ラ

之ニ准ラサレ千金流氣飲或ハ托商

吻瘡 風寒ニ襲レテ血モ枯燥スルヨリ生ス心泉通逆散荆艾地芎

皮美ハ中黃

滯頤 通心飲阿仙菜ノ末振カケ或ハ秋貼散餅カスト振撒ル之

此症遺毒アラハ日永丸兼用スベシ

繭唇 多ク上唇ノ硬クナル者之出血多クスル故切ラシク青蛇

ヲ貼久黃連解毒口中ニ血袋ノ様ナ物出未ルナリト云ニ

針ニハカラス出血ニ止メ者之考ルニ急ニテクリ取カヨカラテ

藩唇 小兒疳疔遺毒ノ后ニ發スル者之此症ハ唇ヲ多ク爛テ膿

ノ出ル者之突大腫スル者ナシモ繭唇ノ様ニ人中ハハ出未テ

繭唇ハ痛ニ強キ者之藩唇ハ中黄ヲ貼ス

腮腫 直ニ頸痛スル者其后ニ發スル者アリ極毒ヲ兼ル稟

固肥 固肥漏ハ風熱ヲ兼ル者其後清毒散黃鐘散梅毒

有毛無毛消毒ヲ兼用スル肥漏ハ羸瘦スル者之稟固

ハ輕キ症脇漏ハ重キ症之肥漏ニ西花ノ失能應云ル之梅
氣アリ人鼻ヲ引膿ノ出ルヲアテハ此等古以石蓋ニテ夷

癰疽

一種行ナマツリ黒腐病ノ末ヲ膿ニテ朝ニツテ午後陽

ニテ洗ヒ三四日ニテ愈ルノ里キモ治法同シ里キ也正宗密
陀教牛黃散丸散録ニ出能キクシ

白駝風

癰ノ一種也

破傷風

剛症之打撲損傷アリ凡氣襲テ此症アリ之寒

戰振深身背強舌強脈微濡瘡口乾燥スルハ此症ノ徵也
此症ニテ六口禁シ角弓反張スル也角弓ノ症ハ先某ヨリ腹
鼓ヲ懸ヘシ其後合谷ニ針スベシ振慄寒振ノ強キハ當敵
四逆加虎杖無患子肩背強リ舌強リツヨキハ葛根加麻扶
風患子皮或ハ的里聖加サフヲ用ニ種瘡ヨリ水氣襲テ

腫痛ヲナス症アリ越木烏ニ中黃ヲ點スヘシ哮喘ニ云此旨

リ凡入テ破傷風濕入テ破傷濕ト成トアリ破傷風之症

テ自行ノ出ルハ推症之師家云流注ト破傷ト其形相似

其因非之流注ハ破傷濕他症ニ流注スル也破傷濕ハ其場ニ

テ腫ル也

跌撲

氣絶シタルハ合谷ニ針シ清風ノ活ヲ入ベシ若高懸ヨ

リ筋ヲ陰囊ヲ打テ口ノカ又者アリ是ハ口中萬カニテ号

アケテ固生散ヲ吹ヘシ骨ノ折タル起ヘハ能引延メ法如

ク楊柳散雞卵酥ヲ煉リ付ヘシ其上ヲ卷木綿シテ之

トニテ蒸ベシ一通リノ症ハ如淫陽ヲ用之又腰背ヲ打テ便秘

スル症ハ大成湯ヲ用ニ腹ニ瘀血ノ凝アルハ桃仁承氣湯

ヲ用夫ヲ捨置腹瘧ニナル者之凝血シタルハ針ノ血ヲ取

へし其跡ニ楊杞散或ハ妙散散ヲ付ルニ一徑腰杖打テ半
年モ一年モ痛ム症アリ是ハ敗血ニテ打撲内ノ導滯湯用
杖瘡 杖ニテ打レタルヲ云癰疽ニケル起ハフラシトテ毒ニハ劇
症ハ瘻リ救ルヲアリニ黄結痛湯ヲ用ユ

湯滌 火傷 ニ症氏ニケルノ起リ大赤之惣身モ焼ケルハ馬
ノ油ヲヌリテ可シ柿ノ院ナド用ル人アリ是ハアシノ都テ洗糸
ハ患シ、癰コヨク屈シケル故ニ屈伸サスルトヨク心得ハシ又
内攻スル症アリ先四順清涼飲ニテ推ベシ若迫リ強ケレハサ
フラシラ童便ニテ用的里亞加ヲ用ルトモアリ

甲疽 俗ニ云ツマハラニ又瓜マリ氏云多ク瓜ノ板ケル者ハ瓜ノ前
カラ及肉スル者也瓜ヲ取リ青乾ヲ貼スル也疔瘡内癰治湯
五物大黃湯準繩ニ瓜甲疽ノトニアリ瓜甲疽ナシ代柿ト同シ

丁ノ指頭五本共ニ灸スル者アリ敷疽ト云治疥甲疽ト同シ
嵌甲疽 鼻端スレ湯火傷ノ如ク水泡ニ其水泡ヲ刺テ白雲
ヲ貼ス準繩ニ瓜甲疽トアリ嵌甲疽ノ疽ノ字瘡ニ依ルカ宜シ
カラニ字瘡ノ字ハアマリ仰山

眠疽 トコスレ此症気血仕ナル者ニテ長病而轉倒スルト不能
骨立血氣巡ラズ大皮ニ生ズルニ右ニ黒瘻ニナルアリ毒ハナシ
殊ノ外瘻ル者ニ此症ヲ患ル者ニ全快スル者少シ然氏初起ニ
中黄ヲ貼シ置ケハ氣血巡リテ愈ルトモアリ黒瘻ニ成テハ准繩ニ

瘻瘻 后世俗ニ云積聚瘻之所養不定脚下一モ膝傍ハモ赤
外ハ瘻リ枚ル者ニ非ス其塊ヲ推セハ老シ痛アリ運轉スルモ之
上ハサシ込トアリ腹瘻ニケルノ様ナシ小腹ハ瘻リコト者
三四年モノカラ膿ヲ覆ストアリ血塊ト能効ルノ者ニ血塊ハ

不痛カ目的ニ血塊ヨリハ浅キ者ニ膿潰ノ外ハ扱ハ必死ス預
言ニ大牡ヲ用テアルニハ物湯可ナラシカ此症ハ男子ニ限ラ
ス多ク在ノ方ニ發スレハ左ノ足カ痺ルトアリ正テ云レハ圭木
ノ症ノ様トドヤハリ膿ニ目ヲ付ケ阿魏加皮散ヲ用テ
経閉ルニ症ハ拵当丸或ハ兩塊凡ヲ用ルトアリ経閉ニ虎杖
根カ必附子割ヲ可用ラズ

天蛇毒 準繩ニ天蛇頭ト云指頭ニ出ルモノニ初起痛之甚
キ寸ハ針スベシ治方ハ五物大黃湯潰スレハ此病ニ

合谷毒 正宗ニ疔ノ類トアリヤハリ疔也準繩ニ虎口疔トアリ紅
糸ヲ引布也初起十尋賊毒紅糸ヲ引ニ至レハ疔瘡内ノ黄
連解毒ニ

牙縫出血 卒ニ齒クキヨリ出血スルニ血勝ニテ毛押ニ齒ノ痛疾

清胃泻火湯ニ黃加送礪ヲ用テ或ハ縛血散ヲ用ルトアリ

血箭 毛孔ヨリ出血スルヲ云毛孔ニ限ラズ出ル者ト云或ハ灸

瘡ヨリ出ツ是ハ細ク糸ノ様ニ出ル者ニ多ク出血スレハ物湯ニ黃

加送礪糸リ多ク出血スレハ死ス

血痣 所發不定多ク面部ニ發スルモノニ小ク赤クイキゴノ様ニ出

来ルニ天窓杯ニ出未テ髮ソリニテ能ソルトアリ是ハ能及花スル者ニ

糸ニテ取テ下シ

驚掌風 手足ノ皮肉ナク成テ皮ノ出ケル症アリ但名異白雲奇

貼ハ尿通遙加荆艾地骨皮或ハ丹荅桔荅九倍子此付糸ハ爛

ラノ愈ス為之又大楓子ノ皮ニテフスブルトアリ其跡ハ桐ノ油ヲ

塗込ニ如此スルト毎日常ニハ愈サレヌ者ニ長ク養生スベシ治之

者ハ皮ノ厚キハヨロシクモスニテキリトル下シ

腎囊風 猪苓湯一合方極盡ノヤルハ大解毒之付

系ハ大黃也此味子散ニ猪苓ヲ加テ洗フアリ

疥癬 此症ハ初メテ敷加大黃出兼ル者ニハ三蛇散ヲ用テ張ラツ

ケル也或ハ鼠肉ヲ用テバツト出タリ也テ從草解毒湯カセロ入

湯サズベシ又早ク出スニ猪苓又内攻ノ症ハ山脇ノ赤小豆湯

ヲ用之是劇症ニハ磁キリノ世日位ノ向ニボツク内攻スルアリ

是ハ緩症ニ此ニハ仙遺糧ヲ用之内攻呼吸息迫ノ症洗丹ニ

テ下スベシ此系ハ洗丹ヨリ衝心ノ強キニ用之急症ニハ灵砂

凡モ外ヨリ一更適用ルニ右ノ症ニハ三ツラハ仙遺糧ヲ用ヘシ

膿瘡 俗ニ云ハハ干瘡也一ニ雀来瘡ト云初起輕キ者ハ春秋出

ル也荆敗ニ紅ノ末ヲ加フ當飯粘痛湯楊梅刺及湯銀荆湯浮

萍加大黃湯出血ソエケヒレヤコレヲ付上皮ヲムクベシ其上付ベシ中

黄ヲ貼スヘキナレト申黄ハ早キ也破敵ニ三痛モエケヒレヤコ

ニラ貼ソムクベシ若又此方ニテ治セホレハ瘡子ノ末ニテ洗ベシ劇

症ハ龍門丸ニテ下スベシ

血風瘡 血ホロセト一身ノコマカクハツト發スル者ニ色赤ク痒ニ

アリ搔ケハ黄水出ル也正宗ノ消風散平血散防通散可撰用

膿瘡 手足遍身ニ生シ痒ミアリ搔ケハ黄水出テ其水臭気

アリ小兒遺毒ニ能アルモノ之血風瘡ノ様ニ赤シハナキ也寸見

シハ疥癬ノ様ニ現スル者也早ク愈ヘス消風散或ハ浮萍加大

黄小兒十レハ大連克飲

凍風 霜鏡之毒敗建中出血セハ中黄ニ烏頭並或ハ茹子ノクヲニ

テ洗フアリ惡クスト脱疽ノ色ノ様ニ覆ル者アリ圭木烏ヲ与

火丹 風邪ニ侵サレ肌膚ニ粟起シ色白ク或ハ赤ク雲片ノ世ノ

上ツラ痒クノ痛アリイテスルニ発熱憎寒ニ甚キハ振慄不
十敗或ハ黄連加犀角中黄ヲ貼スベシ初心ノ内ハ漆瘡ト見誤
ルコトアリ此症所発不定ト云ヒ多胸乳ノ間杯ニ多シニ種腰ノ
辺ハ発シ発熱スルコトモアリ正宗ニ纏腰丹ト云又對口瘡ヲ準繩
ニ火帶瘡ト云此症ハ丹毒ニ纏腰丹ハ輕キ者ノ少ク赤色ヲ
水泡ヲ発スルコトアリ椎テ不痛及テ着物ニサワシハ痛ハ水泡ヲ
ツケテ中黄ヲ貼スベシ荆敗ヲ用ニ準繩ニ赤游風白遊風ト云
アリ正宗ニ濕火丹ト云アリ痛少シ乾火丹一本抵強シ白膿ノ出
ル者ナリ火丹ハ膿カ黄ニナルニ白游風ハ濕火丹赤游風ハ火丹
ナリ治法同シ

天泡 水泡ノツケレタル様ナ物ノ水泡ハツケテ赤シ夏多キ者ニ拒氣
皮膚内ニカクシモルコトヲ不得夫故ニ出未ルニ大ナル者ハ大笑

程アルニ清解ニ中黄凉劑ヲ用ベシ昔ハ涼膈散正宗ノ解毒得
心湯ヲ用之

沛風 面部ニ出未ルモノノ顔ノツケテ様ナ者ニ清解ヲ與フ
粉刺 ニキビニ防通散ヲ服シ天花粉ヲ又ルベシ瘡根ヲ能ク拔

レハ痕星クナルニ
酒皰瘡 格ノ出血ノ妙貼散ヲ貼シ上皮ノ星キ起ラムクニ防通

黄連抱子大黃湯
雀斑 ソハカスニ多ク女子ノ面ニ生ス正宗ノ玉容散ニテ可洗玉肌

散ヲ塗モヨシ
油風 衣氣ノ回リ悪キ故ニ多クハゲタルアリハゲテ直ニ治セハ易生

也久メハ不治海女湯ニテ洗ベシヤクハニ成丸ヲ不治之
白屑風フケノイニ一種天窓ノ地カ赤ク成テフケノ出未ルアリ防

通ニ黄鐘散兼用スベシ

耳疾 傳耳 耳タレノトク 蔓荊子散ヲ與テ椰子油ヲ流シ込メ

ハ治ス

耳痔 目ニ見ユル程ナシハ切トルベシ或ハ糸ヲ截テ切リ落スベシ

瘰癧 面部ヨリ四肢迄ハラウクト出テ寒熱振スルトモアリ湯モ

アリ是ニハ先荊散ヲ与フベシ參蘇久ニ紫蘇ヲ倍加シ用ルコト

必愈シ若ク用エハカラス洗糸ハ荊蘇湯蛇床子並ニ灰芒硝ヲ加

テテ用ヘシ内攻セハ化疔化毒越婢湯ヲ用ヒ或ハ藍葉ヲ加ウ

此方ハ方彙ノ癰疽ニアリフニヨルト一所ヨリテ瘰癧ニナルトア

リ其上ニ紫雲ヲ貼ス

座席瘡 座ハ子ブト痛ハアセホ正宗ニハアセホノミノトアリ此説

誤リ之浮萍或ハ天花粉西瓜汁モ佳ク

疔瘻

天地不正ノ氣ヨリ来ルトアルカ飽食ノ膠胃ヲ傷シ

赤抵ノ為ニ発スル者之或ハ耳下ヘモ及フ者之初起抵甚キ者之

驚搐杯スルトアリナ敷或ハ紫石ヲ用エ併シ此症ニ厚風加石三勝

ル方ハナシ外ハ中黄ヲ貼スベシ膿ニナシハ先鋒ヲ貼ス内托ス

ヘシ多ハ駐風加石ニテ消散スル者之初起毒強ケルハ紫凡ニテ下

スベシ

濕腫 破傷濕也破傷ニテ少ク腫漫ノ如クニ流注スル者之是ハ

破傷流注ノ小ヤキ者ト思フベシ

咬傷 人ニカマシタルハヒドク抵ノ劇シキトアリ人ノ怨テカミシハ痛

強ニ棉帛咬シテ脱疽狀ニナリテ星屑皮ニナリ痛々清々出血スルハ

血勝傳血散痛ノ強キニハルサレヲ用ヘシ大根汁ニテ洗フモ可也下

敗或ハ烏頭湯若ク毒上攻ノ予甲杯赤ク成者アリ能診ニ破血ノ毒

揚ヲ竹クニシニ黄腹六破敵此症能及ぬニシガル者ナリ
治公及花瘡二同シ

凡大瘡 劇キ者ハ毒気ニ迫リ損満ノ寒抵スル者アリ此症ニ黄

連解毒木鼈子ヲ多ク加ベシ眼腫ソ任ノ和リ成テアリハ毒

ノ散ルヲアリ多ハ荆敷加雄黄紫丸ニテ下スベシ瘡コニ人糞ヲ付テ

大灸スベシ是ハ糞ヲ焼込為之其糞ヲ取リ破敵雜冠雄黄ヲ

用ベシ一奇方防通ニ雄黄ヲ加用ヒ日々紫丸ニテ下スベシ三四日

注テ墨豆ヲ食ハシメ生臭キハ毒ノ故タルニ毒ヲ尽サハ暎クナキモ

鼠毒 十散茅根ヲ加用下シ雄黄中黄ヲ貼ス又一方ニ香ヲ服シ夕

リ底口ハツケタリスルヲアリ或ハ紫丹ニテ下スベシ兎角内攻セヌ

様スハニ別ニ青鷲ヲ焼食ハシム

蝮蛇傷 先瘡口ノ邊ヲ乱刺ス只雞冠中黄ヲ貼ス之ニ承淋散

ニテ圍ムハニ内ハ烏頭湯腫強キハ十散及鼻散ヲ日ニ三々服用

ス此症ハ毒ノ浅深ニヨラス紫丸ヲ多ク用ヘシ何カ出血ヲ多クハシ

鈕叩風 指ノ腹ニ飛セヌ多ハ頸首項背ニ侵延スル者ニ飛シ様

カ疥癬ニ似タル者ナレモ疥癬ナシハ梅ニ飛スル也此症ヲ以分ツル

此症癢痒甚ク搔ケハ爛シテハヒコル也治公ハ疥癬ノ如クシテナシ

異之簡風散浮萍加大黄或ハ疥癬ノ湯茅モヨシ銀荆湯土天

黄羔或ハ谷朮散ヲ貼ス

枯筋筋初起粉刺ノ如クニ面赤暈アリ多ク胸乳ノ向ニ出ル者ニ

日久ノ潰爛ス其後魚ノ目ノ如ク赤色ニシテ光ル頑肉ニ其頑肉

次第ニ長大ニ成ス荆敷ニ薑蒜仁ニ果ヲ眼サシ不治者ハ深ク

頑肉ノ根ヲ切斷ス也切后青蛇ヲ貼ス隨分生肉ハカケテ切ラズ

物也。内清解ヲ用ヒ劇キ症ハ竜門丸ニテ下スベシ

奶癩 小兒頭上三面コヌカノ如ク出来ル者之甚痒シカケ汁
出テ愈程キ者之連壳飲粉の凡外中黄或ハ紫雲ヲ貼之ヤ
ハリ遺毒之

驚拱頭 一名腦猪準緯ニ取節ト云俗ニハス子ト云或ハ頭分ト云
皆也小兒胎毒ニテ頭上ニ生メ多ク膿ニナル者之膿ヲ推セ直ニ
赤クナリ老リ出ル者之針ヲ破敵ヲ貼ス蓋兼ニハ先鋒内會ハ
托而ヲ與ウ此症復月ニ多シ膿潰后ハ丸突ニ蛇皮ノ末ヲ煉
合セ貼スルハ瘡根出来又之

小兒遺毒爛斑 此胎毒之此症諸症ヲ顯スト云此多ク肝内陰
囊膜下眼目頭上赤ニ瘡ヲ発シ爛ル者之大餅ニ粉の凡或ハ
連壳飲甘茶凡紫丹竜門丸ニテ時々下ベシ諸症治方多クト云此

羊之尽シ雅シ故ニ畧之

蜈蚣串 初起肝門ノ辺ニ生ス痔漏ニ紛ル者之痔漏ハ本

管アリ此ハ本管ナシ只四辺ニケラ虫ノク、リタル如ク漏ラナス
故ニ名ク内羊葛根加木附粉のヲ用ヘシ若脱症ヲ見ハサナ補
ハ物杯ヨシ各切斷シ破敵ヲ貼ス治法諸毒ノ如ク夜涼候論ニ
九漏ノ名アリ準緯ニ久シキ漏瘡ノ諸漏ノ名アリナシ此流注
附骨疽其他諸瘡名ノミイヌス或ハ誤治又漏ヲナセリ瘡名
ノ九漏杯ト云テアリ此由ヲ以テ名ツク故ニ畧ス

小兒瘡風瘡 瘡后湯杯ニ厚ク付ルヲアリテ凡邪ヲ受ル故ニ瘡

瘡ノ如ク總身ハ油カナルモノ出ル之連壳飲厚萍湯持々紫
凡下下ス下之或ハ荆艾湯ヲ洗モヨシ格別ニ忌ベキ症ニテ

小兒赤游丹 此ハ三四歳ノ小兒ニ限ルト云リ周身ハ赤斑ヲ發シ

呼吸急迫之或ハ驚搐ス治ヲ速ニセサレハ傷亡ノ死スル之
委中尺沢ヨリ血ヲトリ毒ノ所在ヲ見定メテ血ヲ取ベシ方ハ
犀角消毒丸或ハ黃連解毒丸犀角便秘スル者ハ紫雪丸或ハ
調胃承氣ヲ下スルモアリ外其ノ紫雪撰用スル此症大人
ニ發セシト見タリ然レハ古今ノ說ナレハ先後テ矢張丹毒ヲ
治セリ此症多ク瘰癧附骨疽大流注等ノ治瘰癧中七八ノ過
テ多ク發スルヲアリ外其ノ根加犀角或ハ黃連解毒湯之準
履火丹門ニ小兒此症ヲ患シハ危危ト云リ正宗六赤遊丹ハ
兒ニ限ルトアリ全ク不然治物ニテ能談スルハ小兒赤遊丹ハ
大人ノ丸丹ノ劇症ト同シ初起赤班ヲ發シ暈ノ如雲片此症
凝血甚メ右里ク瘰癧ル者アリ是ハ不治也
小兒走馬疳 初起一瘡ヲ生シ紫黑ニナリテ瘰癧ル之上アコトハ上

ア不瘰癧ル劇キハ半面モ瘰癧ルモノ之方ハ清胃散ニ堯犀不疳
牛ノ症之多症ナレハ一日ニ死ス緩症ナレハ十日程迄ニ死スル之金
匙ト白毫散ニ蛙ノ里需糸殺ルニ大人ニモ此多ク瘰癧也
胎疔 中ハ敗液之正宗ノ五福化毒紫因ヲ用ルルトアリ上ニ青
蛇ヲ貼ス至テ軟カナル者之中ハ液ナリ也
瘰癧 瘰癧ノ右僻毒聚リテ所在不定發スル之瘰癧ハ骨ヨリ
生スト云リ故ニ瘰癧リ骨ノ多ク骨ニ付テ瘰癧骨ニ成リ膿ヲ
リト見ハ早クサスベシ針ノ雞卵左突注ヲ十補ヲ貼ス此
症發スル短不定ト云レ多ク手足ニ發スル者ハ長ク愈サレ者ハ
必治ヲ強クスヘカラス
瘰癧 此瘰癧中ニ紫粒ノ如ク色紫黑ニシテ痛甚シク嫩肌ニ瘰
腫ハ又赤之疔ノ治法ニ從ベシ凝血強シト見ハ破血ノ膏乾

ヲ船べし

黄水瘡 俗ニ云水瘡之頭面頰骨へ出テ黄水ハ流シ集
粒ノ如クツクノトノ一面ニ蔓ルモノ之瘡雲膚解情上防風

若粉散ヲ付ルモヨシ
大人口破 舌上及唇ニ小瘡ヲ生シ乾燥ノ破裂ス此治法年

門十兒物瘡ト同シ

臭田螺 足ノウヒラノ上ヲリカバミノ処ニ生ヌ初起白ク腫テ

痒ニ甚シク破シテ脂水ヲ流ス其水臭更甚シ故床子並ニ
洗ベシ此粉散ヲ付ルモヨシぬ十數臭水出ルト甚キ者ハ粉散

丸並用ス

牛程瘻 ソコマノノ大豆ノ大サノ瘻肉出来テ次第ニ大ニナリ

皮コルク成テ其瘻肉ト生肉ト一処ニナリ步行不能石杯ヲ踏テ

其瘻肉ヲ外ヨリ踏故ニ生肉ヲ瘻肉ニテツリ故ニ痛忍ベカラ

サレコロコメスヲ以テ瘻肉生肉ノ界ヲ切取ヘシ白雲決勝

ニテヨシ或ハ瘻中歩行ノ湿氣ヲ各并ハ瘻肉ト生肉ト向

ニ水溜リ膿ニナル故ニ痛強シ此時ハ針ヲヨリ膿ヲヌクベシ瘻肉

モ取ベシ

僵脚疔 モトフト之液杯ノ刺ヤウ忌キト漏ノヤウニナル者之治方

初起十數ヲ用ベシ又午ノ節ニ殺スルアリ夜蘭ニ交テ節天

蛇ニ云疔疔行ニ云楠ノ横腹ニ出来ルニ又楠ノ白ハ出来節

ヲ隔テ出来ルヲ寸疔ト云

虫蝕瘡 指頭腫シテ水泡スル者中ヨリ血交リ水出シ此瘡

糸ニ墨ヲツケテ引通スヘシ皮ハ入ラヌ様ニ刺ス之痛無止者

又是ハ墨ヲ水泡中ニ養ス為也大瘻リノセヌモノ也中黄ニ五物查

虫本伝

湯

酸痛

ヨリ劇キ膏散建中ヲ用

陰風

葡萄疫

面部ツググト集リ出テ水泡ヲ生ス右ニハ少ク爛ル者之針ノ

水ヲ取リ中黄ヲ貼ス平血欠葛根加吉更此症正宗ニ天地不在

ノ天ヨリ発ストヨリ極スニ此症ハヤハリ時毒ト思ハル也十數日宜シ

誤吞針鏡

鼻硬咽候 鼻骨ノ咽喉ニ三ツルハ酢一合五勺

血ニ或ハ端破ホヲ白湯ニテ送下ス竹木刺ニ肉中ニ布ヤ魯

疑ニキ症ハ危突ニ鹿眼ホヲ煉交セ貼ス神効アリ餅咽ニ

ツマリタルニ胡椒油一呆或ハ酢ヲ濃煎ノ服スルモヨシ又二術清

風ノ治可也針ノ咽ニタケタルニハ所在ヲ見定メ切破リ抜トル

下シ

中砒毒

毒ニ五ツテ惡寒発熱シ口燥劇シキ者ハ銜入スル之録

豆大黃

甘中右水煎或ハ黃連解毒ヲ用ルヲアリ

河豚魚毒

一奇方砒クソヲ塩湯ニテ飲スベシ或ハ橘樹散

白砂糖ヲ食ハシムヲアリ

陰毒

至テ希也其初會陰ニ生ス甚キ者ハ小股迄モ瘡ハ希ナ

リ此症痛ニ強ク其時陰莖発起ス痛止メハ莖モ亦瘡ハ賜

ニテ蒸セハ暫痛ニ止ムサスレハ直ル之此ヲ鑿視スルニ會陰膿

管アヲハ刺ノ膿ヲ取下シ多ク不化也初起大牡蠣后ハ物如麗

草差ハ破敵此症潰后ト云ヒ膿満ル寸ハ陰莖発起ス膿ヲ又

ケハ又十二ル之

委中毒 初起寒熱甚ク痛強ク食可ニ成ス膝頭次第ニ腫セ
委中四逆腫腫坚硬石ノ如ク日ヲ経テ黒腐ニナリ腐潰シ出
血甚ク右ハ膿ハ少シ宛ホシ凡次第ニ脱ノ臭氣不可近遂ニ
死ス治法大牡或ハ越木烏桕里良ハハ物陽此症初メ浮
萍並ヲ手強ク用ハ滿散スルトモアラス欲未試

失策 地取ヲ別タズ石ノ様ニ堅キ毒ノ血痛ハ痛ナシ是痛アリ

右ハ紫黑色ニナリ潰テ死スルニ流榮散堅陽天木凡ヲ用ル
トアリ及花スル寸ハ脈強數ニナリ日晡潮熱ヲ發スルニ

瘡 一人夏月瘡ヲ患ヒ兼店ニテ截殺ヲ求テ急ニ服ス瘡速
ニ陥テ精神爽カク三日ヲ経テ精神昏冒ニ對テ不食ス五日
ヲ経テ危ノ時上ニ一塊ヲ結ブ大サ拳ノ如ク時々衝心ス此瘡
ノ痛ナシ口乾咽乾ニ寒熱ス脈強數ニナリ時々筋スルトアリ心下ヨリ

脇下腹ニ至逆微滿シ眼目黄也將ノ上下ニ行ヲ發シ諸醫皆

疝ナリトノ瘡スレト寸効ナシ予友行テ診セリ是亦疝トノ瘡

湯ヲ與フ則日更ヲ再診スルニ腸益甚ク小便頻ス大便ハ血ヲ下ス

仍テ師ニ告師歎ノ曰皆治ラ熟シリ此症最早候八九ヲ過シ

リ故ニ不治之先ニ方ヲ與ヘヨト長流水一分ヲ飲シメ則日黄

連解毒加味豆ヲ冷服ス二日ヲ経テ塊七八ヲ減ス諸症漸

々ト退ト云凡數日ニノ痛甚甚ニ故ニ虛脱ノ死セリ可怖

辰半ニヲ治ヲ施サハ生ヲ得ルナラシ

71/462

弘化五年戊申二月請復本氏書于
樂天齋海樞

春林軒燈下送談

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 春林軒燈下送談]

