

丹溪心法附餘

卷 六 十

火鬱門

脇痛

跌撲損傷

疥瘡


天泡瘡 楊梅瘡  
凍瘡 腳上爛瘡  
頭面瘡

癰疽

乳癰

疔瘰

諸瘡



丹溪心法附餘卷之十六

火鬱門

脇痛 七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛 木氣實 有死血 有痰流注 肝急木  
 氣實用蒼朮川芎青皮當歸之類 痛甚者肝火盛以當歸  
 龍會丸姜汁下是瀉火之要藥 死血用桃仁紅花川芎  
 痰流注以二陳湯加南星蒼朮川芎 肝苦急急食辛以散  
 之用枳芎川芎蒼朮血病入血藥中行血治咳嗽脇痛以二  
 陳湯加南星香附青皮青黛入姜汁 脇痛有瘀血行氣藥  
 中加桃仁不主宗大并香附之類 有火盛者當伐肝木 左金

丸治肝火 有氣鬱而胃腸痛者看其脉沉澁當作鬱治  
痛而不得伸屈者蜜丸龍會丸最快 脇下有食積一條扛  
起用吳茱萸炒黃連 控涎丹一身氣痛及脇痛痰挾死血  
加桃仁泥丸服 右脇痛用推氣散出嚴氏方 左脇痛用  
煎藥為君加柴胡或小柴胡湯亦可治  
入方

小龍會丸

當歸

草龍膽

酒洗

山梔

炒

黃連

炒

川芎

各半

大黃

煨半

蘆會

三錢

木香

一錢

一方有黃芩柴胡各半兩无大黃木香  
一方有甘草柴胡青皮无當歸梔子

右為末入麝香少許粥糊丸如菘豆大每服五十九丸姜湯

下仍以琥珀膏貼痛處 龍會丸亦治有積因飲食大飽

勞力行房脇痛

當歸龍會丸

治內有濕熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處却

以生姜汁吞此丸

痛甚者須炒令熟服

草龍膽

當歸

大梔子

黃連

黃芩

各一

大黃

蘆會

半兩

木香

一錢

黃栢

一兩

麝香

半錢

右十味為末麵糊丸

一方加柴胡川芎各半兩 又方

加青黛半兩

蜜丸治脇痛

麴丸降肝火

柳青丸

瀉肝火

黃連

半斤

丹溪心法附錄卷之六  
右爲末蒸餅糊丸服

附諸方

推氣散 治右脇疼痛脹滿不食

枳殼

桂心

片子姜黃

各半兩一  
本作疆蚕

甘草

錢半

右爲末每服二錢姜棗湯調下酒亦可

枳芎散

治左脇痛刺不可忍者

枳實

炒

川芎

各半兩

粉草

錢半

右爲末每服二錢姜棗湯下酒亦可

塩煎散

和劑方治男婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不能已

及脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁

去壳

甘草

炙

茯苓

去皮

草果仁

去皮

煨

肉豆蔻

川芎

洗

茴香

炒

萹澄茄

大麥芽

檳榔

良姜

枳殼

蒼朮

陳皮

去白

羌活

厚朴

右以咀每服三錢水一盞入塩少許煎至七分去渣空心

温服

沉香升氣丸

御藥院方

治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞

塞

沉香

檳榔

各二錢半

人參

訶子

煨去核

大腹皮

炒各半兩

白朮

紫蘇葉

香附子

炒

神麴

炒

麥蘖

烏藥

各一兩

陳皮

去白

甘草

炒

姜黃

各四兩

京三稜

煨

蓬莪朮

煨

益智炒去壳

厚朴去皮姜製各二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去渣溫服

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛

氣促喘急見喘類

調中順氣丸 按粹方 治三焦滯滯水飲停積脇下虛滿或時

刺痛

木香 白豆蔻仁 青皮去白 陳皮去白

三稜炮各一兩 大腹子 半夏湯泡七次各二兩 縮砂仁

枳榔 沉香各半兩

右為末水糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸陳皮湯送下

復元通氣散 和劑方 治氣不宣通或成瘡癩并閃挫腰脇氣

滯不散方見腰痛

枳殼煮散 治悲哀傷肝氣痛引兩脇 方見氣滯

一方 治脇下疼痛如神効

小茴香炒一兩 枳殼五錢炒

右為末每服二錢鹽湯調下

十棗湯 治脇痛甚効病人氣實可用虛人不可用

甘遂 芫花慢火炒紫色 大戟各等分

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢入實

更加一錢量虛實加減

控涎丹 見痛風

二陳湯

見痰類

左金丸

見火類

小柴胡湯

見濕熱

琥珀膏

見積聚

○或謂予曰脇痛之症多是肝火上升不得條達之故而局方塩煎散沉香升氣散分氣紫蘇飲調中順氣丸俱是辛温之劑但能行氣開鬱豁痰消積而已其於降火未之有也病源是火而用辛温之藥治之則是以火濟火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經有驗而筆之於書豈肯妄作而誣後人哉但後人不善於用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注予每度之凡

左脇痛甚者即是肝火盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛凉之劑以治之凡右脇痛微者即與痰流注并食積宜用塩煎散順氣丸等藥辛温之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二証婦人多有之以其憂思忿怒之氣素蓄于中發則上衝被濕痰死血阻滯其氣而不得條達故作痛也故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散火兼之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山萸菴蓉男子之佳珍此之謂也

跌撲損傷七十五

庚集

丹溪心法

○跌撲損傷須用蘇木和血黃連降火白朮和中童使煎炒

在下者可先瀉神接後下瘀血 在上者宜飲薑汁或和  
斑喫 切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心即死  
入方 治跌撲損傷

跌撲出血者姜汁香油各四兩酒調服之

治擗傷骨折及血出者

用滑石甘草為末人參湯調服次用生薑自然汁一盞  
米醋一盞獨核肥皂四箇敲破投於姜汁米醋中紗片  
漚過去渣入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者皆可

接骨散

沒藥

乳香各五錢

自然銅煨一兩滑石一兩

龍骨三錢

赤石脂三錢

麝香一字  
另研

右為末好醋浸沒煮多為上乾就炒燥為度臨睡服時入  
麝香以茶匙留舌上溫酒下分上下食前後服若骨已  
接尚痛去龍骨赤石脂而服多儘好極効

○世以自然銅為接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補  
血補土俗工惟在速効以固利迎合病人之意而銅非煨  
不可服若新出火者其火毒金毒相煎挾香挾藥毒雖有  
接傷之功而燥散之禍甚於刀劍戒之

又方

冬瓜皮

阿膠各等分

右炒乾為末以酒調飲醉為度

附諸方

加味芩薊湯 三因方 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸 白芍藥 芩薊 荆芥穗 百合 水浸半日

右以咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時服

紫金散 楊氏家藏 治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血停積於內心腹脹悶

紫金藤皮 二兩 降真香 續斷 補骨脂

無名異 煨細酒 琥珀 別研 蒲黃 牛膝 酒浸

當歸 洗焙 桃仁 去皮尖 大黃 紙裹 朴硝 別研各

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利即完

復元活血湯 按料方 治從高墜下惡血留於脇下及攻痛不可忍

柴胡 五錢 花粉 當歸 各三錢 紅花

甘草 錢一 大黃 酒浸 川山甲 三錢 桃仁 五十箇酒

右以咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分服

以利為度

當歸道滯散 聖惠方 治落馬墜車打撲傷瘀血大便不通浮

腫痛昏悶畜血內壅欲死

大黃 一兩 當歸 二錢 射香 少許

右為末每服三錢熱酒下和劑方只大黃當歸二味等分

酒調下或以酒煎服亦可

鷄鳴散 治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃 酒蒸 一兩 桃仁 七粒去皮尖 當歸尾 五錢

右為末酒一碗煎去渣五更鷄鳴時服取下惡血即愈若氣絕不能言急以熱小便灌之即甦

奪命散 濟生方 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心腹疼痛大小便不通

大黃 黑牽牛 各二兩 用石灰慢火炒

右為末每服二錢用煎酒調下約行四五里再用熱酒調牽牛末二錢雀之頂下惡血成塊以盡為愈

○已上諸方辛涼疎導瘀血之劑

花蔡石散 和劑方治一切金刀所傷打撲傷損身躄出血者

急於傷處搽藥其血自化為黃水如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立效若牛舐腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上搽藥血止立活如無桑白皮用生麻綾亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後搽藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黃 上色明淨者四兩搗為粗末 花蔡石 一兩搗為粗末

右二味相拌和勻先用紙筋和塩泥固濟瓦罐子一箇候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書入

封五行字用炭一秤籠置周匝自巳午時從下着火令漸  
漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿雖冷取出細研以  
細絹羅子羅極細磁盒內盛依前法服

沒藥降聖丹 和劑方治打撲閃胸筋斷骨折攣急疼痛不能  
屈伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱皮內刺  
痛有背拘急身軀倦怠四肢少力並皆治之

自然銅 火煨醋淬十二次  
研為末水飛過焙 川烏頭 生酥

骨碎補 臘去毛 白芍藥 沒藥 別研

乳香 別研 當歸 洗焙各一錢 生乾地黄

川芎 各一錢半

右並生用為細末以生姜自然汁與蜜等分煉熟和凡每

一兩作四丸每服一丸推碎水酒各半盡人蘇木少許同

煎至八分去蘇木熱服空心食前

治打撲內損筋骨疼痛本事方

沒藥 乳香 芍藥 川芎

川椒 去目及閉口者 當歸 各半 自然銅 三錢半炭火燒

右為末黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻丸如彈子大  
每服一丸用好酒煎開乘熱服之隨痛處臥霎時連進有

効

乳香定痛散 治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香 沒藥 川芎 白芷

芍藥 甘草 牡丹皮 生地黄

右為細末每服二錢溫酒并童子小便調不拘時服

沒藥乳香散 御藥院方 治打撲損傷痛不可忍者

白朮 剉五兩 當歸 焙 白芷 沒藥 別研

肉桂 去皮 乳香 別研 甘草 炒各一兩

右為末入研藥并研令勻每服二錢溫酒調下不拘時

乳香黃香散 應驗方 治打撲損傷筋骨及瘡腫爛作疼痛

乳香 五錢另研 沒藥 五錢另研 黃耆 當歸 酒浸

赤芍藥 川芎 甘草 麻黃

陳皮 各一兩 粟殼 去蒂炒一兩 人參 去芦一兩

右為散每料分作十服每服用水二盞煎至一盞去滓溫

服

接骨散 和劑方 治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍

者此藥能接骨續筋止痛活血

定粉 二錢 當歸 二錢 鵬砂 二錢半

右為末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

補損當歸散 和劑方 療墜馬落車傷脫折臂呼吸疼痛連進

此藥其痛即止筋骨接續

澤蘭 炒 附子 炮去皮臍各一兩 當歸 炒 蜀椒 炒出汗

甘草 炙 桂心 各三分 川芎 炒六分

右為末每服二錢溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水菘

菜

治打損接骨方 本事方

接骨木 半兩 乳香 半錢 赤芍藥 川當歸

川芎 自然銅 各一兩 煨醋淬十二次 研為末 水飛過焙用

右為末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候溫象手丸如龍眼大如只打傷筋骨及閃肋疼痛者用藥一丸好舊酒一盞浸化藥末熱服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後服食

治打撲損傷骨折 百一選方 此藥專能接骨

夜合樹俗謂之萌葛即合歡花越人謂之烏顯樹

去粗皮炒 芥菜子 炒一兩 黑色四兩

右為末酒調一盛澄清臨臥服又以粗滓登瘡上孔縛之

治打損折骨損斷 經驗方 服此藥自頂心尋病至下兩手遍

身遇受病處則颯颯有聲覺藥力習習往來則愈矣

乳香 沒藥 蘇木 降真香

松明節 川烏 去皮 尖 自然銅 火煨醋淬十次各一兩

龍骨 半兩 生用 地龍 半兩 去土油炒 水蛭 油炒 半兩 血竭 三錢

土狗 十箇油浸焙乾為末 本草名螻蛄

右為末每服五錢無灰酒調下病在上食後服病在下食

煎服

治打撲傷損 經驗方

用胡孫姜研爛取汁以酒煎服渣傳傷處

接骨散 張子和方 并治惡瘡

金頭蜈蚣 金色自然銅 半兩 燒紅醋淬 研為細末用

乳香 一錢 研細末 銅錢 五文 燒紅醋淬研細

子溪公家...

丹溪心法附錄卷之六

金絲水蛭 一錢半每箇作三截 瓦上焙去氣道為度

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見出膿先用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再接乳又入煎藥接骨散半錢再用銀子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破便效

如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半錢同好酒一盞熱調連渣溫服如骨折損以接定不疼如不打了喫了藥立便止在疼痛此方累經效驗不可具述

神聖接骨丹 治打撲傷損跌折肢躄

水蛭 用糯米於砂鍋內炒黃去米三表 兔絲子 髮灰

好綿灰 沒藥 乳香 血竭 各一

半兩錢 一文燒七次醋 射香 一錢 另研

右研令勻每服三錢熱酒調下損在上食後服損在下空心服約車行六七里聞骨作聲息聽鐘鼓砧杵之聲震動恐生蘆節忌食驢肉一服見效

續股散 治折傷筋骨

用半兩錢七箇以桑柴火燒紅好醋內淬之取錢上碎末再入珍珠末一分乳香沒藥少許同研極細好酒調服

接骨散 治跌僕閃崩骨折疼痛

黃麻 燒灰 二兩 頭髮 燒灰 一兩 乳香 五錢

右為末每服三錢溫酒調服立效

丹溪心法附錄卷之六

茴香酒 直指方 治打墜肢躄凝滯瘀血腰脇疼痛

破胡紙炒 茴香炒 辣桂各錢

右為末每服二錢食前熱酒調服

木香調氣散 治從高墜下或打撲傷損腰脇心痛

白豆蔻仁 丁香 檀香 木香各二錢

藿香 甘草炙各錢 砂仁四錢

右為末每服二錢加紅曲末少許童子小便同酒調空心

熱服如無紅曲紅酒亦好

應痛丸 經驗方 治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼米一斤破故紙一斤半 舶上茴香十二兩

骨碎楠一斤 穿山甲去膜去皮炒脹為度柴灰煨亦可也

生草烏一斤剉如葵大

右除草烏一斤用生葱二斤連皮生姜一斤搗爛將草烏

一處淹兩宿焙乾連煎藥一處焙為細末酒煮麵糊丸如

梧桐子大每服五十九酒湯任下忌熱物

○已上諸方辛溫散痛接骨之劑

乳香消毒散 御蒸院方 治一切傷折跌躄腫疼不可忍者

乳香另研 沒藥另研 白欬 白芍藥各一兩

白芥子 當歸各半兩 黃柏另研細末二兩 滑石二兩

黃丹三錢 加血礞半兩

右為細末入另研者一處再另研勻每用新水調如稠膏

攤在紙花上貼患處

烏金散 應驗方 治打撲損傷敷藥

用小黃米粉四兩葱白細切一兩同於砂鍋炒至黑色杵為細末用好醋調成膏于攤在紙上貼於損傷病處後用杉木皮或板以紙包裹四面四片用絹袋扎縛不可動搖三日一換內服前麥骨藥

一方

用葱白砂糖二味相等爛研傳之痛立止且無癢痕

治打撲傷折手足

用菘豆粉新銖銖內炒令紫色用新汲井水調稀厚傳損處以紙將杉木片縛定立效

走馬散 經驗方 治折傷接骨

栢葉

生少用

皂角

生多用

骨碎補

去毛

栢葉

生各等分

右為末於折傷處定入原位以姜汁調藥加糊攤在紙上貼骨斷處用杉木片子夾定以繩縛之莫令搖動三五日後開看以溫葱湯洗之後再貼藥復夾七日如痛甚加沒藥

治打傷損 醫方大成

南星

白芷

半夏

白芨

黃栢皮

赤小豆 各等分

右為細末姜汁調傳患處蜜糖亦好  
沒藥散 拔料方 專治箭傷止血定痛

定粉 一兩

枯白礬 二錢

沒藥 另研

乳香 一兩

各研

丹溪心法附錄卷之六

風化石灰一兩

右各研為末和勻搽上

治諸般打撲傷損皮破血出痛不可忍者

右用赤石脂研末傳之效

金絲膏藥應驗方治打撲傷損閃肭疼痛風濕氣痛

當歸 川芎 蒼朮 香白芷

赤芍藥 木鱉子 大黃 草烏頭各半兩

香油四兩 瀝青半斤 松香半斤 乳香二錢半  
另研

沒藥二錢半  
另研

右前八味同香油四兩熬去渣瀝青松香看熬軟硬冬軟  
夏硬些乳香沒藥攤膏藥時用之

立應金絲膏經驗方

當歸尾 香白芷 杏仁 草烏生剉用

猪牙皂角不脏者去 葱連鬚葉肥者十莖

白膠香三錢 瀝青明者 黃蠟一兩 乳香另研  
各半兩

沒藥另研為末 清油七兩

右將前項六味入清油內依法熬瀝去渣入白膠香瀝青  
溶化攪勻入黃蠟又攪勻待冷入沒乳末攪勻

至聖黑龍膏御藥院方治一切筋骨損傷疼痛

米粉四兩於銀器內炒成塊子 乳香  
色放冷研為細末後入二味

沒藥研細各  
半兩

右研極細末每用或好酒或醋調如膏攤在紙花上貼患

丹溪心法附錄卷之六

三五

處

一方 治跌撲損傷及金刃所傷 此藥止血散痛消腫

風化石灰 重羅過半兩五月五日以薑汁和酥乾 海驃蛸 半兩

老松香 血竭 輕粉 乳香 沒藥

黃丹 飛過無名異去土 松白脂 去皮各半兩

右為極細末濕者乾粉乾則水調蜜調傳患處

淋瀝頑劑散 治從高失墜及一切傷折筋骨瘀血結痛

頑荆葉 半兩 蔓荆子 白芷 細辛 去苗

防風 去芦 川芎 桂心 丁皮

羌活 各一兩

右為末每用一兩塩半匙葱白連根五莖漿水五升煎七

沸去渣通手淋淋痛處冷即再換宜避風

已上諸方外治傳貼之劑

疥瘡 七十六 附天疱瘡 楊梅瘡 凍瘡  
脚上爛瘡 頭面瘡

丹溪心法

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩詳上下根梢用  
及引經藥則可 又云諸瘡以當歸黃連為君連翹甘草黃  
芩為佐 諸痛瘡瘡屬火若稟受壯盛宜四物加大承氣  
湯下之 若性急面黑瘦血熱之人因瘡而痛宜四物加黃  
連黃芩大力子耳草在下焦者加黃柏 若肥胖之人生瘡  
而痛乃是濕熱宜防風羌活荆芥白芷蒼朮連翹取其氣能  
勝濕

○諸瘡藥 膿窠治熱燥濕爲主用無名異 乾疥開鬱爲  
 主用吳茱萸 虫瘡如癰狀退熱殺虫爲主用蕪荑黑狗脊  
 白礬雄黃硫黃水銀殺虫樟腦松香退熱 頭上多加黃連  
 方解石蛇床定痒殺虫松皮炭主膿 腫多者加白芷開鬱  
 痛多加白芷方解石 虫多加梨蘆班猫 痒多加枯礬  
 陰囊加茱萸 濕多香油調 乾痒出血多加大黃黃連猪  
 脂調 紅色加黃丹 青色加青黛 虫多加錫灰蕪荑楨  
 柳 在上多服通聖散在下多須用下 脚腫出血分濕熱  
 用藥  
 入方 瘡有三種  
 膿泡瘡治熱爲主

黃芩 黃連 大黃各三錢 蛇床  
 寒水石三兩 黃丹半錢 白礬一錢 輕粉  
 白芷 無名異少許炒 木香少許痛者用

沙瘡

蕪荑二錢 剪草一錢 蛇床三錢 白礬  
 吳茱萸 黃柏各一錢 蒼朮 厚朴  
 雄黃各半兩 寒水石二錢 輕粉十貼

右爲末油調傳  
 疥瘡藥 春天發瘡疥開鬱爲主 不宜抓破傷  
 白礬二錢 吳茱萸二錢 樟腦半錢 輕粉十盞

寒水石 二錢半 蛇床 三錢 黃柏 大黃  
硫黃 各一錢 檳榔 一箇

又方

蕪荑 白礬 枯 軟石膏 大黃 樟腦 各半兩  
管仲 蛇床 各一兩 硫黃 雄黃 各二錢半

右為末香油調須先洗瘡去痂傳之  
一上散

雄黃 三錢半 寒水石 一兩 蛇床 白膠香  
黑狗脊 各一兩 黃連 半兩 硫黃 三錢 吳茱萸  
白礬 枯在 斑蝥 十四箇 去翅足

右硫黃雄黃寒水石另研如粉次入斑蝥和勻蛇床狗脊等為極細末同研勻洗瘡令湯透去痂用臘猪油調手心  
中擦熱鼻中嗅一二次却擦上一上即愈如痛甚腫滿高起加寒水石一倍如小苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡中有虫加雄黃如喜火炙湯洗加硫黃只嗅不止亦可愈也

附諸方

四物湯 見補損

大承氣湯 見傷寒

升麻牛旁子散 治時毒瘡疹脉浮洪在表者瘡發於頭面  
胃膈之際

升麻和氣飲 治瘡腫癰疥痒痛增寒發熱

升麻 牛蒡子 甘草 桔梗

葛根 玄參 麻黃 連翹 各一錢

右咬咀姜二片水二盞煎一盞服

升麻和氣飲 治瘡腫癰疥痒痛增寒發熱

甘草 陳皮 芍藥 大黃 各一兩 半兩

乾葛 蒼朮 桔梗 升麻 各一兩

當歸 半夏 茯苓 白芷 各三錢

乾姜 枳殼 各半錢

右咬咀每服一兩水煎服

加味羌活飲 三因方 專治四氣外搏肌膚發為癰疹增寒發熱痒

熱痒

羌活 前胡 人參 桔梗

茯苓 甘草 枳殼 羌活 川芎

天麻 各半兩 蟬蛻 去頭 薄荷 各三錢

右咬咀每服五錢水一盞姜三片煎七分溫服

當歸飲子 治內蘊風熱發為瘡疥風癬濕毒燥痒瘡

當歸 白芍 川芎 生苳 白蒺藜

防風 荆芥 各一兩 何首烏 黃芪 甘草 各半兩

右咬咀每服一兩水煎或為末每服一二錢亦得

苦參丸 御藥院方 治肺受熱毒遍身生瘡

用苦參為末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

○已上諸方內消之劑

輕粉散

寒水石 一斤 硫黃

朴硝 各二兩

松香 五兩

枯礬 二兩

輕粉 五錢

右為細末香油調搽

硫黃散

硫黃

川椒

石膏

白礬 等分

右為細末香油調搽

立効散

全蝎

三十枚 巴豆 三十粒 皂角 七箇 炒焦

右為粗末以清油四兩熬至焦黃色去渣次入大楓子蛇

床子白礬末各二兩黃蠟二兩同熬成膏以蠶卵收貯任意搽瘡

一方

白芷白礬各等分為細末入硫黃少許以香油調搽

治諸般疥癩瘡藥

蛇床子

一斤為末

大楓子

取肉四兩

白礬

五兩為末

檳榔

一兩

右糖油半斤調搽小兒頭瘡少加松香輕粉

水銀膏

此藥會稽徐彥劇傳大効

楓子

取肉四兩

輕粉 一錢

水銀

未要茶研不見星一錢

樟腦

二錢

礬生熟 二錢

右先將楓肉研膏次入餘藥勻臘月猪脂和稀用絹布裹

任意搽

又秘方

黑狗脊

蘭茹

藁本

蛇床子

硫黃

井泉石

剪草

百部

藜蘆

各等分

右碾為細末用香油搽手心內搽鼻間之

方 治疥癬諸瘡

雄黃 五錢

樟腦 五分

大楓子 取肉

斑蝥

去足翅炒

狗脊

蛇床子

寒水石

硫黃

各五錢

右為極細末疥瘡用柏油調搽癬瘡用桐油調搽

治疥瘡

大楓子

杏仁

各十粒

右同羊脂搗勻以暴火烘油出搽之

胡粉散

濟生方

治一切瘡癬癰毒甚者

胡粉 一分

砒霜 半分

大草烏

一箇 生用

蝎稍 七枚

雄黃

硫黃 各另研

斑蝥 一枚

射香 少許

右為末先用羊蹄菜根蘸醋搽動次用少許藥搽患處

如意散 宜明方 治疥癬無時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸

牛李子

荆芥穗

各二錢

輕粉 半錢

信砒

二分

牡蠣

半兩

右為細末研勻每臨時臥炒一錢油調遍身搽摩上二半

如後痒不止更少旋塗之股腓之間聞香悉愈

又治疥瘡方

蜜陀僧 蛇床子 硫黃 枯礬 胡椒  
右為末香油調傳

已上諸方外散之劑

丹溪心法

○天庖瘡 用防風通聖散末及蚯蚓泥略炒蜜調傳極妙  
從腓皮上起者是裏熱發於外也還服通聖散見斑疹類

○楊梅瘡 新增

附諸方

治楊梅瘡方

硃砂二錢 雄黃一錢半 苦參 荆芥穗 天麻  
麻黃 牛蒡子 面粉 槐角子各三錢

右為細末用糖心雞彈為丸梧子大每服二十九丸用雞湯  
或羊肉湯送下一日一服表出毒氣再不服忌一月房室  
神効

又方

土茯苓 四兩 牙皂 地骨皮 五加皮  
白蘚皮 各一兩

又方

右作二十服用灯草車前子為引子煎服  
冷飯團 一名土茯苓 五加皮 白蘚皮  
防風 白芍藥 木瓜 各一兩半 皂角子  
白丑 各三粒 生地黃酒洗 地骨皮 牛膝去芦

丹溪心法卷之六

黃連去酒 槐花 川芎 尋風藤

威靈仙 白茯苓 杜仲炒斷 白芷

當歸酒浸洗 甘草炙半 荆芥穗一兩

右咬咀二十服每服水一鍾半酒半鍾共煎至一鍾飯後

溫服服動此藥可用後又開薰楊梅瘡藥並治

又方

當歸 連翹 羌活 荆芥穗

薄荷葉 枳殼 黃柏 茯苓

車前子 防風 木通 芍藥

川芎頭上用 山梔 桔梗

天花粉 姜蚕 白芷 甘草

金銀花 獨活各一兩 柴胡 前胡各半兩

右咬咀作二十服每服用水一鍾煎至七分溫服上多食

後服下多食前服服此仍用薰藥並治

薰楊梅瘡方

雄黃 沉香各三分 乳香 沒藥

硃砂各五分 血竭三分 黑鉛 水銀各一錢

右為末均作紙燃七條用香油點燈放床上下令病人兩腿

抱住上用單被罩身蓋之口噴冷水頻頻換之則不損口

頭一日用三條後每日用一條薰之有效

又方

水銀 板硃 黑鉛各二錢 白花蛇一錢

丹溪心法卷之六

共研爲末作紙捻七條頭，日用三條，後每日用一條，用香油點燈，放兩腫單被連頭蓋了口，噲冷水頻換。

治楊梅瘡後腫塊方

冷飯團十五兩 防風

木通 薏苡仁

防已

茯苓

金銀花

木瓜

白鮮皮

皂角刺各五錢

白芥子四錢

當歸身七錢

右作三十服，每服用水鍾半，煎至八分，空心午飯前晚飯前各一服。忌魚雞生冷房事及煎炒茶酒，十餘日立效。虛弱人加入參五錢，其妙不可盡述。

一方 專治年久楊梅頭瘡

水花硃

一錢

枯礬

朱砂

各一錢二分

三味共研細末，用全蝎酒煎膏爲丸，作六九分，作三日服。用羊肉鮮魚等湯送下，九日全好。

一方 治楊梅癰

柏油二兩

全蝎三箇

蜈蚣一條

鉛粉一兩

右先將香油二兩煎全蝎蜈蚣，待焦去渣，次入柏油鉛粉，柳條攪勻，捏成餅子，照瘡大小攤貼，三日一換，九次全好。

一方 治楊梅再漏瘡

用大鱉甲一箇，去肉，湯洗淨，加刺蝟皮一箇，象牙末三錢，共爲細末，棗肉爲丸，如櫻桃大，每服一丸，空心童子小便送下，服七日，後仍用三味末，豬膽汁調傅。

丹溪心法

凍瘡 用煎熟桐油調蜜陀僧末傅

丹溪心法

○脚上爛瘡久不愈 先以豆腐漿水洗二三次懸鉤渣葉地慕渣葉搗細入塩芫少盆之

附諸方

治凍瘡 百一選方

用茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

治手足皸裂 百一選方

用瀝青二兩黃蠟二兩共熬攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令皮軟拭乾將藥於慢火上畧炙擦傅

治手足皸裂春夏不愈者 澹寮方

生姜汁

紅糟

塩

猪膏

臘月者佳

右研爛炒熟擦入皸內一時雖痛少頃使皮軟皸合再擦即安

治脚跟皸

用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候油沸頭髮浴爛出火攤冷以瓦器收貯勿令灰入每用百沸湯泡洗皸裂令軟拭乾傅其上即安一方加米粉

又方 醫方大成

用五倍子為末同牛骨髓填縫內即安

治手足裂 張子和方

用白芨不拘多少為末水調塗裂處  
治脚指縫爛瘡

搗雞時取鵝掌黃皮焙乾燒灰存性為末濕則搽之  
治脚指縫爛瘡及因暑手扒兩脚爛瘡

用細茶口嚼碎爛塗之餅熱燥濕其瘡立愈  
神應散 治脚指了濕爛

枯礬 六錢 黃丹 半錢

右為細末乾糝患處經夕立瘥

○頭面瘡 新增

附諸方

摩風膏 聖惠方 摩風止痛消腫定痰治頭面唇鼻諸瘡及肌

肉裂痛者悉治之

沉香 白附子 木香 獨活

白斂 白芨 天麻 當歸 去芦

白芷 檀香 零陵香 藿香

杏仁 去皮 桃仁 去皮各 茅香 甘草

防風 白芍藥 各一錢半 川芎 木通 各一錢

黃芪 二錢 龍腦 研四錢 半夏 十二兩半 清油 二斤

黃蠟 九兩 冬月用 大苳萸 連穰一箇剉干

右剉用油浸七日於石器內慢火煎候白芷微黃色以白  
綿瀘法津放淨罐內密封澄一宿再瀘過於上等磁碗中  
慢火再輕溫動次下黃蠟攪勻放溫次下研細龍腦於前

於磁金內盛定每用少許摩患處

治頭面生瘡燥痒黃水出

蜜陀僧

硫黃各二錢

輕粉少許

右為末酥油調搽

一方 治白秃瘡

用金頭蜈蚣一條皂角不蛀一斤劈開去皮弦以蜈蚣納入夾定以麻絮緊沉於糞缸底七日取出焙乾碾為細末先以溫湯將瘡洗溫潤然後敷之如乾以清油調搽數次除根

一方

用熟皮烟膠一兩輕粉一錢研勻調搽又法用枯白礬同

烟膠調搽亦佳

秃瘡藥

輕粉 五錢

黃蠟 二兩

右用鵝油一二兩調搽

治小兒白秃瘡 聖惠方

用淡豆豉一合炒令煙出色焦為末用飯飲調屋塵一團於炭火內煨令灰燼並細研入輕粉少許油調剃頭了搽之 一方治頭瘡無屋塵一方有射香無輕粉

治面上耳邊浸淫瘡 聖惠方有黃水出久不愈名香辨瘡

殺羊鬚

荆芥

乾棗

去核各二錢

右燒存性入膩粉半錢同研末先用溫水洗香油調塗

王粉散 治熱汗浸漬頭面及遍身成瘡種痒炊痛

定粉 一兩 蛤粉 九兩 石膏 白石脂 各半

滑石 八兩 粟米粉 寒水石 燒出火毒 各二兩

白龍骨 半兩

右為末研令極細每用少許乾擦患處

癰疽 七十七 附腸癰 乳癰

庚集

丹溪心法

○癰疽只是熱勝血 六陽經六陰經有多氣少血者有少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞諸經惟少陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多氣少血肌肉難長瘡久未合必

成死症速用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵 陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱瀉陽滯以寒治之陰滯以熱治之 人中年以後不可生癰縱有痛腫參之脉症但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常驅熱拔毒昇氣之藥虛虛之過如指諸掌 內托之法河間治腫炊于外根盤不深形証在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急瀉內托以救其裏宜復煎散除濕散鬱使胃氣和而平如或未已再煎半料飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散半兩如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也然世俗多用排膿內補十宣散若用之於些小瘡與冬月時令即可若潰瘍於夏月用之其桂朴之溫散佐

以防風白芷吾恐雖有參芪難爲倚伏 一婦年七十形實  
性急而好酒腦生頭暈五日脉緊急且瀉急用大黃酒煨細  
切酒拌炒爲末又酒拌人參炒入姜煎調一錢重又兩時再  
與得睡而上半身汗晷竟病已失此內托之意 又一男子  
年五十形實色黑背生紅腫及胛骨下痛其脉浮數而洪緊  
食亦不下冬月與麻黃桂枝湯加酒黃栢生附瓜萋子甘草  
卽是活青皮人參黃芩半夏生姜六帖而消此正內托之法  
精要內托散乳香菘豆等藥想此方專爲服丹石而發者設  
不內托丹石而發恐非必用之劑 瘡先死爲腫以致鬱積蒸  
肉爲膿故其痛多此瘡之始作時也膿潰之後腫退肌寬痛  
必漸減而反痛者此爲虛宜補亦有穢氣所滯宜和鮮風寒

通者宜溫散

入方

附骨癰

熱在血分之極細初查先以青皮甘草卽後破其熱血初  
腿腫以人參黃連茯苓各二錢瓜萋子四十八粒分二貼  
入竹瀝熱飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼朮佐黃栢之辛行以青皮冬月加桂枝夏月如條子  
芩躰虛者加牛膝以生甘草爲使大料煎入姜汁帶辣食  
前飲之病深者恐木栢桂枝十數貼癰不勤加少麻黃二  
三貼又不動恐癰將成矣急掘地坑以火煨紅沃以小便

赤体坐其上以被席圍抱下截使熱氣燻蒸膜理開氣血暢而愈

鉄圈散 治癰疽腫毒

乳香 沒藥半兩 大黃 黃栢 黃連

南星 半夏 防風 皂角刺 木鱉子

瓜蒌 甘草即 草烏 阿膠

右爲末醋調成膏砂石器內火熬黑色鴉翎傳之

圍藥 諸般癰疽傳上消散

乳香 沒藥 大黃 連翹 黃芩

黃連 黃栢 南星 半夏 防風

羌活 瓜蒌 阿膠 皂角刺

右研爲細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒用

圍藥鉄井欄

貝母 南星各七錢 連翹 五倍子

經霜芙蓉葉各一兩

右爲細末用水調傳四向腫處止留中間一竅出毒氣

隔皮取膿法

馱蹄細切 蕎麥麵 一兩 白塩 半兩 草烏四錢

右爲末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末醋調成

膏用白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫自退

騎馬癰

大粉草帶節四兩長流水一碗以甘草淬焙水盡爲末

入皂角灰少許作四服湯調頻服效

又方

甘草節白芷黃連破者龍骨枯礬赤石脂併用  
敷疽癰方

草烏

黃連

紫金皮

白芷

大黃

芙蓉皮

朴硝

粳米 各等分

右為末蜜水調敷如瘡盛以蜜調雄黃末圍定瘡元大小  
前後敷前藥末

取朽骨久疽及痔漏者有之

取烏骨鷄脛骨以上等雌黃實之塩泥固濟火煨通紅  
取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大以帛熬送

入孔中竅內更用膏藥貼之

便毒

山梔子

大黃

乳香

沒藥

當歸 半錢

瓜蒌仁 二錢

代赭石

錢

右作一服煎

又方

木鱉子

大黃

瓜蒌仁

桃仁

草龍膽

右吹咽濃煎露星月一宿清早溫服立愈

又方

白殭蚕槐花為末酒調服一方加酒大黃

附諸賢論

劉河間宣明論曰人之瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風濕所乘脾氣濕而內熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪內作即無頭無根氣血相搏作者即有頭有根結壅盛則為膿赤核腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則為實痒則為虛非謂虛為寒也正謂熱之微甚也痒者表疾故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也灸之以火潰之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越慄熱內作故也瘡痒

皆為火熱而反腐出膿水者猶穀肉菓菜熟極則腐爛而潰為污水也潰而腐爛水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癢疹也瘡氣赤痛丹燥熱勝氣火之色也

附脉理

脉訣舉要曰癰疽浮數惡寒發熱若有痛處癰疽所發脉數發熱而疼者陽不數不熱不疼陰瘡發癰之脉弦洪相搏細沉而直肺肝俱數

附諸方

狗寶丸 濟生方 專治癰疽發背附骨疽諸般惡腫將發時先覺口中煩渴四肢沉重遍身壯熱乃其候也此藥功效不

可具述

蟾酥 一錢

金頭蜈蚣

七條全者  
酥灸黃色

輕粉

雄黃

滴乳香

沒藥

烏金石

即石灰  
各一錢

狗寶

癩狗腹中得之  
一錢又云一兩

狗膽

一箇乾者用之去  
皮黑狗臘月者佳

鯉魚膽

一箇乾者用  
乏臘月者佳

粉霜

黃蠟  
各三錢

硃砂

半兩

射香

一分

孩兒乳

一合頭  
首者

鉛白霜

一錢一  
本無此

右先將乳汁黃蠟放在罐內文武火化開次將各藥末和成劑用時大人九菘豆大小兒九如芥子大每服三九病重者加至五九用白丁香七箇研爛新汲水調送下腰以下食前服腰已上食後服如人行五里用熟葱白湯投之

即以衣被蓋定汗出為度已後只喫白粥常服十宜散留

頭其四邊以烏龍膏貼

烏龍膏

濟生方治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子

去壳

半長

各一兩

水粉

四兩

草烏

半兩

右於鐵銚內慢火炒令轉焦為末出火毒再研以水調傅

瘡四邊留頭出毒氣

追毒丹

濟生方

治癰疽疔漏諸惡瘡黑陷者先服狗寶九次

貼烏龍膏收腫解毒去赤暈然後用針刀開瘡納追毒丹

覆以乳香膏使之潰去敗肉排膿然後用生肌藥

白丁香

一錢

雄黃

二錢

巴豆

七粒去壳皮心  
不去油皮如泥

黃丹

二錢

輕粉

一錢

右研和加白麪三錢滴水為丸如麥狀針破瘡網之上覆以乳香膏追出膿血毒物痛瘡四壁死肌不去不可治者亦以此法追毒去死肌生新肉疾小者一粒大者加用之乳香膏 濟生方 追膿血消惡毒

木鱉子

去壳 細剉

當歸尾

各一兩

柳桂

七八寸剉之

此已上用清油四兩慢火煎令黑色次用

白膠香

明淨者四兩共研細入油煎化以繩濾之

乳香

沒藥 各半兩

右再治淨鉄銚又傾煎藥油蠟在內候温入黃丹一兩半以兩柳枝攪極勻再上火煎不住手撻候油沸起手下直待注在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水盆中出火毒搜成劑收之遇用以絹帛攤貼

桃花散 宣明方 一切瘡生肌藥

白芨

白歛

黃栢

黃連

乳香

另研射香

黃丹

各等分

右為極細末糝在瘡上一二三日生肌平滿

○已上諸方治癰疽次第之劑

如無狗寶丸以測然其人奪命丹代

內疎黃連湯 治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便燥結脉洪實者

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草各一兩

連翹

二兩 大黃 二兩半

右咬咀每服一兩入姜煎

秘方奪命散 治一切癰疽無名惡瘡皆可治之其效不可  
盡述

當歸尾

乳香 各一錢

川山甲

用蛤粉炒黃色去粉六錢

皂角針 燒

陳皮

金銀花

各三錢 貝母 一錢

赤芍藥

甘草節 各六錢

沒藥 二錢

花粉 八錢

防風

白芷 各五錢

右咬咀每服一兩用無灰酒一大碗煎至半碗紙糊口勿

令定氣病在上食後病在下食前服

當歸消毒散 應効方 治癰腫初發

荆芥

牛蒡子

甘草

防風

當歸

赤芍藥 各一錢半

右用水二盞煎至八分去滓溫服食後

神仙活命散

治癰疽發背發腦發髻發腦癰毒疔腫肚

癰腿癰附骨癰疽惡瘡惡漏瘡血塊氣塊面目手足浮腫

隨病加減並皆治之

金銀花

一兩五錢 皂角針

一兩 貝母 去心

天花粉 各四錢

當歸尾

滴乳香

大黃 各五錢

沒藥

水鱉子

去壳 甘草

穿山甲

用蛤粉炒黃去粉淨

赤芍藥

各三錢

防風 去芦

香白芷

各二錢半 橘皮 去白一錢半

右每服五錢水煎服若老人及躄虛者加生黃芪半兩若  
臟腑閉滯者服九寶散量病上下服之

九寶散

當歸 白芷 甘草 瓜蒌 黃芩

生地黄 赤芍藥 熟地黄 川芎 各等分

右每服五錢水酒共一鍾半煎病上食前服下食後服

九珍散 簡易方治一切癰疽瘡節腫毒因氣壅血熱而生者

赤芍藥 白芷 當歸 川芎 大黃

甘草 生乾地黄 瓜蒌 北黃芩 各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓熱服兼治乳癰

及丁瘡

赤芍藥散 治一切惡瘡癰疽疔腫初起不消增寒疼痛

金銀花 赤芍藥 各半 大黃 七錢 當歸

枳實 甘草 各三錢 大瓜蒌 一箇

右每服五錢水酒各一鍾煎至一鍾不拘時溫服

玄參散 治癰疽腫痛不進飲食

玄參 一兩 升麻 射干 大黃 各五錢 甘草 二錢

右每服五錢水一鍾半煎至八分不拘時溫服

懸壘散 張子和方治發背惡瘡

懸壘 一箇 大黃 金銀花 皂角刺 各一兩

當歸 半兩

右剉碎每服五錢酒一碗煎七分去滓溫服如有頭者服

黍粘子

消毒湯 德生堂方一名紫花地丁散治惡瘡膿未成已成者

腫大等証

丹溪心法附錄卷之六

紫花地丁去芦 金銀花 當歸 大黃酒浸

赤芍藥 黃耆各半 甘草一錢 加升麻

右剉為末作二服每服酒一碗銀石器煎五分服

當歸連翹散通玄論治一切風熱難腫瘡疽咽膈不利舌腫

喉閉鼻衄出血咳嗽痰實腸胃燥澀大小便結滯消癰腫

解風毒活血脈保真元宜通適身結滯

連翹 當歸 大黃 梔子 芍藥

金銀花

右各等分水二盞生姜三片煎至一盞去滓熱服甚者加

一方 治發背惡瘡

瓜蒌一箇 金銀花 皂角刺各一兩 沒藥一錢

甘草節 當歸各半

右每服五錢以酒一碗煎溫服加鼠黏子更佳

治七十二等無頭惡瘡

荆芥 梔子各二錢半 茯苓 白朮

人參各三錢 川芎 芒硝 大黃

當歸 芍藥 升麻 薄荷

蒼朮 連翹 石膏 桔梗

滑石 黃芩各半兩 黃芪 甘草各二錢

右咳嗽病重者一兩病輕者五七錢葱白一握并金銀花同煎去渣熱服汗出為度如疼加乳香咽喉痛加竹葉灯

丹溪心法附錄卷之六

三十七

心同煎

藤黃飲子 秘方治一切丁腫惡瘡癰疽疼痛

大黃 四兩

甘草

茯苓

牡蠣

生用各一兩

人參

川芎

梔子

赤芍藥

金銀花

各半兩

木香

白芷

各六錢

當歸

七兩

右吹咀每服八錢水二盞煎至一盞溫服

加減藤黃飲子 應驗方治一切癰疽瘡腫

金銀花

黃芪

防風

川芎

羌活

大黃

赤芍藥

薄荷

連翹

麻黃

當歸

石膏

黃芩

桔梗

白朮

白茯苓 各八分

荆芥 三分

甘草 三分

山梔子 一分二厘

人參 一分 滑石 一分七厘半

厘半

芒硝 二厘半

右用水二盞生姜三片煎至一盞去滓溫服食後

漏蘆湯

精義治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚睛五發癰

疽初覺三日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢麻疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不安皮膚壯熱大便秘澇小便赤黃並宜服之惟姙娠忌服

漏蘆

白欬

黃芩

去黑心

麻黃

去節

枳實

熬炒去穢

升麻

芍藥

甘草

炙各一錢

大黃

二錢

朴硝

一錢

千金漏蘆湯

精要治證同前

漏蘆

連翹

黃芩

白欬

枳殼

去穢熬炒

辨毒丸 通玄論 治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽筋脉拘攣咬牙

升麻 粉草 炙 麻黃 去根節 大黃 一錢半 濕紙煨 各一錢  
朴硝 一錢 別研

右作一服用水一盞半煎至八分去滓空心熱服

辨毒丸 通玄論 治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽筋脉拘攣咬牙

驚悸一切熱毒並宜治之 方見火類

○已上諸方辛涼內疎之劑

內托復煎散 機要 癰疽托裏健胃

地骨皮 黃芩 茯苓 白芍 人參  
黃芪 白朮 桂 甘草 防已  
當歸 各一兩 防風 三兩

右改咀先以蒼朮一斤水五升煎至三升去朮入煎十二

味再煎至三四盞取清汁分三四次終日飲之又煎蒼朮

渣為湯去渣依前又煎十二味渣分飲之

神效奪命丹 秘方 治一切發背疔瘡及破傷風陰証傷寒

枯礬 一錢 蝸牛 焙乾 血竭 二錢 銅綠 一字  
蟾酥 一錢 輕粉 二錢 硃砂 三錢 為衣

右用小兒母乳汁和丸如梧桐子大硃砂為衣遇此病令  
患人自嚼生葱一二根爛吐出血藥一丸在內吞下煎藥  
恐藥未嚥逆之狀却以熱酒一二盞送如重車行十里路  
遍身汗出天氣斟酌衣被蓋易汗出毒氣腫自消如病人  
昏沉人代嚼葱白如前服

淵然真人奪命丹 專治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一切

行痰小法對症發毒

無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡証藥中至寶病危者服之亦可矣萬無一失不可輕易

蟾酥 二錢乾者老酒化

血竭 一錢

乳香

沒藥

銅綠

硃砂 為衣各口

輕粉 半錢

膽礬

寒水石 各一錢

雄黃 三錢 射香 半錢

腦子 半錢無亦可

蝸牛 二十一箇連壳用

蜈蚣 一條酒浸多黃去頭足

右為細末將蝸牛研作泥和前藥為丸如葶豆大若丸不就以好酒煮麩糊為丸每服只二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸子裹在葱白內用無灰熟酒三四盞送下於避風處以衣被蓋覆約人行五里之

久再用熱酒數盃以助藥力發熱大汗出為度如汗不出重者再服二丸汗出即效初覺者二丸即消三五日病重者再進二丸如疔瘡走黃過心者難治汗出冷者亦死如病人不能嚼葱搗爛裹蒸仍以熱酒吞下瘡在上食後服瘡在下食前服後忌冷水黃瓜茄子油麩猪羊雜肉魚一切發風瘡毒等物及婦人洗換狐臭犯之難消

蟬酥丸 李俞南方治一切諸惡瘡已發未發服之微汗即愈

雄黃

乳香 各一錢 蟬酥 一厘

右三味用黃酒熟麩糊為丸如葶豆大每服三丸葱白湯下不退再下服

止痛當歸散 精義治腦疽發背穿潰攻痛

附錄小法

四

當歸

黃芪

人參

官桂

芍藥

甘草 炙

生地黄 各二錢半

右用水一盞半煎至一盞去滓溫服日進三服

內托散 治一切惡瘡不可忍神效

甘草 半兩

御米殼 半兩去頂

乳香

沒藥 各二錢

右為細末用雌雄黑豆十粒生姜半兩麩五枚水一大盞半同煎五七沸隨病上下食前後服

乳香散 不事方 治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多令人嘔吐

菘豆 四兩

乳香 好者一兩

右同研極細為末每服三錢新汲水濃調食後服

乳香護心散

治癰疽發背疔瘰疔疔毒氣攻心

菘豆粉

四兩 乳香 一兩 硃砂 一錢

右為細末每服二錢濃煎甘草湯調下

一方 治癰疽無頭者

用蜀葵花子一粒新汲水吞下須臾即破如要破服三四粒有驗

透膿散

瑞竹堂房治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀一服不移時而自透累有效驗

蛾口蠶

用出了蛾兒蠶兒

右將蠶兒一箇燒灰用酒調服即透切不可兩箇三箇蠶兒燒服若服一箇只一箇瘡口服兩箇三箇即兩箇三箇

附錄小法所錄

瘡口切莫輕忽

竹葉黃芪湯 精義 治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者

淡竹葉 二分 生地黄 一兩 黃芪 黃芪去腐

當歸 川芎 甘草 芍藥

人參 麥門冬 去心 半夏 湯洗 石膏 各四分

右用水一盞半竹葉五片生薑五片煎至一盞溫服

內托千金散 瑞竹 治腦背癰疽乳便等惡瘡

人參 當歸 黃芪 芍藥

川芎 甘草 瓜蒌 白芷

官桂 桔梗 金銀花 防風 各七分半

右用水二盞煎至七分入酒半盞去滓溫服如痛甚者倍

加當歸芍藥或乳香二錢日進三服一服之後瘡口內有

黑血出者或遍身汗出皆藥之功效如病勢猛惡須秤藥

一兩水一大碗煎服未成膿者自散已成膿者不用針破

自透此藥累經功效

黃芪扶苓湯 精義 治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃芪 白茯苓 官桂 去皮 麥門冬

五味子 川芎 各一錢半

右用水一盞半姜三片棗子三枚煎至一盞去滓溫服食

前日三服 內補十宣散 精要 治一切癰疽瘡癤未成者自消之已成者

附錄

四

速潰敗膿自出無用針擠惡肉自去不用針刀服藥疼痛頓減其效如神

黃芪

鹽湯潤焙

人參

當歸 各四錢

厚朴

桔梗

桂心

川芎

防風

甘草

白芷

各七錢

右為細末每服五錢熱酒調服不飲酒木香湯調下

內托散

綿黃芪

甘草

金銀花

牡蠣

煨淨二次各三錢半

右為末作一服水一盞煎至七分入酒一盞再煎七分隨

瘡上下食前後服

參蘇內托散 李俞甫方

川芎

當歸

薄荷

甘草

各一錢

紫蘇

二錢

苦參

三錢

右咬咀用水二鍾棗二枚煎七分服不拘時

神效托裏散 和劑方治癰疽發背腸癰疔癰無名腫毒煨作

止痛增寒壯熱若傷寒不問老幼虛人並皆治之

忍冬草

五兩去梗

黃芪

五兩去芦

當歸

八兩三錢

甘草

炙八錢

右為細末每服五錢酒一盞煎至一盞病上食後病下食

前少頃再進留滓外傳未成內消已成即潰也

○已上諸方辛溫內托之劑

一方 治癰疽發背初起

用獨蒜一片厚二指置患處以熟艾灸二十七壯如無獨蒜

大蒜亦可

南星膏 濟生方治皮肌頭面上生瘡癩大者如拳小者如粟

或軟或硬不疼不痛宜用此藥不可輒用針灸

用天南星大者一枚細研稠粘滴好醋五七滴和膏如無

生者則以乾者為末醋調如膏先將小針刺腫處令氣透

却以膏攤紙上象癩大小貼之覺痒則頻貼取效

消腫毒方 簡易方專用塗諸瘡疽

川芎 蚌粉 草烏 海金沙

赤小豆 天南星

右為末用生地黄汁調塗患處

蜀葵膏 直指方治癰疽腫毒

以黃蜀葵花用鹽搽服入磁器密封經年不壞每用患處

傳之如無花根葉皆可用

治發背未潰已潰最有神效 醫方大成

厚朴 二錢 姜 陳皮 二錢 蒼朮 五錢 米 甘草 二錢

右入桑黃菰五錢同為末瘡已潰則乾搽之未潰則油調

塗之

拔毒散 消腫定痛

蒲黃 白芷 半夏 黃丹 各一兩 赤小豆 半兩

右將半夏白芷為末入蒲黃黃丹豆末和勻金銀藤搗白

然汁調傅四圍頻頻水潤腫退

拔毒膏 李俞甫方治腫毒諸惡瘡神效

升溪心去對余卷五 四十四

南皂角 五倍子各五錢 乳香 沒藥 雄黃各二錢  
右五味各生用為細末用好醋熬貼瘡上留頂  
乳香散 止痛消腫

乳香 沒藥 粉霜 輕粉各一錢  
黃米粉四兩 赤皮葱一兩 蝸牛十四箇 三味一兩 處砂 錫內炒黑

右為末津調紅絹留孔貼周圍  
敷腫毒未破者

右用蝦蟇一箇先炒石灰後用剝開炒研泥用絹攤上貼  
患處自破

拔毒散 治癰腫丹毒肉色變異或著四肢或在背脊遊走  
不定焮熱疼痛拔毒消腫散熱定疼

石膏一兩半 寒水石三兩半 甘草 黃蘗各半兩

右為細末水調時復以雞翎刷掃以芭蕉自然汁調妙  
水澄膏 治熱毒腫痛大効

黃連 黃柏 白芫 白斂各四錢  
雄黃一錢 乳香 沒藥各五錢

右為細末水調雞翎掃在瘡腫處  
治一切惡腫及發背高起未破膏藥方

草麻子一百粒 男髮一塊  
右以熬膏入黃丹成膏貼之只一箇便消加黃蠟少許

鐵箍散 治諸般發背瘡癰腫毒杖瘡  
用芙蓉花及葉曬乾為細末以好醋調敷貼患處如杖瘡

丹毒心法附錄卷之六

四

赤腫用雞彈清調貼冷水亦可加皂角少許尤妙

一方 治癰疽發背及惡腫毒

飯姜石

一方出淮安清河驛

野西瓜藤

茨菇箭

各四兩

右為細末用雞清調敷患處如乾及井花水勤掃妙

一方

用五葉藤即五瓜龍搗爛敷患處立瘥

一方 治癰疽未潰

用瓜萎根赤小豆等分為末以醋調敷之

一方 治發背癰疽下瘡腫毒吸出膿血惡水此法甚佳

用苦竹筒三五七箇長一寸一頭留節薄削去青皮大小

用之以蒼朮白斂烏柏皮厚朴艾葉茶芽白芨白蔞藜等

分為粗末將竹筒充膠藥水煮十數沸藥乾為度乘竹筒熱以手按上緊吸於瘡口上候膿血水滿自然脫落不熱用毛拔脫易換竹筒如此三五次其毒盡消即敷生肌藥肉滿後用膏藥即愈

一方

用蜂窠同葱研為膏先將瘡口擦動或見血或不見血將藥塗在瘡上中留一孔以帛縛定如人行約五里其瘡覺疼更待多時其丁自出然後敷生肌藥忌一切毒物

一方 治癰疽腫毒

用蒼耳根及葉燒灰存性同乾葶以醋和勻塗上乾易之不過十餘次拔出其根

一方

用景天草，一名慎火草，不拘多少，搗爛取汁塗之。

水澄膏 治熱腫毒疼痛

大黃

黃柏

鬱金

白芨

天南星

朴硝

黃蜀葵花

晒乾各一兩

右為細末，每服二錢，以新水一鐘半，攪勻，候藥澄底，去面上浮水，取藥攤紙上，貼於腫處，如覺燥，津唾潤之。若皮膚白色者，勿用。一方只用白芨末半錢，水碗內沉下渣，去水脚於皮紙上攤貼，瘡上亦名水澄膏。

圖藥 治諸般腫毒，傳上消散。

用黃指白芨草，烏南星，白芷，天花粉，石膏，鬱金，甘草，貝母。

大黃木鱉子，皂角刺各等分，為細末，用雞清調，傅神效。加石灰尤妙。

針頭散 治瘡疽腫，如木硬者。

蟾酥

射香 各一錢

右同研極細，以人乳汁調和如泥，入籠內盛乾，不妨每用少許，以唾津調敷於腫處，更以膏藥貼之，主毒氣自出，不能為瘡，雖成瘡亦輕。

針頭散 通文論 治惡瘡，追毒去死肉。

人言 一錢

雄黃 半錢

乳香 一錢

射香 少許

右為細末，每用少許，以唾塗瘡上，用膏藥貼之。

桃花散 通玄散 治一切惡瘡，去死血，生肌肉，去風活血。

龍骨

虎骨 各二錢

白芨

白歟

烏魚骨

赤石脂

白石脂 各一錢

黃丹 少許

寒水石

用炭火燒赤放冷一兩六錢

右為細末量大小貼之立效

生肌散 治癰疽瘡毒感口生肉

赤石脂

海鰓鱗

龍骨 各一兩

乳香

沒藥

血竭 各二錢

輕粉 一錢

朱砂

鬱金

黃丹 飛過

黃連

白芷 各五錢

右為細末，搽瘡口上用燈心數莖，却用膏藥貼之。

木香散 治瘡口久不斂者

木香

煨榔 各一錢

黃連 二錢

右為細末，搽瘡口如痛，加當歸一錢。

紅玉散

切腫毒癰疽生肌肉

用寒水石不拘多少，以塩泥包裹，火煨黃丹少許，水飛過。

用皮紙擗於火上烘乾，為度，研細末，搽瘡口。

洗毒散 通玄論 治諸般惡瘡風濕陰蝕瘡，並宜此洗之。

用蛇床子、地骨皮、地丁、麻黃、荆芥、防風、枯礬，各三錢。

右用水三碗，煮白二根，煎至二碗，無風處洗。

軟膏 治一切風熱瘡及小兒頭瘡

巴豆 十箇

瀝青

黃蠟

香油 各五兩

膩粉 一錢

右先將瀝青、香油、黃蠟熬次入巴豆，不佳，再攪，候巴豆焦。

黑色去巴豆却入膩粉令勻放冷敷瘡上

神仙太乙膏 治入發癰疽及一切惡瘡軟疔不問年月深

遠已成膿未成膿並宜貼之如蛇虎傷蝎螫犬咬并湯火

刀斧所傷打撲跌損者無不可治如發背先以溫水洗瘡

淨用無絨軟帛拭乾却用緋絹帛子攤膏藥貼之其膏藥

可收十年不壞愈久愈烈可用磁罐盛之

玄參 白芷 川當歸 去芦肉桂 去麁皮

大黃 赤芍藥 生乾地黄 各半兩俱剉

右用麻油一斤浸春五日夏三日秋七日冬十日瀝滓油

熬得所下黃丹半斤滴油在水聚為度

善應膏 應驗方 治一切癰疽腫毒發背腦疽漏瘡癰之金瘡

便毒癰瘡及小兒頭瘡丹毒寒濕冷痺肢節疼痛手足頑

麻打撲傷損 內疔癰血蜈蚣咬蝎螫婦人乳癰月間敗

血臍腹疼痛並用此拔散毒氣立効先須洗淨瘡腫然後

貼藥

黃丹 半斤 沒藥 乳香 各二 白欵

木鱉子 去皮 白芫 當歸 官桂

杏仁 白芷 各二 血竭 一錢二 槐枝 一兩二

柳枝 一兩二 錢 真麻油 一斤四兩

右件十一味內除丹乳沒竭外七味剉碎入油浸三日文

武炭火鍋內熬黃色瀝出蘆漿方下黃丹以新柳枝長五

六寸如小錢大攪勻令熬丹褐色撥下鍋子在地却用柳

冊後心法對餘卷十六

枝撓藥出盡烟充入乳香沒藥血竭入鍋內仍用柳枝撓  
勻三五十遍候藥冷傾在甕內盛春三月間合如常貼  
用

千槌膏 治一切無名惡瘡

草麻仁四十粒 杏仁九粒 山豆仁 胡桃仁各四十

楓香脂四兩 加乳香沒藥各二錢半

右爲一處槌一千下成絲者新水拔之爲度

乳香善應膏 治癰疽發背諸般惡瘡打撲傷損筋骨疼痛  
血皆流之

乳香 沒藥 血竭各五錢 阿魏二錢

射香一錢 大黃 黃連 黃柏

防風 荆芥 芍藥 白芷

玄參 當歸 連翹 巴豆

蘇木 大楓子各一兩 木鱉子八箇

川山甲八片 黃丹一斤 水 槐桃柳嫩枝各二寸

清油二斤

右除乳香等五味另爲末將其餘藥到碎入清油內煎令  
黑色瀘去渣入黃丹不住手撓成膏却入前五味藥末再  
撓令勻攤貼患處

書金九龍膏 治癰疽瘡毒

香白芷 如棗大者 巴豆去殼 草麻子去殼

木鱉子去殼各一百 槐條各一百 柳條二十寸

研碎心法對餘條下

乳香 沒藥各三 白礬五錢 黃丹二十

香油 三斤

右將前藥同香油煎以槐柳條不住手撈滴水中成珠方  
瀾去渣再煎却下黃丹撈勻將白礬逐時入內後下乳香  
沒藥撈勻務要煎熬得法然後收貯攤貼忌婦人雞犬見  
之

千槌膏

瀝青一斤 杏仁四十 乳香 沒藥各一  
輕粉二錢 香油五兩 黃蠟四兩

右將瀝青香油黃蠟同鑿化撈勻却入煎四味取出於石  
上搥千餘下用紅絹攤貼之

綠膏藥 治諸般惡瘡腫毒軟癩

銅青 草麻子 去殼各 松香 四兩 木鱉子 去殼五  
杏仁 五錢 巴豆 五箇 乳香 二錢 輕粉 五十貼

右各為末搗令勻於淨石上用斧搥千餘下成膏收貯水  
浸旋用

紅膏藥 治腫瘡及諸瘡毒湯火金瘡等傷

黃蠟 一兩 香油 三錢 黃丹 半兩

右先以黃蠟鑿化次下香油黃丹撈勻再熬以瓷罐收貯  
臨用攤貼

妙應膏 治瘰癧一切惡瘡腫毒及杖瘡

桃柳槐枝 各半 當歸 一兩 木鱉子 去殼  
半兩

行溪山法時餘卷下

黃丹 一斤 乳香

沒藥 各半兩 另研

右先將香油三升，慢熬次下桃柳槐枝木鱉子當歸，候焦瀝去渣，待冷方下黃丹乳香沒藥，以槐條攪勻，再以慢火熬不在手，攪滴水成珠不散為度，以磁瓶收貯旋攤用。

已上諸方外消之劑

忍冬酒

癰疽發背初發不問何處，或眉或頤或頭或項或腰或脇或手足及婦人乳癰，當服此藥神效。

忍冬藤 五兩 槌碎不 可犯缺器 大甘草節 一兩 生用

右同入砂罐內，以水二碗，文武火慢煎至一碗，入好酒一大碗，再煎數沸去滓，分作三次溫服。一月一夜喫盡，如病重，一日一夜要服兩劑，候大小腸通利，則藥力到，若無生

藤乾者亦好，若取忍冬葉研爛入白酒少許調和敷，疔瘡

四圍中留，下口洩其毒氣亦妙。

遠志酒 三因方治一切癰疽發背癰毒

用遠志一味洗淨去心，焙乾為末，酒調二錢，澄清服之，以渣傳患處。

一醉膏 楊氏家藏方治發背發腦一切惡瘡

甘草 半兩為 粗末 沒藥 研二 錢半 大瓜萸 一枚 去皮

右用無灰酒二升，煮至一升，放溫頓服，如一日不盡，作三次。

一方 治癰疽發背疔瘡

野紅花 即小 薊草 五葉草 即五 瓜龍 稀荑草 大蒜 一箇

右搗爛用好熟酒一椀調汁服之立效

一方 治發背癰疽惡瘡丁腫疥癬及遍身生瘡如蛇頭

用生白礬一兩為末黃蠟七錢鎔開和勻為丸如梧桐子大每服十丸至二十丸不拘時米飲送下溫熱水亦可如瘡未破則內消如已破則便合若服金石藥中毒宜服此藥最妙欲治咳嗽化痰用人參五味子湯臨臥吞下

一方 治癰疽疔腫惡瘡及黃疽

用茨茹連根同蒼耳草等分搗爛以好酒一鍾漚汁溫服若以乾末每服三四錢溫酒調服

一方 治癰疽腫毒一切惡瘡

稀食草 一兩

蚕繭 七箇

乳香 一錢

右為末每服二錢熱酒調服如毒重連進三服得汗妙

○已上諸方專治之劑

救苦散 和劑方治癰疽冷物

大黃

桔梗

金銀花

黃耆

甘草

梔子

紫花地丁各等分

右咬咀每服一兩酒半碗煎隨瘡上下服

五聖散 聖惠方治症同前

瓜蒌 一箇

生姜 一兩

大黃 一兩

皂角刺 一兩

甘草

金銀花 各一兩

右咬咀每服一兩水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿空心服

又方 治疔疔前

猪牙皂角 七箇燒存性

梔子 七箇燒

川山甲 七箇燒

油胡桃 七箇燒

右為末作一服空心調下用酒

又方 治疔疔前

木鱉子 七箇去壳

甘草

荆芥

當歸尾 各二兩

右咬咀水酒煎露空心服併進三服成膿亦散 一方鼠

黏子一錢炒細末入蜜一匙淨朴硝一匙溫酒空心服亦

效 一方蜈蚣三條搗碎好酒調服有膿即散 一方牙

烏為末南星生姜為末濕貼上

又方 治疔疔前

大黃

梔子

貝母

川芎

白芷

牡蠣

大瓜萸

當歸

右煎法如前

又方皂角膏

皂角 炒焦

韶粉

右等分和勻以熱醋調仍以紙攤患處貼頻頻以水潤之

即効

治硬毒 不問日久有膿者其効如神

大黃

梔子

木鱉子 去壳皂角

牡蠣

地丁

連翹

甘草 各一兩

右咬咀酒水煎露一宿空心服之以利為度

治毒散 聖惠方 治便毒

當歸 甘草 大黃 各五錢 金銀花 少許

右咬咀水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿溫服之  
消毒飲 治便毒初發三四日可消

皂角刺 金銀花 防風 當歸

大黃 甘草 瓜蒌仁 等分

右咬咀水酒各半煎食前溫服仍頻提制項中髮立効

○已上諸方治便毒之劑

丹溪心法

○腸癰 大腸有痰積死血流注 桃仁承氣湯加連翹  
尤近肛門破入風者難治防風之類

附脉理

脉訣舉要曰腸癰難知脉滑可推數而不熱腸癰何疑遲緊  
未膿下以平之洪數膿成不下為宜

附諸方

桃仁承氣湯 見吐血

復元通氣散 技粹方 治諸氣泄耳聾腹癰便癰疝疝無頭止  
痛消腫

青皮 陳皮 各四兩 川山甲 炮 瓜蒌根 各二兩

加金銀花 一兩 連翹 一兩 甘草 熟 各半

右為細末每服二錢熱酒調下

治腹內癰腫

丹溪心法附錄卷之六

五十五

大黃 一兩取末 四錢半

破故紙 一兩取末 二錢

牛旁子 一兩取末 四錢半

牽牛 一兩取末 二錢半

右和作一服蜜水調空心服以利為度

丹溪心法

○乳癰 乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故窮不得通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣熾熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核於初起時便瀉及痛揉令稍軟吮令汁透自可消散失此不治必成癰癩治法疎厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汗濁之血以生甘草之節消腫道毒以瓜蒌子或加沒

藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或湯或散或加減隨意消息然瀉以少酒佐之若加以艾火兩三壯於腫處其効尤捷不可輒用針刀必至危困若不得於夫不得於舅姑憂怒鬱悶肝火積累脾氣滯阻肝氣橫逆遂成隱核如大棗子不痛不痒數年後方為瘡爛名曰慈岩以其瘡形狀似慈岩火也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理

入方

乳癰方

- 青皮 瓜蒌 橘葉 連翹
- 桃仁 皂角刺 甘草節 如破多加參芪

右以水煎入酒服

乳癰癆勞癰腫

石膏煨 樺皮燒

瓜蒌子 升草節

青皮

右以水煎服

治乳有核

南星 貝母

甘草節 瓜蒌各一兩 連翹半兩

右以水煎入酒服

又方

人參 黃芪 川芎 當歸

青皮 連翹 瓜蒌 白芍

升草節 乳岩小破加柴胡川芎

右以水煎入酒服

乳硬痛

沒藥一錢 甘草 當歸各三錢

右作一服水煎入酒少許煎飲

吹妳

金銀花 天蒼麥 紫葛藤等分

右以醋煎洗患處立消如無下二物只金銀花亦可

乳粟破 少有生必大補

人參 黃芪 白朮 當歸

川芎 連翹 白芍 甘草節

右以水煎服

附諸方

秘傳湧泉散 應驗方 治乳婦氣腫壅塞乳汁不行及經絡滯  
滯妳乳脹痛或作癰腫

王不留行 白丁香 漏蘆 天花粉

白殭蚕 川山甲 火煨黃色各七錢

右為細末每服四錢用猪蹄湯調下

秘傳金銀花散 應驗方 治乳脉不行結成癰腫疼痛不可忍  
者

金銀花 當歸 黃耆 蜜炙 甘草 各二錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾入酒半鍾去滓溫服食後

橘香散 聖惠方 治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者

藥下即不痛神效蓋因小兒吹乳變成

陳皮 不拘多少湯浸去白日乾麩炒黃

右為末射香研酒調下二錢

治婦人吹乳奇效

用大車頭邊油垢圓如梧桐子大每服五十九丸溫酒下

勝金丹 治吹乳

用百齒霜即梳上髮垢是也凡如梧子大黃丹為衣每服  
三丸倒流水送下服後如患左乳左臥右乳右臥溫覆出

汗倒流水者取木傾屋上流下是

瓜蒌散 治乳癰姊勞

瓜蒌 一箇去皮焙 甘草 生三錢 乳香 一錢另研 當歸 酒浸焙半兩  
沒藥 二錢另研

右用無灰好酒三升銀石器內慢火熬取一升清汁分作二服飲之

通和湯 治乳癰疼痛不可忍者

穿山甲 炮黃 川木通 各一兩 自然銅 半兩醋淬七次  
右為細末每服二錢熱酒調食遠服之

一方 治乳癰無名腫毒初起

用五葉藤 即五瓜龍 不拘多少生姜一塊好酒一椀搗爛

去渣熱服汗出為度仍以渣敷患處

一方

用新栢葉去枝梗一握洗淨以朴硝一匁同入臼內杵之旋加清水紐取自然汁半碗先令病人飲三兩口仍用雞翎蘸汁掃於患處中間留一眼四邊頻頻掃之其腫自消

一方

用生地黄搗汁塗之一日三五次立效  
○廣按丹溪云癰疽之証陽滯於陰脉浮洪致陰滯於陽脉沉細弱瀆陽滯以寒治之陰滯以熱治之此乃治癰疽之大法也請陳其肯夫所謂陽者氣也鬱而為火無形之物也陰者血也鬱而為痰有質之物也陽無形

子金心法附錄卷之九

癰疽

故浮而在表淺而大所謂難也陰有質故沉而在裏深而惡所謂疽也癰脉浮洪弦數陽之象也疽脉沉細弱澁陰之象也癰屬氣滯於血疽屬血滯於氣總而言之皆是熱勝血也治癰以寒藥是正治之法也治疽以熱藥是從治之法也夫藥性熱則開行性寒則踈泄疽乃有形之陰非熱藥從治豈能開行之乎此古人用藥內踈內托乃正治從治之義也

### 疔癰 七十八

#### 丹溪心法

○疔癰用針刀鏟破頭上以蟾酥敷之後用菘豆野菊莎末酒調飲醉睡覺即痛定熱除不必去疔自愈也 治一切疔

瘡用紫梗菊花根莖葉皆可研碎取汁滴口中飲之

○癰癰 血氣痰熱 以牡蠣煨過爲末玄參搗膏爲丸桑

椹黑熟者搗汁熬膏湯調服紅者曬乾爲末湯調服師云大田螺連肉燒灰存性爲末入射香少許濕則乾敷乾則油調

敷 夏枯草大能散結氣而有補養血脈之功能退寒熱虛者儘可倚伏若實者以行散之蒸佐之外施灸亦漸取効

入方 治癰癰

海藻 洗去沙

昆布 採去土同上二

何首烏 木曰搗

皂角刺 炒令

公蛇退

樹上或牆上是雄用 一條平地上者是雌

右五味爲細末和勻一處猪項下刀口肉燒熟蘸煎藥末

吐食後倒置處眠一伏時每核灸七壯口中覺烟起為度  
膿盡即安初生起時灸曲池男左女右

附諸方

寶鑑保生挺子 治疔瘡背疽瘰癧一切惡瘡

金脚信 雄黃 硃砂 各二錢 麝香 一錢

輕粉 半大盞 半大盞 巴豆 四十九粒文武火炒研

右為極細末用黃蠟五錢溶開將藥合成挺子冷水浸少  
時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一餅子  
次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹  
神聖膏 治一切惡瘡

當歸 藜蘆 各半兩 沒藥 二錢 黃丹

黃蠟 各二兩 乳香 一錢 琥珀 二錢 膽礬

粉霜 各一錢 白膠香 三兩 清油 二斤 木鱉子 五十箇  
去殼

巴豆 十五箇 槐枝 柳枝 各一百  
去殼

右件一處先將槐枝柳枝下油內熬焦取出不用後下餘  
藥熬至焦黑亦漚出不用將油澄清下黃丹再熬成膏用  
緋帛攤之立効

千金托裏散 治疔瘡發背一切惡腫

官桂 人參 甘草 川芎

白芷 芍藥 各一兩 木香 沒藥 各三錢

乳香 二錢 當歸 半兩 連翹 一兩 黃芪 一兩半

防風 桔梗 厚朴 各二兩

右十五味為細末每服三錢酒一盞煎三二沸和渣溫服  
無時

破疽丹 治瘡腫一切風熱

大黃 二兩半 生半熟 芒硝 甘草 各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後茶清溫酒任化  
下重便半盞研化服亦得忌冷水

已上數方治疔瘡次第之劑

蟾酥丹 危氏方治疔瘡

蟾酥 不拘多少

右以黃丹白麩等分搜和為丸如麥粒大針破疔瘡以二  
粒納之 又方單用蟾酥每用粳米大重針瘡口納入

者不須針用水澄膏用白芨末半錢水盞內澆去水脚於  
皮紙上攤開貼瘡上 聖惠方取蟾酥油調封瘡口立效

蟬蛻散 聖惠方治疔瘡最有功效

蟬退殼 白僵蚕 各等分

右為末酸醋調塗四圍留瘡口候根出稍長然後拔根出  
再用藥塗瘡上方不用醋只用油調塗 一方用蟬蛻為  
末蜜水調半碗服之及以津唾調搽瘡上即愈

一方 治疔腫初發

用蒼耳根莖苗子一色者燒灰為末用醋其調塗瘡上毒  
根即出或藍靛調尤好 一方用蒼耳草一大握生薑四  
兩同研爛入注頭酒一洗去渣熱服大汗即愈仍用渣傳

瘡

回生錠子 精義方 治疔瘡

草烏 去皮尖 十二兩 射香 一字用 當門子 蟾酥 七粒 煨 米大 巴豆 七粒 去皮

右為末麩糊丸作錠子如有疔瘡先銜刺至痛見血用此錠子縫入用膏藥貼之重者於疔瘡四面縫之三日根自拔下藥最宜緊用

立馬回丁丹 治疔瘡走徹下止

金脚信 蟾酥 血竭 硃砂

沒藥 各五分 麩粉 片腦 射香 各一字

右為細末生草烏頭汁為錠如麥子長大用時將瘡頭刺破納入一錠第一日瘡腫為效以膏藥貼之

留楔 一名紫金錠子 治疔瘡諸惡腫毒

續隨子 五兩 川烏頭 甘草 各二兩 蟾酥

雄黃 白礬 各一兩 射香 二錢半 辰砂 一兩

片腦 二錢 人言 輕粉 各五錢 桔梗 一兩

黃連 一兩 白丁香 三錢 巴豆 四十九粒 去壳

右各為細末再入乳鉢內投蟾酥巴豆同研勻麩糊丸成錠子如指彈大陰乾如遇諸瘡以井花水磨塗瘡上如乾再搽

飛龍奪命丹 聖惠方 治一切惡疔瘡

人言 二錢半 斑猫 十一箇 去足翅 巴豆 十二箇 去硃砂 三錢

硃砂 硃砂 乳香 沒藥

黃丹 各二錢 南星 水洗 半夏 水洗 各一錢 血竭 二錢 射香 一錢二分半

右為末蟾酥汁為丸如紅豆大五分內分一分加入斑貓四箇然後捻成錠子如小麥大每一瘡就破下一錠子用飯粘白紙封口用前四分內一丸噙在舌上覺麻涼水吞下忌熱物片時如蟾酥乾用人乳汁化開一左用雄黃二錢

○已上數方疔瘡外治之劑

一方 治疔瘡

用白芷二錢生薑一兩同搗爛熱酒一碗調服出立見效

鐵杖 治疔瘡發背頭風

用草烏頭不拘多少去皮淨為末用葱白去鬚葉搗爛為丸如豌豆大以雄黃為衣每服一丸先將葱細嚼熱酒送下或有惡心吐三四口用冷水一盞止之即臥以被厚蓋汗出為度

返魂丹 瑞竹 治十二種疔瘡

硃砂 膽礬 各一錢半 血竭 銅綠 蝸牛 雄黃 白礬 各二錢 輕粉 沒藥 蟾酥 各五分 射香 少許

右將七味為末和搗蝸牛蟾酥極爛和藥時旋入蒸肉為丸如雞頭大每服一丸令病人先嚼葱白三寸壓在手心

將藥丸裝在葱白內用熱酒一盞吞下如重車行五里許  
有汗出即瘥如不能嚼葱研爛裹藥下食有一僧以此藥  
極有效予自洽救人累獲效驗真妙方也

寸金丹 治疔瘡 又名返魂丹再生丹延命丹延壽丹來  
甦元得道丸此藥嚥下即活

辰砂二分 蟾酥 輕粉各五分 枯礬

寒水石 銅青各一錢 海羊二十箇 射香一字

右為末研蝸牛一處搗爛丸如菘豆大攤丸添酒成之病  
輕者一丸重者二丸未效再服服法先嚼葱白一大片極爛  
置掌心中放藥在內裹熱酒下暖處卧汗出即愈忌冷水  
○已上數方疔瘡幸溫內托之劑

治魚臍疔瘡 醫方大成

真刺葉即糸瓜葉 連鬚葱 菲葉

右入石罇內研末如泥以酒和服以滓貼腋下如病在左  
手貼左腋下在右手貼右腋下在左腳貼左膝在右腳貼  
右膝如在身中則貼心臍並用帛縛住候肉下紅線處皆  
白則可為安如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒  
倒則難救矣

一方 治疔瘡

用菊葉一握搗爛取汁灌入口即活用根亦妙

一方 治疔瘡

土蜂房一小窠 蛇蛻一條

丹溪心法附錄卷六

六十四

右作一處納瓦器中以黃泥封固火煨存性研為細末空心酒調服一錢少頃腹中大痛痛止其瘡化為黃水仍服五聖散

五聖散

大黃 生姜 金銀花 甘草各一兩

瓜蒌一箇 皂角樹二兩

右咬咀每服一兩用好酒二盞煎至一盞溫服

破棺丹 瑞竹治疔黃疔疔疔

甘草 京三稜各二 山梔子 牽牛各一錢

地丁 連翹 金銀花 牡蠣各一錢

瑞竹堂加大黃三錢半 赤芍藥 當歸各二錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用童子小便化

開服之食前忌酒食生冷硬物

治疔瘡 醫方大成

黃連 兪活 白姜蚕 青皮

獨脚芽 防風 赤芍藥 獨活

蟬蛻 細辛 甘草煎各等分

右咬咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許姜一兩同研爛熟酒和服然後用酒水各半盞姜三片煎服熱不減後再加大黃少許煎服畧下一兩湯蕩法餘毒更用白梅蒼耳子研末貼瘡上拔去根脚此方以藥味觀之甚若不切然效驗神速累試之驗

已上數方疔瘡辛涼內疎之劑

連翹丸 齊生方 治瘰癧結核已破或未破者

薄荷 新者二升 製取汁

皂角 一挺水浸去 皮製取汁

以上二味一處於銀瓦器內熬成膏次入

青皮 一兩不 去白

皂角子 慢火炮去皮取皂子 仁搗羅為末半兩

陳皮 一兩不 去白

連翹 半兩 黑牽牛 一兩半生半炒

右五味為末用煎膏子為丸如梧桐子大每服二十九煎連翹湯食前送下

治瘰癧 楊氏家藏方

斑猫 二十八箇去頭 翅足用糯米炒 荆芥穗 姜蚕

黑牽牛 各二錢

右為末臨睡時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時再一服五更初却以溫酒調藥一錢服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯却再進前藥一服更以燈心湯調琥珀末一錢服之以小便內利去惡毒乃為愈矣

一方 治瘰癧 張子和方

白僵蚕 去絲 直者 白丁香 直佳 斑猫 去翅 足 磨刀泥

苦丁香 赤小豆 各等分

右為末十歲以上每服一錢二十歲已上服二錢病人不要吃晚飯五更時用新汲水一盞調服至辰時見効男子大便中女人小便中利下赤白色二三次或膿血如鼠狀

為効當日食粥不得此別物忌油膩患三四年者只一服  
七八年者再一服

尅効散 治墜子瘡

官桂

硃砂各半錢 赤小豆

粳米各四十粒

斑蝥

四十九箇 不去翅足

右五味研為末初服一字次服二字次服三字次服四字

煎商陸根湯送下空心服小使淋瀝為効如惡心嘔吐黃  
水無妨螺瘻日自消矣

無比丸 治墜瘻

白朮

煥柳

防風

牽牛半生 半熟

蜜七僧

郁李仁炮去皮

斑蝥糯米炒 各等分

右為末麩糊丸如梧桐子大每服二十九空心臨臥其草  
煥柳湯送下至一月後覺腹中微痛於小便中取下瘻子  
毒如魚眼大已破者自合未破者自消有驗

一方 治墜瘻

用斑蝥一兩去翅足以粟米一升炒黃色去米細研入薄  
荷末四兩以雞彈清丸如棗豆大空心臘茶湯下一丸每  
日加一丸加至五丸每日減一丸減至一丸又每加一丸  
加至五丸後每日仍服五丸

一方 治墜瘻

用烏雞彈一箇頂上開一竅撿清黃令勻以斑蝥一箇去  
頭翅足入雞彈中以細糊封之飯上蒸熟剥去殼去斑蝥

空心喫雞彈二日一箇以瘥爲度

一方 治瘰癧

雄黃

鬱金各五錢

巴豆去油半錢

斑猫

去頭翅足糯米炒七筒

右爲末麩糊爲丸如菽豆大每服五七丸臨臥以冷茶清

送下

五香連翹湯 精要治一切惡枝瘰癧癰疽惡腫等病

舶上青木香

沉香

乳香

丁香

射香

升麻

獨活

桑寄生

連翹

射干

木通去節各七分 大黃蒸一錢

右用水二盞煮取一盞以上去滓取八分清汁空心熱服

半日以上未利再與一服以利下惡物爲度味生阿膠服  
不妨以折去毒熱之氣本方有竹瀝苦硝恐泥者不能對  
酌故缺之知者自當量入一方有黃耆藿香無獨活射香  
一名五香大黃湯

玉燭散 治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日功

效方見婦人門

東垣升陽調經湯 治瘰癧透頸或至頰車此皆出足陽明

胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊  
脾傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆  
治之或作丸亦可

升麻 八錢

葛根

龍膽草 酒製

酒岑

菘木 酒洗

三稜 酒炒

甘草 炙

黃連 酒洗

連翹

桔梗 各三錢

生黃芩 四錢 歸稍

芍藥 各三錢

黃柏 酒炒

知母 酒洗 炒一兩

右另秤一半作末煉蜜為丸，菘豆大每服百餘丸，一半作  
咬咀每服五錢，若能食大便硬可旋加至七八錢，水二盞  
先浸半日煎至一盞去滓，臨臥熱服足高去枕仰臥，喻一  
口作十次嚙下，留一口在後送下，丸藥服畢其臥如常。

○已上數方瘰癧內消之劑

太乙膏

治癰子瘡神效

腦子 一錢

輕粉

乳香 各二錢

射香 三錢 研

沒藥 四錢

黃丹 五兩

右用清油一斤，先下黃丹，熬用柳枝攪，又用葱兒葱七枝  
先下一枝，熬焦再下一枝，葱盡為度，下火不住手攪，觀冷  
熱得所，入腦子等藥，攪勻，磁器盛之，用時旋攤。

一方

用瀝青、葶麻子去殼同研成膏，先用葱椒湯洗瘡，淨以紅  
絹攤膏貼患處。

一方

用石灰一塊，自辰時晒至午時，將瀝青、提細杏仁四十粒  
葶麻子十四粒同搗成膏，依前攤貼。

一方

用白膠香一兩，磁器內鑿開去滓，再鑿以葶麻子六十四

粒研爛入膠內更入油半匙熬勻滴水中試軟硬得所量  
瘡大小以緋帛攤貼先以葱椒湯洗瘡淨後貼一膏可治  
三五瘡并治惡瘡軟癰皆效

一方

用荆芥煎湯待冷洗瘡淨揀黑紫處以針刺破却用雄黃  
樟腦爲末清油調搽三四次候黃水出處仍取末見日乾  
蚓糞如雞薄大一塊火內燒紅川山甲九片或十一片微  
炙爲末入乳香沒藥少許香油調搽效

一方

梧桐淚一錢 巴豆去皮 皂角刺各一錢  
右爲末於淨室中勿令人見以不語唾調和搽成錠子如

黃虫糞大陰乾每用先刺開瘡入藥一錠已潰者就內入  
藥用紙封之勿令透氣待膿水出或有硬塊在內擠出惡  
物瘡口自斂即愈忌生冷油膩葷腥麪食

又方

以羊髓經燒灰末搽末破香油調傅已破乾搽

又方

用夏枯草不拘多少於鍋內煮爛除草將汁熬膏貼之  
治項上生瘰癧瘡未破灸法

以男左女右中指屈過用草量中節橫紋名爲同身寸量  
三寸半爲則於手板盡處量三寸半臂中立穴灸兩三壯  
半月癰處水如泥惡物盡膿流出後以膏貼之妙

○已上數方癰瘰外散之劑

諸瘡 七十九

丹溪心法

○金瘡 五倍子紫蘇等分

又方 白膠香三錢龍骨一錢

金瘡狗咬

五月五日午時用陳石灰一斤搗為末萆一斤搗汁和成餅陰乾為細末敷之

治陽証腫毒并金瘡

大粉草剉碎用竹筒一段割去青兩頭留節節上開一竅入粉草在內滿後用油灰塞孔竅從上及下日放藥在

內待立春先一日取起豎立在有風無日陰乾二十一日多最好却破竹取草為細末用傅金瘡乾者水調

附諸方

花藥石散 和劑方治一切金刀所傷打撲傷損身體出血者急於傷處搽藥其血自化為黃水方見損傷類

一方 治金刀所傷一切腫瘡良馬斷梁等瘡

用冬月黑牛膽一箇裝新石灰四兩白礬一兩陰乾二十七日待乾取出再用黃丹一兩另炒紫色研細同一處再勻敷瘡即愈

刀箭藥 治金刀跌撲狗咬湯火所傷

端午日採一去草花並擇嫩者搗爛量入舊石灰搗極勻

或先或餅陰乾碾為末濕則搽之乾則油調搽

一方

用初生小鼠同石灰搗勻陰乾傳金刃跌撲出血甚效  
如聖散秘方治一切金刃所傷血不止牙關緊急皆治大有

效驗

香白芷

川芎

防風

去芦各五錢

細辛

五錢

雄黃 二錢半

蒼朮 米泔浸一宿 去皮二兩

草烏

去皮臍 四兩

兩頭尖

去皮臍四兩

右為極細末血不止乾貼破傷風牙關緊急用熱酒下盡  
調服一錢又乾破處風牙疼乾擦之流涎即愈狗咬蛇傷  
煎鹽湯洗淨乾貼用熱酒調半錢服如重車行五里並服

三服如重服一錢小兒量力減服多年不效惡瘡前慈白  
搵湯漿水口漱洗去膿血一二次拭乾貼一切蜂蝎小虫  
所傷唾調於痛處貼之婦人產後敗血上衝下注熱酒調  
服一錢忌腥葷麪食油膩之物

丹溪心法

○湯火瘡

臘月猪胆塗黃柏炙乾為末付之

湯燒

以淋了第二次灰担付患處

火澆

桐油 二錢

水 二錢

右二件以桃柳枝不住手搗成膏再入少水溶外用猫兒  
肚底毛細剪搽上

附諸方

治湯火傷未成瘡者

用小麥炒黑為度研為末膩粉減半油調塗之  
赤石脂散 經驗方 治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂

寒水石

大黃各等分

右為末以新汲水調塗傷處

治湯火所傷

用大黃當歸各等分為末以清油調傅之溫則乾擦之  
冰霜散 治火燒損傷熱油澆傷皮爛肉大痛

寒水石 生

牡蛎 煨

明朴硝

青黛

各一兩 輕粉一錢

右為末新水調或油調濕貼乾則痛處即止如神

治火傷

凡被火傷急向火灸雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷  
物激之熱不出爛人肌肉

一方 治火傷

以杉木皮燒灰存性為末濕用乾擦乾用雞清調塗

治湯盪火燒瘡立効

用搗猪毛燒灰香油搽患處

四黃散 澹寮 治湯盪火燒熱瘡連痛

大黃

黃連

黃蘗

黃芩

白芨各等分

右為末水調成膏以雞翎時塗瘡上

治湯火瘡 澹寮方

丹溪心法  
用螺螄殼多年乾白者火煨爲末如瘡破用乾揅之如不  
破輕粉清油調傳之

丹溪心法

○下疳瘡

蛤粉

蠟茶

苦參

蜜陀僧

右爲末河水洗淨臘猪油調傳

兼治臙瘡

又方

米泔水洗瘡淨用頭髮以鹽水洗淨去油再用清湯洗曬  
乾燒灰傳瘡上即時生靨

附諸方

治下疳

用黃栢以磁瓦割下細末同蛤粉末等分揅上即愈蓋黃  
栢去熱蛤粉燥濕故也

又方

用米泔水洗瘡淨以雞胍脰內黃皮焙乾爲細末傳之

又秘方

用透明白膠香爲末入輕粉射香少許乾揅乾則用油調  
傳之

立効方 瑞竹堂治下疳

燈草灰入輕粉射香少許乾貼

治下疳秘方

旱田螺 燒灰 腦子

射香

輕粉少許

右爲末香油調傳患處即愈

下疳藥 聖惠方

用五倍子爲細末先以漿水洗淨瘡乾貼  
治下疳妬精瘡 秘方

七月七日採鳳眼草燒灰淋水洗之

聖粉散 治下注疳瘡蝕鼻腐爛疼痛不可忍者

黃栢 蜜炙 蜜陀僧 黃丹 高末茶

乳香 各三錢 輕粉 一錢半 射香 少許

右爲末用葱湯洗瘡後次貼此藥兼治小兒疳瘡

下疳瘡洗藥

黃連 黃栢 當歸 白芷

獨活 防風 朴硝 荆芥

右等分水煎入銅錢五十文烏梅五箇鹽一匙同煎溫洗  
五日五七次用下藥敷

木香 檳榔 黃連 銅青

輕粉 枯礬 蟬蛸 各等射少許

右爲極細末洗後至夜敷上

黃連散 治下疳

黃連 黃栢 各二錢 蜜陀僧 輕粉

黃丹 沒藥 各五分

右爲細末瘡濕乾擦瘡乾香油調搽

射香杏仁散 宜明方 治婦人陰瘡 少許

杏仁不拘多少 燒存性

射香 少許

右為細末如瘡口深用小絹袋子一箇盛藥滿繫口臨上藥灸熱安在陰內

丹溪心法

○癰瘡

防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺 又紫蘇樟腦蒼耳浮萍煎湯洗

又方

浮萍 一兩

蒼耳

蒼朮 一兩

苦參 一兩半

黃芩 半兩

香附 二錢半

右用酒糊為丸

又方

蘆會

大黃

輕粉

雄黃

蛇床子

槿樹皮

檳榔

右為末先刮癰後用米醋調藥末塗之

又方

蘆會 研三錢

江子 去壳十粒

草麻子 去壳十粒

斑蝥 七箇去足

白蠟

右以香油二兩熬江子草麻斑蝥三藥以黑為度去藥入蠟并蘆會末在內用磁罐盛貯微微刮癰令破以油塗上過夜畧腫即愈

附諸方

碧玉散 治癬

銅綠 礪砂 白礬 各等分

右為細末香油調搽

極皮散 治頭面荷葉癬

用川極樹皮為末醋調湯頻如膠敷上候癬瘡抓破再搽  
數日即愈

連粉散 風癬濕瘡並皆治之

黃連 一錢 輕粉 五分 膩粉 黃柏

黃丹 枯白礬 各一錢 龍骨 芦甘石 各五分

右為細末每用少許濕則乾搽乾則香油調搽

如聖散 治疥風癬瘡

蛇床子 一两 黃柏 苦參 藜蘆 各五錢

白礬 狗脊 藜蘆 剪草 各二錢半

輕粉 一錢二分 胡粉 一錢二分

右為細末清油調搽

白礬散 聖惠方治遍身生癬日久不愈上至頭面

用獨莖半蹄根別搗白礬為末一處以極酸米醋調抓破  
搽藥候痒極至通即止隔日治出不過兩上即愈又治癩  
風以苧麻刮熟以此藥搽之三四度愈

黃藥子散 經驗方 治疥癬瘡經年不瘥

黃連 玄參 赤芍藥 各五錢

右件為細末隨以多少入輕粉少許麝香芝麻取汁調先煎

韭菜湯洗令淨以熏傳之愈

何首烏散 和劑方 治脾肺風毒遍身癩疥瘙瘡或致肌肉木

麻分紫癩白癩風並皆治之

荆芥穗 威靈仙 洗淨 蔓荊子 去皮 蚶蜆草 去

何首烏 防風 去芦 甘草 炙各等分

右為細末每服二錢令後溫酒調下

丹溪心法

○臉瘡

乳香 沒藥 水銀 當歸 川芎

貝母 各二錢半 黃丹 二錢半 一云二兩半 真麻油 五兩

右咬咀除黃丹水銀外先將餘藥用香油熬黑色去渣下

黃丹水銀又煎黑色用柳桃枝攪成膏油紙攤貼

又方

龍骨 生用 血竭 赤石脂 共一兩 頭髮 如指入

黃蠟 一兩 白膠香 香油 不拘多少

右件以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟白膠香却入龍骨血竭赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁器盛之每遇一瘡捺作薄片貼瘡口以竹箸貼在外三日後番過再貼仍服活血藥

又方

用沙糖水煎冬青葉三五沸撈起石壓平將藥貼瘡上日換三次

又方

以頭垢燒灰和棗肉搗作膏先以葱椒葉煎湯洗淨用輕粉搽上却以前膏兩傘紙攤貼之

又方

地骨皮一兩白蠟半兩甘草節半兩

右以香油入地骨皮甘草節文武火熬熟去渣入黃丹一兩半紫火熬黑提起白紙攤貼之次用艾青葉醋煎過以兼貼之

附諸方

夾紙膏 治廉瘡久不愈者

乳香三錢 血竭二錢半 沒藥四錢 鬱金五錢

射香一錢半 牡蠣半兩 黃連 黃柏各二兩

大黃 黃丹各一輕粉三十貼

右為細末清油調勻攤油紙上貼瘡每一箇貼三日每日以冷水洗三次膏藥亦翻轉三次兩層夾紙以線縫四邊針刺眼透藥氣其藥末同和一處收要用旋調

至聖隔紙膏

水龍骨另研輕粉 研 黃丹飛各 樟腦 黃連各 四錢 右為細末桐油調勻以油紙隨瘡眼大小糊袋以兼肉袋內貼在瘡上用軟綿繫束之

廉瘡膏藥

輕粉 赤石脂 黃丹 甘草

丹溪心法附錄卷之六

黃栢去粗皮切為末 火龍丹即伏龍肝即竈心紅土亦可  
右各等分先將五味研為極細末後下輕粉用真香油調勻再用油單紙夾住勿令藥侵瘡貼上絹帶繫住一日三番拭去瘡上血沫

治外賺脚瘡秘方

用累經燒過空窰黃土研極爛入黃栢赤石脂黃丹輕粉拌勻以清油調稀用油紙或葉傳瘡上却以布絹縛定縱痒不可以手開動直候十數日後瘡愈却去之

○廣按此方與前方相類其用竈心黃土以燥濕清熱用黃栢之辛以散火邪真諸方所不及但再加沒藥與乳香以散瘀血可謂十全矣

又方

白膠香末以蠟酒攤上箬葉夾蒸在內貼之

治遠年近日賺瘡聖惠方

黃丹飛 輕粉 蜜陀僧 龍骨各等分  
射香少許

右為細末漿洗淨瘡口乾貼之

又秘方

輕粉二錢 黃蠟一兩 猪膽一兩

右溶化攤油紙上貼

○漏瘡新增

附諸賢論

丹溪心法附錄卷之六

八

劉宗厚曰諸瘡患久成漏者常有膿水不絕其膿不臭肉無互肉宜用附子浸透切作大片厚二分於瘡上著艾灸之仍服內托之藥隔二三日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣至有膿水惡物漸潰根深者郭氏治用白麩硫黃大蒜三物下處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約二分於瘡上用艾注灸二十一壯一灸一易復隔四五日方用翠霞錠子并信效錠子互相用之餅入瘡內及肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服應病之劑調理即瘥矣

附諸方

灸法 冷漏多在腿足之間先是積熱所注久則為寒附子破作兩半用人唾浸透切成片安漏孔上用艾灸之

內托散

川芎 半兩

細辛

白芷稍 各二錢半

右為末每日作湯服之病在下食前服在上食後服看瘡大小計隔年黃麻根刮去皮撚成繩子入孔中至入不去則止瘡外膏藥貼之

內補十宣散

治冷漏在遍身用此內托補虛方見癰疽

當歸拈痛湯

治冷漏在腰腿之間用此以補虛散邪方見脚氣類

翠霞錠子

治年深冷漏日久惡瘡有反肉用之

銅綠

寒水石 煨

滑石

各三錢

明礬

膩粉

砒霜

雲母石

研如粉各一錢二分半

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡內深淺  
繼之如脩合此候天色晴明則可

信效錠子 治一切惡瘡

紅娘子

黃丹

砒霜

鷹屎

土硝

白芨各一錢半

銅綠二錢半 腦子

射香各少許

右研細末所兒乳汁和為錠子用中病即止

生肌散 歛口生肌

太乙膏

護瘡散

並見癰疽類

丹溪心法

○枝瘡

黃柏生地黃紫金皮皆要藥熱血作痛 涼血去瘀血

為先頭下雞鳴散之類 生地黃黃柏為末童便調得  
或加韭汁 不破者以韭菜葱頭春碎炒熟貼冷則易  
膏藥用紫金皮乳香沒藥生地黃黃柏大黃之類

又方

用大黃黃柏為末生地黃汁調傅乾則再付

又方

野生芋麻根嫩者不拘多少洗淨同鹽搗傅瘡上效傷  
重多用鹽

附諸方

雞鳴散

見跌損傷

乳香散

治枝瘡腫痛

乳香 另研 沒藥 另研各一錢 大黃 黃連 黃柏 各三錢 腦子 少許

右為細末冷水調勻攤於緋絹上貼之

當歸散

乳香 沒藥 各三錢 茴香 四錢 當歸 一兩

自然銅 火燒醋淬七次

右為細末每服五錢溫酒調服

五黃散

黃丹 黃芩 黃連 黃柏 大黃 乳香 各等分

右為細末冷水調成膏攤緋絹上貼之

陳巡檢方 治杖瘡

大黃 當歸 芍藥 川芎 木鱉子  
 巴豆 白芷 白芨 乳香 沒藥  
 射干 槐枝 柳枝 已上十三味各一兩 黃丹十三兩飛過  
 香油 二十六兩

右除乳香沒藥外十一味用香油浸三日熬白焦黃色瀝去滓入飛丹再熬滴水中不散為度俟油溫下乳香沒藥去火毒

丹溪心法附餘卷之十六終

4  
3298

丹波心法  
附食  
卷之六  
糸

